

Продолжение функций из неизотропных пространств Никольского – Бесова и приближение их производных

С. Н. Кудрявцев

Аннотация

В статье рассмотрены неизотропные пространства Никольского и Бесова с нормами, в определении которых вместо модулей непрерывности известных порядков производных функций по координатным направлениям используются " L_p -усредненные" модули непрерывности функций соответствующих порядков по тем же направлениям. Для таких пространств функций, заданных в областях определенного типа, построены непрерывные линейные отображения их в обычные неизотропные пространства Никольского и Бесова в $\mathbb{R}^d$, являющиеся операторами продолжения функций, что влечет совпадение тех и других пространств в упомянутых областях. В работе также найдена слабая асимптотика аппроксимационных характеристик, относящихся к задаче восстановления производной по значениям функций в заданном числе точек, задаче С.Б. Стечкина для оператора дифференцирования, задаче описания асимптотики поперечников для неизотропных классов Никольского и Бесова в этих областях.

Ключевые слова: неизотропные пространства Никольского – Бесова, продолжение функций, эквивалентные нормы, восстановление производной, приближение оператора, поперечник

Введение

В работе рассмотрен ряд задач теории функциональных пространств и теории приближения для неизотропных пространств Никольского и Бесова функций, заданных в областях из определенных классов. Эти задачи объединяет общая техника вывода метрических соотношений, используемых для получения верхних оценок величин, являющихся предметом изучения в этих задачах. Остановимся подробнее на содержании работы.

При $d \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{R}_+^d, 1 \leq p, \theta < \infty$ для области $D \subset \mathbb{R}^d$ вводятся в рассмотрение пространства $(B_{p,\theta}^\alpha)'(D)((H_p^\alpha)'(D))$ с нормами

$$\|f\|_{(B_{p,\theta}^\alpha)'(D)} = \max\left(\|f\|_{L_p(D)}, \max_{j=1,\dots,d} \left(\int_0^\infty t^{-1-\theta\alpha_j} (\Omega_j^{l_j}(f,t)_{L_p(D)})^\theta dt\right)^{1/\theta}\right),$$

$$\|f\|_{(H_p^\alpha)'(D)} = \max(\|f\|_{L_p(D)}, \max_{j=1,\dots,d} \sup_{t \in \mathbb{R}_+} t^{-\alpha_j} \Omega_j^{l_j}(f,t)_{L_p(D)}),$$

где

$$\Omega_j^{l_j}(f,t)_{L_p(D)} = \left((2t)^{-1} \int_{|\xi| \leq t} \|\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f\|_{L_p(D_{l_j \xi e_j})}^p d\xi\right)^{1/p}, t \in \mathbb{R}_+, l_j = \min\{m \in \mathbb{N} : \alpha_j < m\}, j = 1, \dots, d.$$

Для ограниченных областей D так называемого α -типа (см. п. 1.3.) построены непрерывные линейные отображения пространств $(B_{p,\theta}^\alpha)'(D)((H_p^\alpha)'(D))$ в пространства Бесова $B_{p,\theta}^\alpha(\mathbb{R}^d)$ (Никольского $H_p^\alpha(\mathbb{R}^d)$), являющиеся операторами продолжения функций, что влечет совпадение соответствующих пространств (см. п. 2.1.). Публикации, в которых рассматривается такая задача, автору не известны. Из близких работ по этой тематике приведем [1] – [5] (см. также имеющуюся там литературу), в которых изучается вопрос о продолжении за пределы области определения гладких функций из неизотропных пространств с сохранением класса. Отметим, что средства построения операторов продолжения функций и схемы доказательства непрерывности таких операторов, применяемые ниже, отличаются от тех, что использовались в упомянутых работах.

В случае ограниченной области D α -типа в статье при соответствующих условиях на $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d$ установлена слабая асимптотика, т.е. найден порядок величины наилучшей точности восстановления в пространстве $L_q(D)$ производной $\mathcal{D}^\lambda f$ по значениям в n точках функций f из классов Никольского $(\mathcal{H}_p^\alpha)'(D)$ и Бесова $(\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(D)$, кроме того, получена слабая асимптотика поведения в зависимости от ρ наилучшей точности приближения в $L_q(D)$ оператора $\mathcal{D}^\lambda$ на классах $(\mathcal{H}_p^\alpha)'(D)$ и $(\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(D)$ операторами, действующими из $L_s(D)$ в $L_q(D)$, норма которых не превосходит ρ , и, наконец, описана слабая асимптотика колмогоровского, гильбертовского, линейного, александровского и энтропийного n -поперечников в $L_q(D)$ классов, состоящих из производных $\mathcal{D}^\lambda f$ функций f из единичного шара пространств $(H_p^\alpha)'(D)$ и $(B_{p,\theta}^\alpha)'(D)$. В этой части настоящая работа продолжает исследования, проводившиеся автором в [6] для упомянутых задач в отношении неизотропных классов Никольского и Бесова функций, заданных на кубе I^d . Проблематика, к которой относятся рассмат-

риваемые задачи, занимает значительное место в теории приближений, и обзор результатов по ней в рамках этой статьи невозможен.

Отметим, что общие подходы при решении упомянутых задач сохранились такими же, как в [6]. Однако для их реализации потребовались другие средства приближения и существенные изменения схем вывода вспомогательных соотношений, используемых для получения верхних оценок изучаемых величин, в сравнении с теми, что применялись в [6]. Нижние оценки рассматриваемых ниже величин устанавливаются, опираясь на нижние оценки соответствующих величин, полученные в [6]. Как и следовало ожидать, слабая асимптотика изучаемых величин в задачах о восстановлении производной, приближении оператора дифференцирования и нахождении порядков поперечников совпадает со слабой асимптотикой соответствующих им величин, установленной в [6].

Работа состоит из введения и пяти параграфов, в первом из которых рассматриваются некоторые средства для решения объявленных задач, во втором – задача о продолжении, в третьем – задача восстановления, в четвёртом – задача приближения оператора дифференцирования, в пятом – поперечники.

§1. Предварительные сведения и вспомогательные утверждения

1.1. В этом пункте вводятся обозначения, относящиеся к функциональным пространствам и классам, рассматриваемым в настоящей работе, а также приводятся некоторые факты, необходимые в дальнейшем.

Для $d \in \mathbb{N}$ через $\mathbb{Z}_+^d$ обозначим множество

$$\mathbb{Z}_+^d = \{\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_d) \in \mathbb{Z}^d : \lambda_j \geq 0, j = 1, \dots, d\}.$$

Обозначим также при $d \in \mathbb{N}$ для $l \in \mathbb{Z}_+^d$ через $\mathbb{Z}_+^d(l)$ множество

$$\mathbb{Z}_+^d(l) = \{\lambda \in \mathbb{Z}_+^d : \lambda_j \leq l_j, j = 1, \dots, d\}.$$

Напомним, что при $n \in \mathbb{N}$ и $1 \leq p \leq \infty$ через l_p^n обозначается пространство $\mathbb{R}^n$ с фиксированной в нём нормой

$$\|x\|_{l_p^n} = \begin{cases} (\sum_{j=1}^n |x_j|^p)^{1/p} & \text{при } p < \infty; \\ \max_{j=1}^n |x_j| & \text{при } p = \infty, \end{cases} \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Для $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d$ через $\mathcal{P}^{d,l}$ будем обозначать пространство вещественных полиномов, состоящее из всех функций $f : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$ вида

$$f(x) = \sum_{\lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l)} a_\lambda \cdot x^\lambda, x \in \mathbb{R}^d,$$

где $a_\lambda \in \mathbb{R}$, $x^\lambda = x_1^{\lambda_1} \dots x_d^{\lambda_d}$, $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l)$.

При $d \in \mathbb{N}$, $l \in \mathbb{Z}_+^d$ для области $D \subset \mathbb{R}^d$ через $\mathcal{P}^{d,l}(D)$ обозначим пространство функций f , определённых в D , для каждой из которых существует полином $g \in \mathcal{P}^{d,l}$ такой, что сужение $g|_D = f$.

Для топологического пространства T через $C(T)$ будем обозначать пространство непрерывных вещественных функций на T . Для множества $A \subset T$ через $\overline{A}$ обозначается замыкание множества A , а через $\text{int } A$ – его внутренность.

Для измеримого по Лебегу множества $D \subset \mathbb{R}^d$ при $1 \leq p \leq \infty$ через $L_p(D)$, как обычно, обозначается пространство всех вещественных измеримых на D функций f , для которых определена норма

$$\|f\|_{L_p(D)} = \begin{cases} (\int_D |f(x)|^p dx)^{1/p}, & 1 \leq p < \infty; \\ \sup \text{vrai}_{x \in D} |f(x)|, & p = \infty. \end{cases}$$

При $d \in \mathbb{N}$ для $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d$ через $\mathcal{D}^\lambda$ будем обозначать оператор дифференцирования $\mathcal{D}^\lambda = \frac{\mathcal{D}^{|\lambda|}}{dx_1^{\lambda_1} \dots dx_d^{\lambda_d}}$, где $|\lambda| = \sum_{j=1}^d \lambda_j$.

При обозначении известных пространств дифференцируемых функций будем ориентироваться на [7]. Для области $D \subset \mathbb{R}^d$ при $1 \leq p \leq \infty$, $l \in \mathbb{Z}_+^d$ через $W_p^l(D)$ обозначается пространство всех функций $f \in L_p(D)$, для которых для каждого $j = 1, \dots, d$ обобщенная производная $\mathcal{D}_j^{l_j} f = \frac{\mathcal{D}^{l_j} f}{dx_j^{l_j}}$ принадлежит $L_p(D)$, с нормой

$$\|f\|_{W_p^l(D)} = \max(\|f\|_{L_p(D)}, \max_{j=1, \dots, d} \|\mathcal{D}_j^{l_j} f\|_{L_p(D)}).$$

Для $x, y \in \mathbb{R}^d$ положим $xy = x \cdot y = (x_1 y_1, \dots, x_d y_d)$, а для $x \in \mathbb{R}^d$ и $A \subset \mathbb{R}^d$ определим

$$xA = x \cdot A = \{xy : y \in A\}.$$

Для $x \in \mathbb{R}^d : x_j \neq 0$, при $j = 1, \dots, d$, положим $x^{-1} = (x_1^{-1}, \dots, x_d^{-1})$.

Для $d \in \mathbb{N}$, $x, y \in \mathbb{R}^d$ будем писать $x \leq y$ ($x < y$), если для каждого $j = 1, \dots, d$ выполняется неравенство $x_j \leq y_j$ ($x_j < y_j$).

При $d \in \mathbb{N}$ для $x \in \mathbb{R}^d$ положим

$$x_+ = ((x_1)_+, \dots, (x_d)_+),$$

где $t_+ = \frac{1}{2}(t + |t|)$, $t \in \mathbb{R}$.

Обозначим через $\mathbb{R}_+^d$ множество $x \in \mathbb{R}^d$, для которых $x_j > 0$ при $j = 1, \dots, d$, и для $a \in \mathbb{R}_+^d$, $x \in \mathbb{R}^d$ положим $a^x = a_1^{x_1} \dots a_d^{x_d}$.

При $d \in \mathbb{N}$ для $x \in \mathbb{R}^d$ через $f(x)$ обозначим множество $f(x) = \{j = 1, \dots, d : x_j \neq 0\}$.

Будем также обозначать через χ_A характеристическую функцию множества $A \subset \mathbb{R}^d$.

При $d \in \mathbb{N}$ определим множества

$$I^d = \{x \in \mathbb{R}^d : 0 < x_j < 1, j = 1, \dots, d\},$$

$$\bar{I}^d = \{x \in \mathbb{R}^d : 0 \leq x_j \leq 1, j = 1, \dots, d\},$$

$$B^d = \{x \in \mathbb{R}^d : -1 \leq x_j \leq 1, j = 1, \dots, d\}.$$

Через $\mathbf{e}$ будем обозначать вектор в $\mathbb{R}^d$, задаваемый равенством $\mathbf{e} = (1, \dots, 1)$.

Теперь приведём некоторые факты, относящиеся к полиномам, которыми мы будем пользоваться ниже.

В [6] содержится

Лемма 1.1.1

Пусть $d \in \mathbb{N}$, $l \in \mathbb{Z}_+^d$, $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d$, $1 \leq p, q \leq \infty$, $\rho, \sigma \in \mathbb{R}_+^d$. Тогда существует константа $c_1(d, l, \lambda, \rho, \sigma) > 0$ такая, что для любых измеримых по Лебегу множеств $D, Q \subset \mathbb{R}^d$, для которых можно найти $\delta \in \mathbb{R}_+^d$ и $x^0 \in \mathbb{R}^d$ такие, что $D \subset (x^0 + \rho\delta B^d)$ и $(x^0 + \sigma\delta I^d) \subset Q$, для любого полинома $f \in \mathcal{P}^{d,l}$ выполняется неравенство

$$\|\mathcal{D}^\lambda f\|_{L_q(D)} \leq c_1 \delta^{-\lambda - p^{-1}\mathbf{e} + q^{-1}\mathbf{e}} \|f\|_{L_p(Q)}. \quad (1.1.1)$$

Далее, напомним, что для области $D \subset \mathbb{R}^d$ и вектора $h \in \mathbb{R}^d$ через D_h обозначается множество

$$D_h = \{x \in D : x + th \in D \forall t \in \bar{I}\}.$$

Для функции f , заданной в области $D \subset \mathbb{R}^d$, и вектора $h \in \mathbb{R}^d$ определим в D_h её разность $\Delta_h f$ с шагом h , полагая

$$(\Delta_h f)(x) = f(x + h) - f(x), x \in D_h,$$

а для $l \in \mathbb{N} : l \geq 2$, в D_{lh} определим l -ую разность $\Delta_h^l f$ функции f с шагом h равенством

$$(\Delta_h^l f)(x) = (\Delta_h(\Delta_h^{l-1} f))(x), x \in D_{lh},$$

положим также $\Delta_h^0 f = f$.

Как известно, справедливо равенство

$$(\Delta_h^l f)(\cdot) = \sum_{k=0}^l C_l^k (-1)^{l-k} f(\cdot + kh), C_l^k = \frac{l!}{k!(l-k)!}.$$

При $d \in \mathbb{N}$ для $j = 1, \dots, d$ через e_j будем обозначать вектор $e_j = (0, \dots, 0, 1_j, 0, \dots, 0)$.

Как показано в [8], справедлива

Лемма 1.1.2

Пусть $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d$. Тогда для любых $\delta \in \mathbb{R}_+^d$ и $x^0 \in \mathbb{R}^d$ для $Q = x^0 + \delta I^d$ существует единственный линейный оператор $P_{\delta, x^0}^{d, l} : L_1(Q) \mapsto \mathcal{P}^{d, l}$, обладающий следующими свойствами:

1) для $f \in \mathcal{P}^{d, l}$ имеет место равенство

$$P_{\delta, x^0}^{d, l}(f |_Q) = f, \quad (1.1.2)$$

2)

$$\text{Ker } P_{\delta, x^0}^{d, l} = \left\{ f \in L_1(Q) : \int_Q f(x)g(x) dx = 0 \ \forall g \in \mathcal{P}^{d, l} \right\},$$

причём существуют константы $c_2(d, l) > 0$ и $c_3(d, l) > 0$ такие, что

3) при $1 \leq p \leq \infty$ для $f \in L_p(Q)$ справедливо неравенство

$$\|P_{\delta, x^0}^{d, l}f\|_{L_p(Q)} \leq c_2\|f\|_{L_p(Q)}, \quad (1.1.3)$$

4) при $1 \leq p < \infty$ для $f \in L_p(Q)$ выполняется неравенство

$$\|f - P_{\delta, x^0}^{d, l}f\|_{L_p(Q)} \leq c_3 \sum_{j=1}^d \delta_j^{-1/p} \left(\int_{\delta_j B^1} \int_{Q_{(l_j+1)\xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j+1} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p}. \quad (1.1.4)$$

Определим пространства и классы функций, изучаемые в настоящей работе (ср. с [7]). Но прежде введём некоторые обозначения.

Пусть D — область в $\mathbb{R}^d$ и $1 \leq p < \infty$. Для $f \in L_p(D)$ при $j = 1, \dots, d$, $l \in \mathbb{Z}_+$ обозначим модуль непрерывности в $L_p(D)$ порядка l по j -му координатному направлению через

$$\Omega_j^l(f, t)_{L_p(D)} = \sup_{h \in tB^1} \text{vrai} \|\Delta_{he_j}^l f\|_{L_p(D_{lhe_j})}, t \in \mathbb{R}_+,$$

а также введем в рассмотрение "усредненный" модуль непрерывности в $L_p(D)$ порядка l по j -му координатному направлению, полагая

$$\begin{aligned} \Omega_j^l(f, t)_{L_p(D)} &= \left((2t)^{-1} \int_{tB^1} \|\Delta_{\xi e_j}^l f\|_{L_p(D_{l\xi e_j})}^p d\xi \right)^{1/p} = \\ &= \left((2t)^{-1} \int_{tB^1} \int_{D_{l\xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^l f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p}, t \in \mathbb{R}_+. \end{aligned}$$

Из приведенных определений видно, что

$$\Omega_j^{l_l}(f, t)_{L_p(D)} \leq \Omega_j^l(f, t)_{L_p(D)}, t \in \mathbb{R}_+, f \in L_p(D), 1 \leq p < \infty, \\ l \in \mathbb{Z}_+, D - \text{произвольная область в } \mathbb{R}^d. \quad (1.1.5)$$

Пусть теперь $d \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{R}_+^d, 1 \leq p < \infty$ и D – область в $\mathbb{R}^d$. Тогда зададим вектор $l = l(\alpha) \in \mathbb{N}^d$, полагая $l_j = \min\{m \in \mathbb{N} : \alpha_j < m\}, j = 1, \dots, d$, а также выберем вектор $\mathbf{l} \in \mathbb{Z}_+^d$ такой, что $\mathbf{l} < \alpha$, и через $(H_p^\alpha)^{\mathbf{l}}(D)$ обозначим пространство всех функций $f \in W_p^{\mathbf{l}}(D)$, для которых при $j = 1, \dots, d$ конечна величина

$$\sup_{t \in \mathbb{R}_+} t^{-(\alpha_j - l_j)} \cdot \Omega_j^{l_j - l_j}(\mathcal{D}_j^{l_j} f, t)_{L_p(D)} < \infty,$$

а через $(\mathcal{H}_p^\alpha)^{\mathbf{l}}(D)$ – множество функций $f \in W_p^{\mathbf{l}}(D)$, для которых при $j = 1, \dots, d$ выполняется неравенство

$$\sup_{t \in \mathbb{R}_+} t^{-(\alpha_j - l_j)} \Omega_j^{l_j - l_j}(\mathcal{D}_j^{l_j} f, t)_{L_p(D)} \leq 1.$$

В пространстве $(H_p^\alpha)^{\mathbf{l}}(D)$ вводится норма

$$\|f\|_{(H_p^\alpha)^{\mathbf{l}}(D)} = \max(\|f\|_{W_p^{\mathbf{l}}(D)}, \max_{j=1, \dots, d} \sup_{t \in \mathbb{R}_+} t^{-(\alpha_j - l_j)} \Omega_j^{l_j - l_j}(\mathcal{D}_j^{l_j} f, t)_{L_p(D)}).$$

При тех же условиях на α, p, D обозначим через $(H_p^\alpha)'(D)$ пространство всех функций $f \in L_p(D)$, обладающих тем свойством, что для любого $j = 1, \dots, d$ соблюдается условие

$$\sup_{t \in \mathbb{R}_+} t^{-\alpha_j} \cdot \Omega_j^{l_j}(f, t)_{L_p(D)} < \infty,$$

а через $(\mathcal{H}_p^\alpha)'(D)$ – множество функций $f \in L_p(D)$, обладающих тем свойством, что для любого $j = 1, \dots, d$ соблюдается неравенство

$$\sup_{t \in \mathbb{R}_+} t^{-\alpha_j} \cdot \Omega_j^{l_j}(f, t)_{L_p(D)} \leq 1, \text{ где } l = l(\alpha).$$

В пространстве $(H_p^\alpha)'(D)$ задается норма

$$\|f\|_{(H_p^\alpha)'(D)} = \max(\|f\|_{L_p(D)}, \max_{j=1, \dots, d} \sup_{t \in \mathbb{R}_+} t^{-\alpha_j} \Omega_j^{l_j}(f, t)_{L_p(D)}).$$

Для области $D \subset \mathbb{R}^d$ при $\alpha \in \mathbb{R}_+^d, 1 \leq p < \infty, \theta \in \mathbb{R} : 1 \leq \theta < \infty$, полагая, как и выше, $l = l(\alpha) \in \mathbb{N}^d$, и выбирая $\mathbf{l} \in \mathbb{Z}_+^d : \mathbf{l} < \alpha$, через

$(B_{p,\theta}^\alpha)^{\mathbf{l}}(D)$ обозначим пространство всех функций $f \in W_p^{\mathbf{l}}(D)$, которые для любого $j = 1, \dots, d$ удовлетворяют условию

$$\int_0^\infty t^{-1-\theta(\alpha_j-\mathbf{l}_j)} (\Omega_j^{\mathbf{l}_j-\mathbf{l}_j}(\mathcal{D}_j^{\mathbf{l}_j} f, t)_{L_p(D)})^\theta dt < \infty,$$

а через $(\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)^{\mathbf{l}}(D)$ обозначим множество всех функций $f \in W_p^{\mathbf{l}}(D)$, для которых при любом $j = 1, \dots, d$ соблюдается неравенство

$$\int_0^\infty t^{-1-\theta(\alpha_j-\mathbf{l}_j)} (\Omega_j^{\mathbf{l}_j-\mathbf{l}_j}(\mathcal{D}_j^{\mathbf{l}_j} f, t)_{L_p(D)})^\theta dt \leq 1.$$

В пространстве $(B_{p,\theta}^\alpha)^{\mathbf{l}}(D)$ фиксируется норма

$$\|f\|_{(B_{p,\theta}^\alpha)^{\mathbf{l}}(D)} = \max \left(\|f\|_{W_p^{\mathbf{l}}(D)}, \max_{j=1,\dots,d} \left(\int_0^\infty t^{-1-\theta(\alpha_j-\mathbf{l}_j)} (\Omega_j^{\mathbf{l}_j-\mathbf{l}_j}(\mathcal{D}_j^{\mathbf{l}_j} f, t)_{L_p(D)})^\theta dt \right)^{1/\theta} \right).$$

При $\theta = \infty$ положим $(B_{p,\infty}^\alpha)^{\mathbf{l}}(D) = (H_p^\alpha)^{\mathbf{l}}(D)$.

При тех же условиях на параметры обозначим через $(B_{p,\theta}^\alpha)'(D)$ пространство всех функций $f \in L_p(D)$, которые при $l = l(\alpha)$ для каждого $j = 1, \dots, d$ подчинены условию

$$\int_0^\infty t^{-1-\theta\alpha_j} (\Omega_j^{\mathbf{l}_j}(f, t)_{L_p(D)})^\theta dt < \infty,$$

а через $(\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(D)$ – множество функций $f \in L_p(D)$, которые при $j = 1, \dots, d$ удовлетворяют неравенству

$$\int_0^\infty t^{-1-\theta\alpha_j} (\Omega_j^{\mathbf{l}_j}(f, t)_{L_p(D)})^\theta dt \leq 1.$$

В пространстве $(B_{p,\theta}^\alpha)'(D)$ определяется норма

$$\|f\|_{(B_{p,\theta}^\alpha)'(D)} = \max \left(\|f\|_{L_p(D)}, \max_{j=1,\dots,d} \left(\int_0^\infty t^{-1-\theta\alpha_j} (\Omega_j^{\mathbf{l}_j}(f, t)_{L_p(D)})^\theta dt \right)^{1/\theta} \right).$$

При $\theta = \infty$ положим $(B_{p,\infty}^\alpha)'(D) = (H_p^\alpha)'(D)$.

В случае, когда вектор $\mathbf{l} = \mathbf{l}(\alpha) \in \mathbb{Z}_+^d$ имеет компоненты $(\mathbf{l}(\alpha))_j = \max\{m \in \mathbb{Z}_+ : m < \alpha_j\}, j = 1, \dots, d$, пространство $(B_{p,\theta}^\alpha)^{\mathbf{l}}(D)((H_p^\alpha)^{\mathbf{l}}(D))$ обычно обозначается $B_{p,\theta}^\alpha(D)(H_p^\alpha(D))$.

Неоднократно будет использоваться взятая из [7]

Лемма 1.1.3

Пусть $d \in \mathbb{N}, l, m \in \mathbb{Z}_+^d, 1 \leq p < \infty$ и D — область в $\mathbb{R}^d$. Тогда для $f \in W_p^l(D)$ при $j = 1, \dots, d$ и $\xi \in \mathbb{R}$ справедлива оценка

$$\|\Delta_{\xi e_j}^{l_j+m_j} f\|_{L_p(D_{(l_j+m_j)\xi e_j})} \leq |\xi|^{l_j} \|\Delta_{\xi e_j}^{m_j} \mathcal{D}_j^{l_j} f\|_{L_p(D_{m_j \xi e_j})}. \quad (1.1.6)$$

В тех же обозначениях, что и выше, принимая во внимание то обстоятельство, что для $f \in (B_{p,\theta}^\alpha)^l(D)$ при $j = 1, \dots, d$ и $t > 0$ справедлива оценка (см., например, [6])

$$\begin{aligned} & t^{-(\alpha_j - l_j)} \Omega_j^{l_j - l_j} (\mathcal{D}_j^{l_j} f, t)_{L_p(D)} \\ & \leq 2^{1/\theta + \alpha_j - l_j} \left(\int_0^\infty \tau^{-1 - \theta(\alpha_j - l_j)} (\Omega_j^{l_j - l_j} (\mathcal{D}_j^{l_j} f, \tau)_{L_p(D)})^\theta d\tau \right)^{1/\theta}, \end{aligned}$$

закключаем, что

$$\begin{aligned} & (B_{p,\theta}^\alpha)^l(D) \subset (H_p^\alpha)^l(D), \\ & D \text{ — область в } \mathbb{R}^d, \alpha \in \mathbb{R}_+^d, 1 \leq p < \infty, 1 \leq \theta < \infty, l \in \mathbb{Z}_+^d : l < \alpha. \end{aligned}$$

Учитывая, что для $f \in (B_{p,\theta}^\alpha)'(D), \alpha \in \mathbb{R}_+^d, 1 \leq p, \theta < \infty, D$ — область в $\mathbb{R}^d$, при $t \in \mathbb{R}_+, l = l(\alpha), j = 1, \dots, d$ выполняется неравенство

$$t^{-\alpha_j} \Omega_j^{l_j} (f, t)_{L_p(D)} \leq 2^{\alpha_j + 1/\theta + 1/p} \left(\int_{\mathbb{R}_+} \tau^{-1 - \theta \alpha_j} (\Omega_j^{l_j} (f, \tau)_{L_p(D)})^\theta d\tau \right)^{1/\theta},$$

закключаем, что

$$\begin{aligned} & (B_{p,\theta}^\alpha)'(D) \subset (H_p^\alpha)'(D); (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(D) \subset c_4(\alpha) (\mathcal{H}_p^\alpha)'(D); \\ & \|f\|_{(H_p^\alpha)'(D)} \leq c_4(\alpha) \|f\|_{(\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(D)}, \quad (1.1.7) \end{aligned}$$

где $c_4(\alpha) = \max_{j=1,\dots,d} 2^{2+\alpha_j}$. Из (1.1.5) и (1.1.6) следует, что для $f \in (B_{p,\theta}^\alpha)^l(D), l \in \mathbb{Z}_+^d : l < \alpha, l = l(\alpha)$ при $t \in \mathbb{R}_+, j = 1, \dots, d$ выполняется неравенство

$$\begin{aligned} \Omega_j^{l_j} (f, t)_{L_p(D)} & \leq \Omega_j^{l_j} (f, t)_{L_p(D)} = \sup_{\xi \in tB^1} \text{vrai} \|\Delta_{\xi e_j}^{l_j + (l_j - l_j)} f\|_{L_p(D_{(l_j + (l_j - l_j))\xi e_j})} \leq \\ & \sup_{\xi \in tB^1} \text{vrai} |\xi|^{l_j} \|\Delta_{\xi e_j}^{l_j - l_j} \mathcal{D}_j^{l_j} f\|_{L_p(D_{(l_j - l_j)\xi e_j})} \leq \\ & t^{l_j} \cdot \sup_{\xi \in tB^1} \|\Delta_{\xi e_j}^{l_j - l_j} \mathcal{D}_j^{l_j} f\|_{L_p(D_{(l_j - l_j)\xi e_j})} = t^{l_j} \Omega_j^{l_j - l_j} (\mathcal{D}_j^{l_j} f, t)_{L_p(D)}, \end{aligned}$$

и, значит,

$$(B_{p,\theta}^\alpha)^l(D) \subset (B_{p,\theta}^\alpha)'(D), (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)^l(D) \subset (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(D) \quad (1.1.8)$$

и

$$\|f\|_{(B_{p,\theta}^\alpha)'(D)} \leq \|f\|_{(\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)^l(D)}, \alpha \in \mathbb{R}_+^d, 1 \leq p < \infty, 1 \leq \theta \leq \infty, \\ D - \text{произвольная область в } \mathbb{R}^d. \quad (1.1.9)$$

Обозначим через $C^\infty(D)$ пространство бесконечно дифференцируемых функций в области $D \subset \mathbb{R}^d$, а через $C_0^\infty(D)$ – пространство функций $f \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$, у которых носитель $\text{supp } f \subset D$.

В заключение этого пункта введём ещё несколько обозначений. Для банахова пространства X (над $\mathbb{R}$) обозначим $B(X) = \{x \in X : \|x\|_X \leq 1\}$.

Для банаховых пространств X, Y через $\mathcal{B}(X, Y)$ обозначим банахово пространство, состоящее из непрерывных линейных операторов $T : X \mapsto Y$, с нормой

$$\|T\|_{\mathcal{B}(X,Y)} = \sup_{x \in B(X)} \|Tx\|_Y.$$

Отметим, что если $X = Y$, то $\mathcal{B}(X, Y)$ является банаховой алгеброй.

1.2. В этом пункте вводятся в рассмотрение пространства кусочно-полиномиальных функций и операторов в них, которые используются для построения средств приближения для функций из изучаемых нами пространств. Но сначала приведём некоторые вспомогательные сведения.

Введём в рассмотрение систему разбиений единицы, используемую для построения кусочно-полиномиальных функций из интересующих нас пространств. Для этого обозначим через $\psi^{1,0}$ характеристическую функцию интервала I , т.е. функцию, определяемую равенством

$$\psi^{1,0}(x) = \begin{cases} 1, & \text{для } x \in I; \\ 0, & \text{для } x \in \mathbb{R} \setminus I. \end{cases}$$

При $m \in \mathbb{N}$ положим

$$\psi^{1,m}(x) = \int_I \psi^{1,m-1}(x-y) dy (\text{см. [9]}),$$

а для $d \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z}_+^d$ определим

$$\psi^{d,m}(x) = \prod_{j=1}^d \psi^{1,m_j}(x_j), x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d.$$

Для $d \in \mathbb{N}, m, n \in \mathbb{Z}^d : m \leq n$, обозначим

$$\mathcal{N}_{m,n}^d = \{\nu \in \mathbb{Z}^d : m \leq \nu \leq n\} = \prod_{j=1}^d \mathcal{N}_{m_j, n_j}^1.$$

Опираясь на определения, используя индукцию, нетрудно проверить следующие свойства функций $\psi^{d,m}, d \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z}_+^d$.

1) При $d \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z}_+^d$

$$\text{sign } \psi^{d,m}(x) = \begin{cases} 1, & \text{для } x \in ((m + \mathbf{e})I^d); \\ 0, & \text{для } x \in \mathbb{R}^d \setminus ((m + \mathbf{e})I^d), \end{cases}$$

2) при $d \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z}_+^d$ для каждого $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d(m)$ (обобщённая) производная $\mathcal{D}^\lambda \psi^{d,m} \in L_\infty(\mathbb{R}^d)$,

3) при $d \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z}_+^d$ почти для всех $x \in \mathbb{R}^d$ справедливо равенство

$$\sum_{\nu \in \mathbb{Z}^d} \psi^{d,m}(x - \nu) = 1,$$

4) при $m \in \mathbb{N}$ для всех $x \in \mathbb{R}$ (при $m = 0$ почти для всех $x \in \mathbb{R}$) имеет место равенство

$$\psi^{1,m}(x) = \sum_{\mu \in \mathcal{N}_{0,m+1}^1} a_\mu^m \psi^{1,m}(2x - \mu), \quad (1.2.1)$$

где $a_\mu^m = 2^{-m} C_{m+1}^\mu$. Используя разложение Ньютона для $(1 + 1)^{m+1}$ и $(-1 + 1)^{m+1}$, легко проверить, что при $m \in \mathbb{Z}_+$ выполняются равенства

$$\sum_{\mu \in \mathcal{N}_{0,m+1}^1 \cap (2\mathbb{Z})} a_\mu^m = 1, \quad \sum_{\mu \in \mathcal{N}_{0,m+1}^1 \cap (2\mathbb{Z}+1)} a_\mu^m = 1. \quad (1.2.2)$$

При $d \in \mathbb{N}$ для $t \in \mathbb{R}^d$ через 2^t будем обозначать вектор $2^t = (2^{t_1}, \dots, 2^{t_d})$. Для $d \in \mathbb{N}, m, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, \nu \in \mathbb{Z}^d$ обозначим

$$g_{\kappa,\nu}^{d,m}(x) = \psi^{d,m}(2^\kappa x - \nu) = \prod_{j=1}^d \psi^{1,m_j}(2^{\kappa_j} x_j - \nu_j), x \in \mathbb{R}^d.$$

Из первого среди приведенных выше свойств функций $\psi^{d,m}$ следует, что при $d \in \mathbb{N}, m, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, \nu \in \mathbb{Z}^d$ носитель $\text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} = 2^{-\kappa} \nu + 2^{-\kappa} (m + \mathbf{e}) \bar{I}^d$. При $d \in \mathbb{N}, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, \nu \in \mathbb{Z}^d$ обозначим $Q_{\kappa,\nu}^d = 2^{-\kappa} \nu + 2^{-\kappa} I^d$, $\bar{Q}_{\kappa,\nu}^d = 2^{-\kappa} \nu + 2^{-\kappa} \bar{I}^d$.

Отметим некоторые полезные для нас свойства носителей функций $g_{\kappa,\nu}^{d,m}$.

При $d \in \mathbb{N}, m, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d$ для каждого $\nu' \in \mathbb{Z}^d$ имеет место равенство

$$\{\nu \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,\nu'}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset\} = \nu' + \mathcal{N}_{-m,0}^d. \quad (1.2.3)$$

Из свойства 3) функций $\psi^{d,m}$ вытекает, что при $d \in \mathbb{N}, m, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d$ для любой области $D \subset \mathbb{R}^d$ почти для всех $x \in D$ соблюдается равенство

$$\sum_{\nu \in \mathbb{Z}^d : \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \cap D \neq \emptyset} g_{\kappa,\nu}^{d,m}(x) = 1. \quad (1.2.4)$$

При $d \in \mathbb{N}$ для $x, y \in \mathbb{R}^d$ будем обозначать

$$(x, y) = \sum_{j=1}^d x_j y_j.$$

Имея в виду свойство 2) функций $\psi^{d,m}$, отметим, что при $d \in \mathbb{N}, m, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, \nu \in \mathbb{Z}^d, \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(m)$ выполняется равенство

$$\|\mathcal{D}^\lambda g_{\kappa,\nu}^{d,m}\|_{L_\infty(\mathbb{R}^d)} = 2^{(\kappa,\lambda)} \|\mathcal{D}^\lambda \psi^{d,m}\|_{L_\infty(\mathbb{R}^d)} = c_1(d, m, \lambda) 2^{(\kappa,\lambda)}. \quad (1.2.5)$$

Введем в рассмотрение следующие пространства кусочно-полиномиальных функций. При $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d, m \in \mathbb{N}^d, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d$ и области $D \subset \mathbb{R}^d$, полагая

$$N_\kappa^{d,m,D} = \{\nu \in \mathbb{Z}^d : \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \cap D \neq \emptyset\},$$

через $\mathcal{P}_\kappa^{d,l,m,D}$ обозначим линейное пространство, состоящее из функций $f : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$, для каждой из которых существует набор полиномов $\{f_\nu \in \mathcal{P}^{d,l}, \nu \in N_\kappa^{d,m,D}\}$ такой, что для $x \in \mathbb{R}^d$ выполняется равенство

$$f(x) = \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} f_\nu(x) g_{\kappa,\nu}^{d,m}(x). \quad (1.2.6)$$

Нетрудно проверить, что при $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d, m \in \mathbb{N}^d, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d$ и ограниченной области $D \subset \mathbb{R}^d$ отображение, которое каждому набору полиномов $\{f_\nu \in \mathcal{P}^{d,l}, \nu \in N_\kappa^{d,m,D}\}$ ставит в соответствие функцию f , задаваемую равенством (1.2.6), является изоморфизмом прямого произведения $\text{card } N_\kappa^{d,m,D}$ экземпляров пространства $\mathcal{P}_\kappa^{d,l}$ на пространство $\mathcal{P}_\kappa^{d,l,m,D}$.

Предложение 1.2.1

Пусть $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d, m \in \mathbb{N}^d, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, D$ – ограниченная область в $\mathbb{R}^d$. Тогда при $j = 1, \dots, d$ линейный оператор $H_\kappa^{j,d,l,m,D} : \mathcal{P}_\kappa^{d,l,m,D} \mapsto$

$\mathcal{P}_{\kappa+e_j}^{d,l,m,D}$, значение которого на функции $f \in \mathcal{P}_{\kappa}^{d,l,m,D}$, задаваемой равенством (1.2.6), определяется соотношением

$$(H_{\kappa}^{j,d,l,m,D}f)(x) = \sum_{\nu \in N_{\kappa+e_j}^{d,m,D}} \left(\sum_{\substack{\nu' \in N_{\kappa}^{d,m,D}, \mu_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1: \\ 2\nu'_j + \mu_j = \nu_j, \nu'_i = \nu_i, i=1, \dots, d, i \neq j}} a_{\mu_j}^{m_j} f_{\nu'}(x) \right) g_{\kappa+e_j, \nu}^{d,m}(x), x \in \mathbb{R}^d, \quad (1.2.7)$$

обладает тем свойством, что для $f \in \mathcal{P}_{\kappa}^{d,l,m,D}$ выполняется равенство

$$(H_{\kappa}^{j,d,l,m,D}f) \mid_D = f \mid_D. \quad (1.2.8)$$

Доказательство.

Прежде всего, заметим, что в условиях предложения для функции $f \in \mathcal{P}_{\kappa}^{d,l,m,D}$, задаваемой равенством (1.2.6), ввиду (1.2.1) при $x \in D$ имеет место равенство

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{\nu' \in N_{\kappa}^{d,m,D}} f_{\nu'}(x) \left(\prod_{i=1}^d \psi^{1,m_i}(2^{\kappa_i} x_i - \nu'_i) \right) = \\ &= \sum_{\nu' \in N_{\kappa}^{d,m,D}} f_{\nu'}(x) \left(\sum_{\mu_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1} a_{\mu_j}^{m_j} \psi^{1,m_j}(2^{\kappa_j+1} x_j - 2\nu'_j - \mu_j) \right) \prod_{i=1, \dots, d: i \neq j} \psi^{1,m_i}(2^{\kappa_i} x_i - \nu'_i) = \\ &= \sum_{\nu' \in N_{\kappa}^{d,m,D}} \sum_{\mu_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1} a_{\mu_j}^{m_j} f_{\nu'}(x) \psi^{1,m_j}(2^{\kappa_j+1} x_j - 2\nu'_j - \mu_j) \left(\prod_{i=1, \dots, d: i \neq j} \psi^{1,m_i}(2^{\kappa_i} x_i - \nu'_i) \right) = \\ &= \sum_{\nu' \in N_{\kappa}^{d,m,D}, \mu_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1} a_{\mu_j}^{m_j} f_{\nu'}(x) \psi^{1,m_j}(2^{\kappa_j+1} x_j - 2\nu'_j - \mu_j) \left(\prod_{i=1, \dots, d: i \neq j} \psi^{1,m_i}(2^{\kappa_i} x_i - \nu'_i) \right) = \\ &= \sum_{\nu \in \mathbb{Z}^d} \left(\sum_{\substack{\nu' \in N_{\kappa}^{d,m,D}, \mu_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1: \\ 2\nu'_j + \mu_j = \nu_j, \\ \nu'_i = \nu_i, i=1, \dots, d, i \neq j}} a_{\mu_j}^{m_j} f_{\nu'}(x) \psi^{1,m_j}(2^{\kappa_j+1} x_j - 2\nu'_j - \mu_j) \left(\prod_{i=1, \dots, d: i \neq j} \psi^{1,m_i}(2^{\kappa_i} x_i - \nu'_i) \right) \right) = \\ &= \sum_{\nu \in \mathbb{Z}^d} \left(\sum_{\substack{\nu' \in N_{\kappa}^{d,m,D}, \mu_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1: \\ 2\nu'_j + \mu_j = \nu_j, \\ \nu'_i = \nu_i, i=1, \dots, d, i \neq j}} a_{\mu_j}^{m_j} f_{\nu'}(x) \psi^{1,m_j}(2^{\kappa_j+1} x_j - \nu_j) \left(\prod_{i=1, \dots, d: i \neq j} \psi^{1,m_i}(2^{\kappa_i} x_i - \nu_i) \right) \right) = \\ &= \sum_{\nu \in \mathbb{Z}^d} \left(\sum_{\substack{\nu' \in N_{\kappa}^{d,m,D}, \mu_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1: \\ 2\nu'_j + \mu_j = \nu_j, \nu'_i = \nu_i, i=1, \dots, d, i \neq j}} a_{\mu_j}^{m_j} f_{\nu'}(x) \right) g_{\kappa+e_j, \nu}^{d,m}(x) = \end{aligned}$$

$$\sum_{\nu \in \mathbb{Z}^d: \text{supp } g_{\kappa+e_j, \nu}^{d,m} \cap D \neq \emptyset} \left(\sum_{\substack{\nu' \in N_{\kappa}^{d,m,D}, \mu_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1: \\ 2\nu'_j + \mu_j = \nu_j, \nu'_i = \nu_i, i=1, \dots, d, i \neq j}} a_{\mu_j}^{m_j} f_{\nu'}(x) \right) g_{\kappa+e_j, \nu}^{d,m}(x) =$$

$$\sum_{\nu \in N_{\kappa+e_j}^{d,m,D}} \left(\sum_{\substack{\nu' \in N_{\kappa}^{d,m,D}, \mu_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1: \\ 2\nu'_j + \mu_j = \nu_j, \nu'_i = \nu_i, i=1, \dots, d, i \neq j}} a_{\mu_j}^{m_j} f_{\nu'}(x) \right) g_{\kappa+e_j, \nu}^{d,m}(x).$$

Сопоставляя последнее равенство с (1.2.7), приходим к (1.2.8). $\square$

Замечание.

В условиях предложения 1.2.1 при $j = 1, \dots, d$, если для $\nu \in N_{\kappa+e_j}^{d,m,D}$, $\mu_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1$ существует $\nu' \in \mathbb{Z}^d$, для которого $2\nu'_j + \mu_j = \nu_j$, $\nu'_i = \nu_i$, $i = 1, \dots, d : i \neq j$, то для такого ν' справедливо включение $\nu' \in N_{\kappa}^{d,m,D}$.

В самом деле, при соблюдении условий замечания, выбирая $x \in D \cap \text{supp } g_{\kappa+e_j, \nu}^{d,m}$, получаем, что

$$2^{-\kappa_i} \nu_i \leq x_i \leq 2^{-\kappa_i} \nu_i + 2^{-\kappa_i} (m_i + 1); \text{ при } i = 1, \dots, d : i \neq j,$$

$$2^{-(\kappa_j+1)} \nu_j \leq x_j \leq 2^{-(\kappa_j+1)} \nu_j + 2^{-(\kappa_j+1)} (m_j + 1),$$

откуда

$$2^{-\kappa_i} \nu'_i \leq x_i \leq 2^{-\kappa_i} \nu'_i + 2^{-\kappa_i} (m_i + 1); \text{ при } i = 1, \dots, d : i \neq j,$$

$$2^{-\kappa_j} \nu'_j = 2^{-\kappa_j} (\nu_j - \mu_j) / 2 = 2^{-(\kappa_j+1)} \nu_j - 2^{-(\kappa_j+1)} \mu_j \leq$$

$$2^{-(\kappa_j+1)} \nu_j \leq x_j \leq 2^{-(\kappa_j+1)} \nu_j + 2^{-(\kappa_j+1)} (m_j + 1) =$$

$$2^{-\kappa_j} (\nu_j - \mu_j) / 2 + 2^{-(\kappa_j+1)} \mu_j + 2^{-(\kappa_j+1)} (m_j + 1) =$$

$$2^{-\kappa_j} \nu'_j + 2^{-\kappa_j} (\mu_j + m_j + 1) / 2 \leq 2^{-\kappa_j} \nu'_j + 2^{-\kappa_j} (m_j + 1),$$

т.е. $x \in D \cap \text{supp } g_{\kappa, \nu'}^{d,m}$, а, значит, $\nu' \in N_{\kappa}^{d,m,D}$.

При $m \in \mathbb{N}^d$, $\mathfrak{k} \in \mathbb{Z}_+^d$, $\nu \in \mathbb{Z}^d$ обозначим через $\mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}^m(\nu)$ множество наборов чисел

$$\mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}^m(\nu) = \{\mathfrak{m}^{\mathfrak{k}} = \{\mathfrak{m}_{j,s_j} \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1, s_j = 1, \dots, \mathfrak{k}_j, j \in f(\mathfrak{k})\} :$$

$$\nu_j 2^{-\mathfrak{k}_j} - \sum_{s_j=1}^{\mathfrak{k}_j} \mathfrak{m}_{j,\mathfrak{k}_j-s_j+1} 2^{-(\mathfrak{k}_j-s_j+1)} \in \mathbb{Z} \forall \mathfrak{k}_j = 1, \dots, \mathfrak{k}_j, j \in f(\mathfrak{k})\}$$

и каждой паре $\nu \in \mathbb{Z}^d$, $\mathfrak{m}^{\mathfrak{k}} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}^m(\nu)$ сопоставим $\mathfrak{n}_{\mathfrak{k}}(\nu, \mathfrak{m}^{\mathfrak{k}}) \in \mathbb{Z}^d$, полагая

$$(\mathfrak{n}_{\mathfrak{k}}(\nu, \mathfrak{m}^{\mathfrak{k}}))_j = \begin{cases} \nu_j 2^{-\mathfrak{k}_j} - \sum_{s_j=1}^{\mathfrak{k}_j} \mathfrak{m}_{j,\mathfrak{k}_j-s_j+1} 2^{-(\mathfrak{k}_j-s_j+1)}, j \in f(\mathfrak{k}); \\ \nu_j, j \in \{1, \dots, d\} \setminus f(\mathfrak{k}). \end{cases}$$

Для формулировки следующего утверждения при $d \in \mathbb{N}$ для $j \in \{1, \dots, d\}$ обозначим через $\eta^j : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}^d$ отображение, определяемое соотношением

$$(\eta^j(\xi, x))_i = \begin{cases} \xi_i, & i = 1, \dots, j; \\ x_i, & i = j+1, \dots, d, \end{cases} \quad \xi, x \in \mathbb{R}^d.$$

Предложение 1.2.2

Пусть $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d, m \in \mathbb{N}^d, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, \kappa' \in \mathbb{Z}_+^d : \kappa' \leq \kappa, D$ – ограниченная область в $\mathbb{R}^d$. Тогда линейный оператор $H_{\kappa, \kappa'}^{d, l, m, D} : \mathcal{P}_{\kappa'}^{d, l, m, D} \mapsto \mathcal{P}_{\kappa}^{d, l, m, D}$, значение которого для $f \in \mathcal{P}_{\kappa'}^{d, l, m, D}$ определяется равенством

$$H_{\kappa, \kappa'}^{d, l, m, D} f = \begin{cases} f, & \text{при } \kappa' = \kappa; \\ (\prod_{j \in f(\mathfrak{k})} (\prod_{\ell_j=1}^{\mathfrak{k}_j} H_{\eta^j(\kappa', \kappa) + (\mathfrak{k}_j - \ell_j)e_j}^{j, d, l, m, D})) f, & \text{при } \kappa' \neq \kappa, \end{cases} \quad \text{где } \mathfrak{k} = \kappa - \kappa', \quad (1.2.9)$$

обладает следующими свойствами:

1) для $f \in \mathcal{P}_{\kappa'}^{d, l, m, D}$ выполняется равенство

$$(H_{\kappa, \kappa'}^{d, l, m, D} f) \mid_D = f \mid_D; \quad (1.2.10)$$

2) для $f \in \mathcal{P}_{\kappa'}^{d, l, m, D}$ вида

$$f = \sum_{\nu' \in N_{\kappa'}^{d, m, D}} f_{\kappa', \nu'} g_{\kappa', \nu'}^{d, m}, \{f_{\kappa', \nu'} \in \mathcal{P}^{d, l}, \nu' \in N_{\kappa'}^{d, m, D}\}, \quad (1.2.11)$$

имеет место представление

$$H_{\kappa, \kappa'}^{d, l, m, D} f = \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d, m, D}} f_{\kappa, \nu} g_{\kappa, \nu}^{d, m}, \quad (1.2.12)$$

где

$$f_{\kappa, \nu} = \sum_{\mathfrak{m}^{\mathfrak{k}} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}^m(\nu)} \left(\prod_{i \in f(\mathfrak{k})} \left(\prod_{s_i=1}^{\mathfrak{k}_i} a_{\mathfrak{m}_i, s_i}^{m_i} \right) \right) f_{\kappa', \mathfrak{n}_{\mathfrak{k}}(\nu, \mathfrak{m}^{\mathfrak{k}})} = \sum_{\mathfrak{m}^{\mathfrak{k}} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^{\mathfrak{k}}}^m f_{\kappa', \mathfrak{n}_{\mathfrak{k}}(\nu, \mathfrak{m}^{\mathfrak{k}})}, \nu \in N_{\kappa}^{d, m, D}, \quad (1.2.13)$$

а

$$A_{\mathfrak{m}^{\mathfrak{k}}}^m = \left(\prod_{i \in f(\mathfrak{k})} \left(\prod_{s_i=1}^{\mathfrak{k}_i} a_{\mathfrak{m}_i, s_i}^{m_i} \right) \right), \mathfrak{m}^{\mathfrak{k}} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}^m(\nu).$$

Доказательство.

Для получения (1.2.10) достаточно, принимая во внимание (1.2.9), последовательно применить (1.2.8).

Далее, покажем, что при любых $\kappa' \in \mathbb{Z}_+^d, \kappa = \kappa' + e_j, j = 1, \dots, d$, выполняются равенства (1.2.12), (1.2.13). Действительно, в этих условиях для $f \in \mathcal{P}_{\kappa'}^{d,l,m,D}$ вида (1.2.11), благодаря (1.2.9), (1.2.7), имеем

$$\begin{aligned} H_{\kappa'+e_j, \kappa'}^{d,l,m,D} f &= H_{\kappa'}^{j,d,l,m,D} f = \\ &= \sum_{\nu \in N_{\kappa'+e_j}^{d,m,D}} \left(\sum_{\substack{\nu' \in N_{\kappa'}^{d,m,D}, \mathbf{m}_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1: \\ 2\nu'_j + \mathbf{m}_j = \nu_j, \nu'_i = \nu_i, i=1, \dots, d, i \neq j}} a_{\mathbf{m}_j}^{m_j} f_{\kappa', \nu'} \right) g_{\kappa'+e_j, \nu}^{d,m} = \sum_{\nu \in N_{\kappa'+e_j}^{d,m,D}} f_{\kappa'+e_j, \nu} g_{\kappa'+e_j, \nu}^{d,m}, \end{aligned} \quad (1.2.14)$$

причем для $\nu \in N_{\kappa'+e_j}^{d,m,D}$ в силу замечания после предложения 1.2.1 соблюдается равенство

$$\begin{aligned} f_{\kappa'+e_j, \nu} &= \sum_{\substack{\nu' \in N_{\kappa'}^{d,m,D}, \mathbf{m}_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1: \\ 2\nu'_j + \mathbf{m}_j = \nu_j, \nu'_i = \nu_i, i=1, \dots, d, i \neq j}} a_{\mathbf{m}_j}^{m_j} f_{\kappa', \nu'} = \\ &= \sum_{\substack{\nu' \in \mathbb{Z}^d, \mathbf{m}_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1: \\ (\nu_j - \mathbf{m}_j)/2 \in \mathbb{Z}, \nu'_j = (\nu_j - \mathbf{m}_j)/2, \nu'_i = \nu_i, i=1, \dots, d, i \neq j}} a_{\mathbf{m}_j}^{m_j} f_{\kappa', \nu'} = \\ &= \sum_{\substack{\mathbf{m}_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1: (\nu_j - \mathbf{m}_j)/2 \in \mathbb{Z}}} \sum_{\substack{\nu' \in \mathbb{Z}^d: \\ \nu'_j = (\nu_j - \mathbf{m}_j)/2, \nu'_i = \nu_i, i=1, \dots, d, i \neq j}} a_{\mathbf{m}_j}^{m_j} f_{\kappa', \nu'} = \\ &= \sum_{\mathbf{m}^{e_j} \in \mathfrak{M}_{e_j}^m(\nu)} a_{\mathbf{m}_{j,1}}^{m_j} f_{\kappa', \mathbf{n}_{e_j}(\nu, \mathbf{m}^{e_j})}, \end{aligned} \quad (1.2.15)$$

т.е. имеют место (1.2.12), (1.2.13) при $\kappa = \kappa' + e_j, j = 1, \dots, d$.

Теперь установим, что если для $\kappa, \kappa' \in \mathbb{Z}_+^d$ таких, что $\mathfrak{k} = \kappa - \kappa' \in \mathbb{Z}_+^d$, соблюдаются равенства (1.2.12), (1.2.13), то при $j = 1, \dots, d$ для $f \in \mathcal{P}_{\kappa'}^{d,l,m,D}$ вида (1.2.11) имеет место представление

$$H_{\kappa}^{j,d,l,m,D} (H_{\kappa, \kappa'}^{d,l,m,D} f) = \sum_{\nu \in N_{\kappa+e_j}^{d,m,D}} f_{\kappa+e_j, \nu} g_{\kappa+e_j, \nu}^{d,m}, \quad (1.2.16)$$

где

$$f_{\kappa+e_j, \nu} = \sum_{\mathbf{m}^{\mathfrak{k}+e_j} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}+e_j}^m(\nu)} \left(\prod_{i \in I(\mathfrak{k}+e_j)} \left(\prod_{s_i=1}^{(\mathfrak{k}+e_j)_i} a_{\mathbf{m}_{i,s_i}}^{m_i} \right) \right) f_{\kappa', \mathbf{n}_{\mathfrak{k}+e_j}(\nu, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}+e_j})}, \nu \in N_{\kappa+e_j}^{d,m,D}. \quad (1.2.17)$$

В самом деле, для $\kappa, \kappa' \in \mathbb{Z}_+^d : \mathfrak{k} = \kappa - \kappa' \in \mathbb{Z}_+^d$, для которых выполняются (1.2.12), (1.2.13), при $j = 1, \dots, d$ для f вида (1.2.11) с учетом (1.2.12), (1.2.7) имеем

$$H_{\kappa}^{j,d,l,m,D}(H_{\kappa,\kappa'}^{d,l,m,D}f) = \sum_{\nu \in N_{\kappa+e_j}^{d,m,D}} \left(\sum_{\substack{\rho \in N_{\kappa}^{d,m,D}, \mathfrak{m}_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1: \\ 2\rho_j + \mathfrak{m}_j = \nu_j, \rho_i = \nu_i, i=1, \dots, d, i \neq j}} a_{\mathfrak{m}_j}^{m_j} f_{\kappa,\rho} \right) g_{\kappa+e_j,\nu}^{d,m} = \sum_{\nu \in N_{\kappa+e_j}^{d,m,D}} f_{\kappa+e_j,\nu} g_{\kappa+e_j,\nu}^{d,m},$$

причем при $j = 1, \dots, d$ для $\nu \in N_{\kappa+e_j}^{d,m,D}$ вследствие замечания после предложения 1.2.1, а также в силу (1.2.13) выполняется равенство

$$\begin{aligned} f_{\kappa+e_j,\nu} &= \sum_{\substack{\rho \in N_{\kappa}^{d,m,D}, \mathfrak{m}_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1: \\ 2\rho_j + \mathfrak{m}_j = \nu_j, \rho_i = \nu_i, i=1, \dots, d, i \neq j}} a_{\mathfrak{m}_j}^{m_j} f_{\kappa,\rho} = \\ &= \sum_{\substack{\rho \in \mathbb{Z}^d, \mathfrak{m}_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1: \\ (\nu_j - \mathfrak{m}_j)/2 \in \mathbb{Z}, \rho_j = (\nu_j - \mathfrak{m}_j)/2, \rho_i = \nu_i, i=1, \dots, d, i \neq j}} a_{\mathfrak{m}_j}^{m_j} f_{\kappa,\rho} = \\ &= \sum_{\substack{\mathfrak{m}_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1: (\nu_j - \mathfrak{m}_j)/2 \in \mathbb{Z}}} \sum_{\substack{\rho \in \mathbb{Z}^d: \\ \rho_j = (\nu_j - \mathfrak{m}_j)/2, \rho_i = \nu_i, i=1, \dots, d, i \neq j}} a_{\mathfrak{m}_j}^{m_j} f_{\kappa,\rho} = \\ &= \sum_{\substack{\mathfrak{m}_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1: (\nu_j - \mathfrak{m}_j)/2 \in \mathbb{Z}}} \sum_{\substack{\rho \in \mathbb{Z}^d: \\ \rho_j = (\nu_j - \mathfrak{m}_j)/2, \rho_i = \nu_i, i=1, \dots, d, i \neq j}} a_{\mathfrak{m}_j}^{m_j} \left(\sum_{\mathfrak{m}^{\mathfrak{k}} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}^m(\rho)} \left(\prod_{i \in f(\mathfrak{k})} \left(\prod_{s_i=1}^{\mathfrak{k}_i} a_{\mathfrak{m}_i, s_i}^{m_i} \right) \right) f_{\kappa', \mathfrak{n}_{\mathfrak{k}}(\rho, \mathfrak{m}^{\mathfrak{k}})} \right). \end{aligned} \quad (1.2.18)$$

Пользуясь тем, что при $j = 1, \dots, d$ для $\nu \in N_{\kappa+e_j}^{d,m,D}$, $\mathfrak{m}_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1 : (\nu_j - \mathfrak{m}_j)/2 \in \mathbb{Z}$, $\rho \in \mathbb{Z}^d : \rho_j = (\nu_j - \mathfrak{m}_j)/2$, $\rho_i = \nu_i$, $i = 1, \dots, d$, $i \neq j$, множество

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}^m(\rho) &= \{\mathfrak{m}^{\mathfrak{k}} = \{\mathfrak{m}_{i,s_i} \in \mathcal{N}_{0,m_i+1}^1, s_i = 1, \dots, \mathfrak{k}_i, i \in f(\mathfrak{k})\} : \\ &\quad \rho_i 2^{-\mathfrak{k}_i} - \sum_{s_i=1}^{\mathfrak{k}_i} \mathfrak{m}_{i,\mathfrak{k}_i-s_i+1} 2^{-(\mathfrak{k}_i-s_i+1)} \in \mathbb{Z} \ \forall \mathfrak{k}_i = 1, \dots, \mathfrak{k}_i, i \in f(\mathfrak{k})\} = \\ &= \{\mathfrak{m}^{\mathfrak{k}} = \{\mathfrak{m}_{i,s_i} \in \mathcal{N}_{0,m_i+1}^1, s_i = 1, \dots, \mathfrak{k}_i, i \in f(\mathfrak{k})\} : \nu_i 2^{-\mathfrak{k}_i} - \sum_{s_i=1}^{\mathfrak{k}_i} \mathfrak{m}_{i,\mathfrak{k}_i-s_i+1} 2^{-(\mathfrak{k}_i-s_i+1)} \in \mathbb{Z} \\ &\quad \forall \mathfrak{k}_i = 1, \dots, \mathfrak{k}_i, i \in f(\mathfrak{k}) \setminus \{j\}, \nu_j 2^{-\mathfrak{k}_j-1} - \mathfrak{m}_j 2^{-\mathfrak{k}_j-1} - \sum_{s_j=1}^{\mathfrak{k}_j} \mathfrak{m}_{j,\mathfrak{k}_j-s_j+1} 2^{-(\mathfrak{k}_j-s_j+1)} \in \mathbb{Z} \\ &\quad \forall \mathfrak{k}_j = 1, \dots, \mathfrak{k}_j, j \in f(\mathfrak{k})\} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \{\mathbf{m}^{\mathfrak{k}} = \{\mathbf{m}_{i,s_i} \in \mathcal{N}_{0,m_i+1}^1, s_i = 1, \dots, \mathfrak{k}_i, i \in f(\mathfrak{k})\} : \nu_i 2^{-\mathfrak{k}_i} - \sum_{s_i=1}^{\mathfrak{k}_i} \mathbf{m}_{i,\mathfrak{k}_i-s_i+1} 2^{-(\mathfrak{k}_i-s_i+1)} \in \mathbb{Z} \\ \forall \mathfrak{k}_i = 1, \dots, \mathfrak{k}_i, i \in f(\mathfrak{k}) \setminus \{j\}, \nu_j 2^{-\mathfrak{k}'_j} - \mathbf{m}_j 2^{-\mathfrak{k}'_j} - \sum_{s'_j=2}^{\mathfrak{k}'_j} \mathbf{m}_{j,\mathfrak{k}'_j+1-s'_j+1} 2^{-(\mathfrak{k}'_j-s'_j+1)} \in \mathbb{Z} \\ \forall \mathfrak{k}'_j = 2, \dots, \mathfrak{k}_j + 1, j \in f(\mathfrak{k})\}, \end{aligned}$$

а для $\mathbf{m}^{\mathfrak{k}} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}^m(\rho)$ мультииндекс $\mathbf{n}_{\mathfrak{k}}(\rho, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}})$ имеет компоненты

$$\begin{aligned} (\mathbf{n}_{\mathfrak{k}}(\rho, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}}))_i &= \begin{cases} \rho_i 2^{-\mathfrak{k}_i} - \sum_{s_i=1}^{\mathfrak{k}_i} \mathbf{m}_{i,\mathfrak{k}_i-s_i+1} 2^{-(\mathfrak{k}_i-s_i+1)}, i \in f(\mathfrak{k}); \\ \rho_i, i \in \{1, \dots, d\} \setminus f(\mathfrak{k}) \end{cases} = \\ & \begin{cases} \begin{cases} \nu_i 2^{-\mathfrak{k}_i} - \sum_{s_i=1}^{\mathfrak{k}_i} \mathbf{m}_{i,\mathfrak{k}_i-s_i+1} 2^{-(\mathfrak{k}_i-s_i+1)}, i \in f(\mathfrak{k}) \setminus \{j\}; \\ \nu_i, i \in \{1, \dots, d\} \setminus f(\mathfrak{k}); \\ \nu_i 2^{-\mathfrak{k}_i-1} - \mathbf{m}_i 2^{-\mathfrak{k}_i-1} - \sum_{s_i=1}^{\mathfrak{k}_i} \mathbf{m}_{i,\mathfrak{k}_i-s_i+1} 2^{-(\mathfrak{k}_i-s_i+1)}, i = j, \end{cases} & \text{при } j \in f(\mathfrak{k}); \\ \begin{cases} \nu_i 2^{-\mathfrak{k}_i} - \sum_{s_i=1}^{\mathfrak{k}_i} \mathbf{m}_{i,\mathfrak{k}_i-s_i+1} 2^{-(\mathfrak{k}_i-s_i+1)}, i \in f(\mathfrak{k}); \\ \nu_i, i \in (\{1, \dots, d\} \setminus f(\mathfrak{k})) \setminus \{j\}; \\ (\nu_i - \mathbf{m}_i)/2, i = j, \end{cases} & \text{при } j \in (\{1, \dots, d\} \setminus f(\mathfrak{k})), \end{cases} = \\ & (\mathbf{n}_{\mathfrak{k}+e_j}(\nu, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}+e_j}))_i, i = 1, \dots, d, \text{ при} \\ & \mathbf{m}^{\mathfrak{k}+e_j} = (\mathbf{m}^{\mathfrak{k}}, \mathbf{m}_j) = \\ & \begin{cases} \{\mathbf{m}_{i,s_i}, s_i = 1, \dots, \mathfrak{k}_i, i \in f(\mathfrak{k}), \mathbf{m}_{j,\mathfrak{k}_j+1} = \mathbf{m}_j\}, j \in f(\mathfrak{k}); \\ \{\mathbf{m}_{i,s_i}, s_i = 1, \dots, \mathfrak{k}_i, i \in f(\mathfrak{k}), \mathbf{m}_{j,1} = \mathbf{m}_j\}, j \in \{1, \dots, d\} \setminus f(\mathfrak{k}), \end{cases} \end{aligned}$$

причем $\mathbf{m}^{\mathfrak{k}+e_j} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}+e_j}^m(\nu)$, из (1.2.18) получаем, что

$$\begin{aligned} f_{\kappa+e_j, \nu} &= \\ & \sum_{\mathbf{m}_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1 : (\nu_j - \mathbf{m}_j)/2 \in \mathbb{Z}} a_{\mathbf{m}_j}^{m_j} \left(\sum_{\mathbf{m}^{\mathfrak{k}} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}^m(\rho) | \rho = \nu - ((\nu_j + \mathbf{m}_j)/2)e_j} \left(\prod_{i \in f(\mathfrak{k})} \left(\prod_{s_i=1}^{\mathfrak{k}_i} a_{\mathbf{m}_{i,s_i}}^{m_i} \right) \right) f_{\kappa', \mathbf{n}_{\mathfrak{k}+e_j}(\nu, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}+e_j})} \right) = \\ & \sum_{\mathbf{m}_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1 : (\nu_j - \mathbf{m}_j)/2 \in \mathbb{Z}} \sum_{\mathbf{m}^{\mathfrak{k}} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}^m(\rho) | \rho = \nu - ((\nu_j + \mathbf{m}_j)/2)e_j} a_{\mathbf{m}_j}^{m_j} \left(\prod_{i \in f(\mathfrak{k})} \left(\prod_{s_i=1}^{\mathfrak{k}_i} a_{\mathbf{m}_{i,s_i}}^{m_i} \right) \right) f_{\kappa', \mathbf{n}_{\mathfrak{k}+e_j}(\nu, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}+e_j})} = \\ & \sum_{(\mathbf{m}^{\mathfrak{k}}, \mathbf{m}_j) | \mathbf{m}_j \in \mathcal{N}_{0,m_j+1}^1 : (\nu_j - \mathbf{m}_j)/2 \in \mathbb{Z}, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}^m(\rho) | \rho = \nu - ((\nu_j + \mathbf{m}_j)/2)e_j} a_{\mathbf{m}_j}^{m_j} \left(\prod_{i \in f(\mathfrak{k})} \left(\prod_{s_i=1}^{\mathfrak{k}_i} a_{\mathbf{m}_{i,s_i}}^{m_i} \right) \right) f_{\kappa', \mathbf{n}_{\mathfrak{k}+e_j}(\nu, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}+e_j})} = \end{aligned}$$

$$\sum_{\mathbf{m}^{\mathfrak{k}+e_j} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}+e_j}^m(\nu)} \left(\prod_{i \in f(\mathfrak{k}+e_j)} \left(\prod_{s_i=1}^{(\mathfrak{k}+e_j)_i} a_{\mathbf{m}_i, s_i}^{m_i} \right) \right) f_{\kappa', \mathbf{n}_{\mathfrak{k}+e_j}(\nu, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}+e_j})}, \nu \in N_{\kappa+e_j}^{d,m,D}..$$

Тем самым установлено соблюдение (1.2.16), (1.2.17) при выполнении указанных выше условий.

Для завершения доказательства справедливости (1.2.12), (1.2.13) в общей ситуации достаточно для $\kappa', \kappa \in \mathbb{Z}_+^d : \kappa' \leq \kappa$, исходя из (1.2.9), выбрать последовательности $\kappa^i \in \mathbb{Z}_+^d, j_i \in \mathcal{N}_{1,d}^1, i = 0, \dots, K$ при $K = \sum_{j=1}^d \kappa_j - \kappa'_j$, для которых выполняются условия

$$\kappa^0 = \kappa', \kappa^K = \kappa,$$

$$H_{\kappa^{i+1}, \kappa'}^{d,l,m,D} = H_{\kappa^i}^{j_i, d, l, m, D} H_{\kappa^i, \kappa'}^{d, l, m, D} (\kappa^{i+1} = \kappa^i + e_{j_i}), i = 0, \dots, K-1, \quad (1.2.19)$$

и применить (1.2.14), (1.2.15), а затем соответствующее число раз – (1.2.19), (1.2.16), (1.2.17). $\square$

Лемма 1.2.3

При $d \in \mathbb{N}, \nu \in \mathbb{Z}^d, \mathfrak{k} \in \mathbb{Z}_+^d, m \in \mathbb{N}^d$ имеет место равенство

$$\sum_{\mathbf{m}^{\mathfrak{k}} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}^m(\nu)} \prod_{i \in f(\mathfrak{k})} \left(\prod_{s_i=1}^{\mathfrak{k}_i} a_{\mathbf{m}_i, s_i}^{m_i} \right) = 1. \quad (1.2.20)$$

Доказательство.

Поскольку в условиях леммы множество $\mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}^m(\nu)$ представляется в виде

$$\mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}^m(\nu) = \{\mathbf{m}^{\mathfrak{k}} = \{\mathbf{m}_{j, s_j} \in \mathcal{N}_{0, m_j+1}^1, s_j = 1, \dots, \mathfrak{k}_j, j \in f(\mathfrak{k})\} :$$

$$\nu_j 2^{-\iota_j} - \sum_{s_j=1}^{\iota_j} \mathbf{m}_{j, \mathfrak{k}_j - s_j + 1} 2^{-(\iota_j - s_j + 1)} \in \mathbb{Z} \forall \iota_j = 1, \dots, \mathfrak{k}_j, j \in f(\mathfrak{k})\} =$$

$$\prod_{j \in \S(\mathfrak{k})} \{ \{\mathbf{m}_{j, s_j} \in \mathcal{N}_{0, m_j+1}^1, s_j = 1, \dots, \mathfrak{k}_j\} : \nu_j 2^{-\iota_j} - \sum_{s_j=1}^{\iota_j} \mathbf{m}_{j, \mathfrak{k}_j - s_j + 1} 2^{-(\iota_j - s_j + 1)} \in \mathbb{Z}$$

$$\forall \iota_j = 1, \dots, \mathfrak{k}_j\} = \prod_{j \in f(\mathfrak{k})} \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}_j}^{m_j}(\nu_j),$$

то

$$\sum_{\mathbf{m}^{\mathfrak{k}} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}^m(\nu)} \prod_{i \in f(\mathfrak{k})} \left(\prod_{s_i=1}^{\mathfrak{k}_i} a_{\mathbf{m}_i, s_i}^{m_i} \right) = \sum_{\{\{\mathbf{m}_i, s_i, s_i=1, \dots, \mathfrak{k}_i\}, i \in f(\mathfrak{k})\} \in \prod_{i \in f(\mathfrak{k})} \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}_i}^{m_i}(\nu_i)} \prod_{i \in f(\mathfrak{k})} \left(\prod_{s_i=1}^{\mathfrak{k}_i} a_{\mathbf{m}_i, s_i}^{m_i} \right) =$$

$$\prod_{i \in f(\mathfrak{k})} \left(\sum_{\{\mathfrak{m}_i, s_i, s_i=1, \dots, \mathfrak{k}_i\} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}_i}^{m_i}(\nu_i)} \left(\prod_{s_i=1}^{\mathfrak{k}_i} a_{\mathfrak{m}_i, s_i}^{m_i} \right) \right).$$

Отсюда видим, что (1.2.20) достаточно установить в случае $d = 1$. В этом случае при $\nu \in \mathbb{Z}, \mathfrak{k} \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}$, меняя индексацию, имеем

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{\mathfrak{k}}^m(\nu) &= \sum_{\{\mathfrak{m}_s, s=1, \dots, \mathfrak{k}\} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}^m(\nu)} \left(\prod_{s=1}^{\mathfrak{k}} a_{\mathfrak{m}_s}^m \right) = \\ &= \sum_{\{\mathfrak{m}_s \in \mathcal{N}_{0, m+1}^1, s=1, \dots, \mathfrak{k}\} : \nu 2^{-\mathfrak{k}} - \sum_{s=1}^{\mathfrak{k}} \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}-s+1} 2^{-(\mathfrak{k}-s+1)} \in \mathbb{Z} \forall \mathfrak{l}=1, \dots, \mathfrak{k}} \left(\prod_{s=1}^{\mathfrak{k}} a_{\mathfrak{m}_s}^m \right) = \\ &= \sum_{\substack{\{\mathfrak{m}_s \in \mathcal{N}_{0, m+1}^1, s=1, \dots, \mathfrak{k}-1\}, \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}} \in \mathcal{N}_{0, m+1}^1 : \\ (\nu - \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}})/2 \in \mathbb{Z}, \nu 2^{-\mathfrak{k}} - \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}} 2^{-\mathfrak{k}} - \sum_{s=2}^{\mathfrak{k}} \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}-s+1} 2^{-(\mathfrak{k}-s+1)} \in \mathbb{Z} \forall \mathfrak{l}=2, \dots, \mathfrak{k}}} \left(\prod_{s=1}^{\mathfrak{k}} a_{\mathfrak{m}_s}^m \right) = \\ &= \sum_{\substack{\{\mathfrak{m}_s \in \mathcal{N}_{0, m+1}^1, s=1, \dots, \mathfrak{k}-1\}, \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}} \in \mathcal{N}_{0, m+1}^1 : \\ (\nu - \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}})/2 \in \mathbb{Z}, ((\nu - \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}})/2) 2^{-\mathfrak{k}'} - \sum_{s'=1}^{\mathfrak{k}'} \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}-1-s'+1} 2^{-(\mathfrak{k}'-s'+1)} \in \mathbb{Z} \forall \mathfrak{l}'=1, \dots, \mathfrak{k}-1}} \left(\prod_{s=1}^{\mathfrak{k}-1} a_{\mathfrak{m}_s}^m \right) a_{\mathfrak{m}_{\mathfrak{k}}}^m = \\ &= \sum_{\substack{\mathfrak{m}_{\mathfrak{k}} \in \mathcal{N}_{0, m+1}^1 : (\nu - \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}})/2 \in \mathbb{Z}}} a_{\mathfrak{m}_{\mathfrak{k}}}^m \sum_{\substack{\{\mathfrak{m}_s \in \mathcal{N}_{0, m+1}^1, s=1, \dots, \mathfrak{k}-1\} : \\ ((\nu - \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}})/2) 2^{-\mathfrak{k}'} - \sum_{s'=1}^{\mathfrak{k}'} \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}-1-s'+1} 2^{-(\mathfrak{k}'-s'+1)} \in \mathbb{Z} \forall \mathfrak{l}'=1, \dots, \mathfrak{k}-1}} \left(\prod_{s=1}^{\mathfrak{k}-1} a_{\mathfrak{m}_s}^m \right) = \\ &= \sum_{\substack{\mathfrak{m}_{\mathfrak{k}} \in \mathcal{N}_{0, m+1}^1 : (\nu - \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}})/2 \in \mathbb{Z}}} a_{\mathfrak{m}_{\mathfrak{k}}}^m \mathcal{A}_{\mathfrak{k}-1}^m((\nu - \mathfrak{m}_{\mathfrak{k}})/2). \quad (1.2.21) \end{aligned}$$

Учитывая, что в силу (1.2.2) при $m \in \mathbb{N}$ для любого $\nu \in \mathbb{Z}$ справедливо равенство

$$\mathcal{A}_1^m(\nu) = \sum_{\mathfrak{m} \in \mathcal{N}_{0, m+1}^1 : (\nu - \mathfrak{m})/2 \in \mathbb{Z}} a_{\mathfrak{m}}^m = \sum_{\mathfrak{m} \in \mathcal{N}_{0, m+1}^1 : \mathfrak{m} \in (\nu + 2\mathbb{Z})} a_{\mathfrak{m}}^m = 1,$$

используя (1.2.21) и (1.2.2), по индукции относительно $\mathfrak{k}$ получаем, что $\mathcal{A}_{\mathfrak{k}}^m(\nu) = 1, m, \mathfrak{k} \in \mathbb{N}, \nu \in \mathbb{Z}$, что завершает вывод (1.2.20). $\square$

1.3. В этом пункте определяются средства приближения функций из рассматриваемых нами пространств.

Для формулировки предложения 1.3.1 потребуются следующие обозначения. При $d \in \mathbb{N}, l, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, \nu \in \mathbb{Z}^d$ определим линейный оператор $S_{\kappa, \nu}^{d, l} : L_1(Q_{\kappa, \nu}^d) \mapsto \mathcal{P}^{d, l}$, полагая $S_{\kappa, \nu}^{d, l} = P_{\delta, x^0}^{d, l}$ при $\delta = 2^{-\kappa}, x^0 = 2^{-\kappa}\nu$ (см. лемму 1.1.2). Отметим, что в ситуации, когда $Q_{\kappa, \nu}^d \subset D$, где D – область в $\mathbb{R}^d$, для $f \in L_1(D)$ вместо $S_{\kappa, \nu}^{d, l}(f|_{Q_{\kappa, \nu}^d})$ будем писать $S_{\kappa, \nu}^{d, l}f$.

Для области $D \subset \mathbb{R}^d$ и $\kappa \in \mathbb{Z}_+^d$ таких, что множество

$$\{\nu' \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, \nu'}^d \subset D\} \neq \emptyset, \quad (1.3.1)$$

для каждого $\nu \in \mathbb{Z}^d$ фиксируем некоторый $\nu_\kappa^D(\nu) \in \mathbb{Z}^d$, для которого $Q_{\kappa, \nu_\kappa^D(\nu)}^d \subset D$, а

$$\|\nu - \nu_\kappa^D(\nu)\|_{l_\infty^d} = \min_{\nu' \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, \nu'}^d \subset D} \|\nu - \nu'\|_{l_\infty^d},$$

и при $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d, m \in \mathbb{N}^d$ для ограниченной области $D \subset \mathbb{R}^d$ и $\kappa \in \mathbb{Z}_+^d$, удовлетворяющих (1.3.1), определим линейный непрерывный оператор $E_\kappa^{d, l, m, D} : L_1(D) \mapsto \mathcal{P}_\kappa^{d, l, m, D} \cap L_\infty(\mathbb{R}^d)$ равенством

$$E_\kappa^{d, l, m, D} f = \sum_{\nu \in N_\kappa^{d, m, D}} (S_{\kappa, \nu_\kappa^D(\nu)}^{d, l} f) g_{\kappa, \nu}^{d, m}, \quad f \in L_1(D).$$

При $k \in \mathbb{Z}_+, \alpha \in \mathbb{R}_+^d$ определим $\kappa(k, \alpha)$ как вектор, имеющий компоненты $(\kappa(k, \alpha))_j = [k/\alpha_j], j = 1, \dots, d, ([a] - \text{целая часть } a)$, и при $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d, m \in \mathbb{N}^d, \alpha \in \mathbb{R}_+^d, k \in \mathbb{Z}_+$, ограниченной области $D \subset \mathbb{R}^d$, для которых при $\kappa = \kappa(k, \alpha)$ выполняется (1.3.1), обозначим

$$E_k^{d, l, m, D, \alpha} = E_\kappa^{d, l, m, D}$$

при $\kappa = \kappa(k, \alpha)$.

Обозначим еще через $\mathcal{I}^D$ линейное отображение, которое каждой функции f , заданной на области $D \subset \mathbb{R}^d$, сопоставляет функцию $\mathcal{I}^D f$, определяемую на $\mathbb{R}^d$ равенством

$$(\mathcal{I}^D f)(x) = \begin{cases} f(x), & \text{при } x \in D; \\ 0, & \text{при } x \in \mathbb{R}^d \setminus D. \end{cases}$$

Предложение 1.3.1

Пусть $d \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{R}_+^d, l \in \mathbb{N}^d, m \in \mathbb{N}^d, 1 \leq p < \infty$ и ограниченная область $D \subset \mathbb{R}^d$ такова, что существуют $k^0(D, \alpha) \in \mathbb{Z}_+, \gamma^0(D, \alpha) \in \mathbb{R}_+^d$, для которых при любом $k \in \mathbb{Z}_+ : k \geq k^0$, при $\kappa = \kappa(k, \alpha)$ для каждого $\nu \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, \nu}^d \cap D \neq \emptyset$, существует $\nu' \in \mathbb{Z}^d$ такой, что

$$Q_{\kappa, \nu'}^d \subset D \cap (2^{-\kappa}\nu + \gamma^0 2^{-\kappa} B^d). \quad (1.3.2)$$

Тогда для любой функции $f \in L_p(D)$ в $L_p(D)$ имеет место равенство

$$f = (E_{k^0}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D + \sum_{k=k^0+1}^{\infty} (E_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f - E_{k-1}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D. \quad (1.3.3)$$

Доказательство.

Сначала отметим свойства некоторых вспомогательных множеств и других объектов, которые понадобятся для доказательства предложения.

Для $d \in \mathbb{N}$, $\kappa \in \mathbb{Z}_+^d$, $m \in \mathbb{N}^d$ и области $D \subset \mathbb{R}^d$ обозначим

$$G_{\kappa}^{d,m,D} = \bigcup_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m},$$

и рассмотрим представление

$$\begin{aligned} G_{\kappa}^{d,m,D} &= G_{\kappa}^{d,m,D} \cap \mathbb{R}^d = G_{\kappa}^{d,m,D} \cap ((\bigcup_{n \in \mathbb{Z}^d} Q_{\kappa,n}^d) \cup A_{\kappa}^d) = \\ &= (\bigcup_{n \in \mathbb{Z}^d} (G_{\kappa}^{d,m,D} \cap Q_{\kappa,n}^d)) \cup (G_{\kappa}^{d,m,D} \cap A_{\kappa}^d) = \\ &= (\bigcup_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset} (G_{\kappa}^{d,m,D} \cap Q_{\kappa,n}^d)) \cup (G_{\kappa}^{d,m,D} \cap A_{\kappa}^d), \end{aligned}$$

где $\text{mes } A_{\kappa}^d = 0$, $A_{\kappa}^d \cap Q_{\kappa,n}^d = \emptyset$, $Q_{\kappa,n}^d \cap Q_{\kappa,n'}^d = \emptyset$, $n, n' \in \mathbb{Z}^d : n \neq n'$. (1.3.4)

Заметим, что если при $n \in \mathbb{Z}^d$ пересечение

$$Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset,$$

т.е.

$$Q_{\kappa,n}^d \cap (\bigcup_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m}) = \bigcup_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} (Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m}) \neq \emptyset,$$

то существует $\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}$, для которого

$$Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset.$$

Для $n \in \mathbb{Z}^d$, $\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset$, выбирая $x \in Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m}$, при $j = 1, \dots, d$ имеем

$$2^{-\kappa_j} n_j < x_j \leq 2^{-\kappa_j} \nu_j + 2^{-\kappa_j} (m_j + 1); 2^{-\kappa_j} \nu_j \leq x_j < 2^{-\kappa_j} n_j + 2^{-\kappa_j},$$

или

$$n_j < \nu_j + m_j + 1; \nu_j < n_j + 1,$$

откуда

$$n_j + 1 \leq \nu_j + m_j + 1; \nu_j \leq n_j,$$

следовательно,

$$2^{-\kappa_j} n_j + 2^{-\kappa_j} \leq 2^{-\kappa_j} \nu_j + 2^{-\kappa_j} (m_j + 1); 2^{-\kappa_j} \nu_j \leq 2^{-\kappa_j} n_j,$$

а это значит, что

$$Q_{\kappa,n}^d \subset \overline{Q}_{\kappa,n}^d \subset \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \subset G_{\kappa}^{d,m,D}, n \in \mathbb{Z}^d, \nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset. \quad (1.3.5)$$

Из (1.3.4) и (1.3.5) получаем

$$G_{\kappa}^{d,m,D} = (\cup_{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset} Q_{\kappa,n}^d) \cup (G_{\kappa}^{d,m,D} \cap A_{\kappa}^d), \\ d \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}^d, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, D - \text{область в } \mathbb{R}^d. \quad (1.3.6)$$

В условиях предложения при $k \geq k^0, \kappa = \kappa(k, \alpha)$ для $\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}$, выбирая точку $z \in (2^{-\kappa} \nu + 2^{-\kappa} (m + \epsilon) \overline{I}^d) \cap D$, и учитывая открытость множества D , найдем точку $y \in (2^{-\kappa} \nu + 2^{-\kappa} (m + \epsilon) I^d) \cap D$. Затем возьмем клетку $\overline{Q}_{\kappa,\rho}^d, \rho \in \mathbb{Z}^d$, содержащую точку y . Тогда поскольку $(2^{-\kappa} \nu + 2^{-\kappa} (m + \epsilon) I^d) \cap D$ является окрестностью точки y , принадлежащей замыканию $Q_{\kappa,\rho}^d$, то множество $(2^{-\kappa} \nu + 2^{-\kappa} (m + \epsilon) I^d) \cap D \cap Q_{\kappa,\rho}^d \neq \emptyset$. Принимая во внимание это обстоятельство и (1.3.5), получаем, что

$$Q_{\kappa,\rho}^d \subset \overline{Q}_{\kappa,\rho}^d \subset \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m}, \quad (1.3.7)$$

и $Q_{\kappa,\rho}^d \cap D \neq \emptyset$. Исходя из условий предложения, согласно (1.3.2) выберем $\nu' \in \mathbb{Z}^d$, для которого

$$Q_{\kappa,\nu'}^d \subset D \cap (2^{-\kappa} \rho + \gamma^0 2^{-\kappa} B^d). \quad (1.3.8)$$

Из (1.3.8) и определения $\nu_{\kappa}^D(\nu)$ имеем

$$\|\nu - \nu_{\kappa}^D(\nu)\|_{l_{\infty}^d} \leq \|\nu - \nu'\|_{l_{\infty}^d} \leq \|\nu - \rho\|_{l_{\infty}^d} + \|\rho - \nu'\|_{l_{\infty}^d}. \quad (1.3.9)$$

Ввиду (1.3.7) получаем

$$|2^{-\kappa_j} \nu_j - 2^{-\kappa_j} \rho_j| \leq 2^{-\kappa_j} (m_j + 1),$$

или

$$|\nu_j - \rho_j| \leq (m_j + 1), j = 1, \dots, d,$$

т.е.

$$\|\nu - \rho\|_{l_{\infty}^d} \leq c_1(d, m). \quad (1.3.10)$$

Кроме того, из (1.3.8) следует, что

$$|2^{-\kappa_j} \nu'_j - 2^{-\kappa_j} \rho_j| \leq 2^{-\kappa_j} \gamma_j^0,$$

или

$$|\nu'_j - \rho_j| \leq \gamma_j^0, j = 1, \dots, d,$$

т.е.

$$\|\nu' - \rho\|_{l_\infty^d} \leq c_2(d, \gamma^0). \quad (1.3.11)$$

Объединяя (1.3.9), (1.3.10), (1.3.11), приходим к выводу, что

$$\begin{aligned} \|\nu - \nu_\kappa^D(\nu)\|_{l_\infty^d} &\leq c_1(d, m) + c_2(d, \gamma^0) = c_3(d, m, D, \alpha), \\ \nu &\in N_{\kappa}^{d, m, D}, \kappa = \kappa(k, \alpha), k \geq k^0. \end{aligned} \quad (1.3.12)$$

Отметим еще, что в условиях предложения при $k \geq k^0, \kappa = \kappa(k, \alpha)$, для $n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset, \nu \in N_{\kappa}^{d, m, D} : \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d, m} \cap Q_{\kappa, n}^d \neq \emptyset$, для $x \in \overline{Q}_{\kappa, \nu_\kappa^D(\nu)}^d$ в силу (1.3.5) и (1.3.12) при $j = 1, \dots, d$ выполняется неравенство

$$\begin{aligned} |x_j - 2^{-\kappa_j} n_j| &\leq \\ |x_j - 2^{-\kappa_j} (\nu_\kappa^D(\nu))_j| + |2^{-\kappa_j} (\nu_\kappa^D(\nu))_j - 2^{-\kappa_j} \nu_j| + |2^{-\kappa_j} \nu_j - 2^{-\kappa_j} n_j| &\leq \\ 2^{-\kappa_j} + 2^{-\kappa_j} \|\nu - \nu_\kappa^D(\nu)\|_{l_\infty^d} + 2^{-\kappa_j} (m_j + 1) &\leq 2^{-\kappa_j} (1 + c_3 + m_j + 1) = \\ &= \gamma_j^1(d, m, D, \alpha) 2^{-\kappa_j}, \end{aligned}$$

т.е.

$$Q_{\kappa, \nu_\kappa^D(\nu)}^d \subset \overline{Q}_{\kappa, \nu_\kappa^D(\nu)}^d \subset (2^{-\kappa} n + \gamma^1 2^{-\kappa} B^d). \quad (1.3.13)$$

В условиях предложения при $k \geq k^0, \kappa = \kappa(k, \alpha), n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset$, зададим

$$x_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha} = 2^{-\kappa} n - \gamma^1 2^{-\kappa}; \delta_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha} = 2\gamma^1 2^{-\kappa}$$

и определим клетку $D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}$ равенством

$$D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha} = x_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha} + \delta_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha} I^d = \text{int}(2^{-\kappa} n + \gamma^1 2^{-\kappa} B^d).$$

Из приведенных определений с учетом того, что $\gamma^1 > \epsilon$, видно, что справедливо включение

$$Q_{\kappa, n}^d \subset D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}, n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset, \kappa = \kappa(k, \alpha), k \geq k^0. \quad (1.3.14)$$

При $k \geq k^0, \kappa = \kappa(k, \alpha), n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset$, введем в рассмотрение линейный оператор $\mathcal{S}_{\kappa, n}^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha}$, полагая

$$\mathcal{S}_{\kappa, n}^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} = P_{\text{delta}, x^0}^{d, l-\epsilon}$$

при $x^0 = x_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}, \delta = \delta_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}$.

Учитывая (1.3.14), нетрудно видеть, что в условиях предложения существует константа $c_4(d, m, D, \alpha) > 0$ такая, что для любого $k \in \mathbb{Z}_+ : k \geq k^0$, при $\kappa = \kappa(k, \alpha)$ для каждого $x \in \mathbb{R}^d$ число

$$\text{card}\{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset, x \in D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}\} \leq c_4. \quad (1.3.15)$$

Из (1.3.13) и определения $D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}$ следует, что при $k \geq k^0$, $\kappa = \kappa(k, \alpha)$ для $n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset, \nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \cap Q_{\kappa,n}^d \neq \emptyset$, имеет место включение

$$Q_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^d \subset D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}. \quad (1.3.16)$$

Из (1.2.3) вытекает, что при $\kappa \in \mathbb{Z}_+^d$ для $n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset$, верно неравенство

$$\text{card}\{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \cap Q_{\kappa,n}^d \neq \emptyset\} \leq c_5(d, m). \quad (1.3.17)$$

Пусть теперь в условиях предложения $f \in L_p(D)$ и $k \in \mathbb{Z}_+ : k \geq k^0$, $\kappa = \kappa(k, \alpha)$. Тогда, полагая $F = \mathcal{I}^D f$, ввиду (1.2.4) имеем

$$\begin{aligned} & \left\| f - ((E_{k^0}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D + \sum_{\mathfrak{k}=k^0+1}^k (E_{\mathfrak{k}}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f - E_{\mathfrak{k}-1}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D) \right\|_{L_p(D)}^p = \\ & \|F |_D - (E_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D\|_{L_p(D)}^p = \|F |_D - (E_{\kappa}^{d,l-\epsilon,m,D} f) |_D\|_{L_p(D)}^p = \\ & \left\| (F(\sum_{\nu \in \mathbb{Z}^d : \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \cap D \neq \emptyset} g_{\kappa,\nu}^{d,m})) |_D - (E_{\kappa}^{d,l-\epsilon,m,D} f) |_D \right\|_{L_p(D)}^p \leq \\ & \left\| F(\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} g_{\kappa,\nu}^{d,m}) - (E_{\kappa}^{d,l-\epsilon,m,D} f) \right\|_{L_p(\mathbb{R}^d)}^p = \\ & \left\| F(\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} g_{\kappa,\nu}^{d,m}) - \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} (S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_p(\mathbb{R}^d)}^p = \\ & \left\| F(\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} g_{\kappa,\nu}^{d,m}) - \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} (S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} F) g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_p(\mathbb{R}^d)}^p = \\ & \int_{\mathbb{R}^d} \left| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} (F(x) - (S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} F)(x)) g_{\kappa,\nu}^{d,m}(x) \right|^p dx = \\ & \int_{G_{\kappa}^{d,m,D}} \left| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} (F(x) - (S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} F)(x)) g_{\kappa,\nu}^{d,m}(x) \right|^p dx. \quad (1.3.18) \end{aligned}$$

В силу (1.3.6) (см. также (1.3.4)) выводим

$$\begin{aligned}
& \int_{G_\kappa^{d,m,D}} \left| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} (F(x) - (S_{\kappa, \nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} F)(x)) g_{\kappa, \nu}^{d,m}(x) \right|^p dx = \\
& \int_{\bigcup_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa,n}^d \cap G_\kappa^{d,m,D} \neq \emptyset} Q_{\kappa,n}^d} \left| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} (F(x) - (S_{\kappa, \nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} F)(x)) g_{\kappa, \nu}^{d,m}(x) \right|^p dx = \\
& \sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa,n}^d \cap G_\kappa^{d,m,D} \neq \emptyset} \int_{Q_{\kappa,n}^d} \left| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} (F(x) - (S_{\kappa, \nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} F)(x)) g_{\kappa, \nu}^{d,m}(x) \right|^p dx = \\
& \sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa,n}^d \cap G_\kappa^{d,m,D} \neq \emptyset} \int_{Q_{\kappa,n}^d} \left| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}: \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d,m} \cap Q_{\kappa,n}^d \neq \emptyset} (F(x) - (S_{\kappa, \nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} F)(x)) g_{\kappa, \nu}^{d,m}(x) \right|^p dx = \\
& \sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa,n}^d \cap G_\kappa^{d,m,D} \neq \emptyset} \left\| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}: \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d,m} \cap Q_{\kappa,n}^d \neq \emptyset} (F - (S_{\kappa, \nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} F)) g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right\|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)}^p \leq \\
& \sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa,n}^d \cap G_\kappa^{d,m,D} \neq \emptyset} \left(\sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}: \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d,m} \cap Q_{\kappa,n}^d \neq \emptyset} \| (F - (S_{\kappa, \nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} F)) g_{\kappa, \nu}^{d,m} \|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)} \right)^p.
\end{aligned} \tag{1.3.19}$$

Далее, для $n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_\kappa^{d,m,D} \neq \emptyset, \nu \in N_\kappa^{d,m,D} : \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d,m} \cap Q_{\kappa,n}^d \neq \emptyset$, с учетом (1.2.5) получаем

$$\begin{aligned}
& \| (F - (S_{\kappa, \nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} F)) g_{\kappa, \nu}^{d,m} \|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)} \leq \| F - S_{\kappa, \nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} F \|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)} \leq \\
& \| F - \mathcal{S}_{\kappa,n}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} F \|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)} + \| \mathcal{S}_{\kappa,n}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} F - S_{\kappa, \nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} F \|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)}. \tag{1.3.20}
\end{aligned}$$

Учитывая (1.3.14), на основании (1.1.4) для $n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_\kappa^{d,m,D} \neq \emptyset$, заключаем, что

$$\begin{aligned}
& \| F - \mathcal{S}_{\kappa,n}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} F \|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)} \leq \| F - \mathcal{S}_{\kappa,n}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} F \|_{L_p(D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha})} \\
& \leq c_6 \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_7 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{(D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha})_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} F(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p}. \tag{1.3.21}
\end{aligned}$$

Принимая во внимание (1.3.14), (1.3.16), (1.1.1), (1.1.2), (1.1.3) и снова (1.3.16), а также, опираясь на (1.1.4), для $n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_\kappa^{d,m,D} \neq \emptyset, \nu \in N_\kappa^{d,m,D} : \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d,m} \cap Q_{\kappa,n}^d \neq \emptyset$, находим, что

$$\begin{aligned}
& \| \mathcal{S}_{\kappa,n}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} F - S_{\kappa, \nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} F \|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)} \leq \\
& c_8 \| S_{\kappa, \nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} (\mathcal{S}_{\kappa,n}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} F - F) \|_{L_p(Q_{\kappa, \nu_\kappa^D(\nu)}^d)} \leq c_9 \| F - \mathcal{S}_{\kappa,n}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} F \|_{L_p(D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha})} \leq
\end{aligned}$$

$$c_{10} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_7 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{(D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha})_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} F(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p}. \quad (1.3.22)$$

Соединяя (1.3.20), (1.3.21) и (1.3.22), для $n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset, \nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \cap Q_{\kappa,n}^d \neq \emptyset$, получаем

$$\|(F - S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} F) g_{\kappa,\nu}^{d,m}\|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)} \leq c_{11} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_7 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{(D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha})_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} F(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p}.$$

Подставляя эту оценку в (1.3.19) и применяя (1.3.17) и неравенство Гёльдера, а затем используя (1.3.15) и неравенство Гёльдера, выводим

$$\begin{aligned} & \int_{G_{\kappa}^{d,m,D}} \left| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} (F(x) - (S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} F)(x)) g_{\kappa,\nu}^{d,m}(x) \right|^p dx \leq \\ & \sum_{\substack{n \in \mathbb{Z}^d : \\ Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset}} \left(\sum_{\substack{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : \\ \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \cap Q_{\kappa,n}^d \neq \emptyset}} c_{11} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_7 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{(D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha})_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} F(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \right)^p \leq \\ & \sum_{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset} c_{12}^p \left(\sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j} \int_{c_7 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{(D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha})_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} F(x)|^p dx d\xi \right) \leq \\ & c_{12}^p \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j} \int_{c_7 2^{-\kappa_j} B^1} \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset} \int_{D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} F(x)|^p dx \right) d\xi = \\ & c_{12}^p \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j} \int_{c_7 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{\mathbb{R}^d} \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset} \chi_{D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}}(x) \right) |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} F(x)|^p dx d\xi \\ & \leq \left(c_{13} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_7 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{\mathbb{R}^d} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} F(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \right)^p. \end{aligned}$$

Объединяя последнее неравенство с (1.3.18), для $f \in L_p(D)$ при $k \in \mathbb{Z}_+ : k \geq k^0$, приходим к соотношению

$$\begin{aligned} & \|f - ((E_{k^0}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D + \sum_{\mathfrak{k}=k^0+1}^k (E_{\mathfrak{k}}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f - E_{\mathfrak{k}-1}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D)\|_{L_p(D)} \leq \\ & c_{14} \sum_{j=1}^d 2^{k/(\alpha_j p)} \left(\int_{c_{15} 2^{-k/\alpha_j} B^1} \int_{\mathbb{R}^d} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} F(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \leq \end{aligned}$$

$$c_{16} \sum_{j=1}^d \Omega_j^{l_j}(\mathcal{I}^D f, c_{15} 2^{-k/\alpha_j})_{L_p(\mathbb{R}^d)} \rightarrow 0 \text{ при } k \rightarrow \infty,$$

что влечёт (1.3.3). $\square$

Как известно, имеет место

Лемма 1.3.2

Пусть $d \in \mathbb{N}$, $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d$, D — область в $\mathbb{R}^d$ и функция $f \in C^\infty(D)$, а $g \in L_1(D)$, причём для каждого $\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)$ обобщённая производная $\mathcal{D}^\mu g \in L_1(D)$. Тогда в пространстве обобщённых функций в области D имеет место равенство

$$\mathcal{D}^\lambda(fg) = \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_\lambda^\mu \mathcal{D}^{\lambda-\mu} f \mathcal{D}^\mu g. \quad (1.3.23)$$

Лемма 1.3.3

Пусть $d \in \mathbb{N}$, $\alpha \in \mathbb{R}_+^d$, $l \in \mathbb{Z}_+^d$, $m \in \mathbb{N}^d$, $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d(m)$, $1 \leq s, q \leq \infty$ и область $D \subset \mathbb{R}^d$ удовлетворяет условиям предложения 1.3.1. Тогда существует константа $c_{17}(d, l, m, D, \alpha, \lambda, s, q) > 0$ такая, что для любой функции $f \in L_s(D)$ при $k \in \mathbb{Z}_+ : k \geq k^0(D, \alpha)$, справедливо неравенство

$$\|\mathcal{D}^\lambda E_k^{d,l,m,D,\alpha} f\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} \leq c_{17} 2^{k(\alpha^{-1}, \lambda + (s^{-1}-q^{-1})+\epsilon)} \|f\|_{L_s(D)}. \quad (1.3.24)$$

Доказательство.

При доказательстве леммы будем использовать объекты и связанные с ними факты из доказательства предложения 1.3.1. В условиях леммы для $f \in L_s(D)$ при $s \leq q$, $k \in \mathbb{Z}_+ : k \geq k^0$, $\kappa = \kappa(k, \alpha)$, , принимая во внимание (1.3.23), имеем

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}^\lambda(E_k^{d,l,m,D,\alpha} f)\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} &= \|\mathcal{D}^\lambda E_\kappa^{d,l,m,D} f\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} = \\ &= \left\| \mathcal{D}^\lambda \left(\sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} (S_{\kappa,\nu_\kappa^D}^{d,l} f) g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right) \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} = \left\| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} \mathcal{D}^\lambda ((S_{\kappa,\nu_\kappa^D}^{d,l} f) g_{\kappa,\nu}^{d,m}) \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} = \\ &= \left\| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_\lambda^\mu (\mathcal{D}^\mu S_{\kappa,\nu_\kappa^D}^{d,l} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} = \\ &= \left\| \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_\lambda^\mu \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} (\mathcal{D}^\mu S_{\kappa,\nu_\kappa^D}^{d,l} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} \leq \\ &= \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_\lambda^\mu \left\| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} (\mathcal{D}^\mu S_{\kappa,\nu_\kappa^D}^{d,l} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)}. \quad (1.3.25) \end{aligned}$$

Оценивая правую часть (1.3.25), при $\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)$ с учетом (1.3.6), (1.3.4) получаем (ср. с (1.3.19))

$$\begin{aligned}
& \left\| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} (\mathcal{D}^{\mu} S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)}^q = \\
& \int_{\mathbb{R}^d} \left| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} (\mathcal{D}^{\mu} S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right|^q dx = \\
& \int_{G_{\kappa}^{d,m,D}} \left| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} (\mathcal{D}^{\mu} S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right|^q dx = \\
& \sum_{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset} \int_{Q_{\kappa,n}^d} \left| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} (\mathcal{D}^{\mu} S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right|^q dx = \\
& \sum_{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset} \int_{Q_{\kappa,n}^d} \left| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d,m} \neq \emptyset} (\mathcal{D}^{\mu} S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right|^q dx = \\
& \sum_{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset} \left\| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d,m} \neq \emptyset} (\mathcal{D}^{\mu} S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)}^q \leq \\
& \sum_{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset} \left(\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d,m} \neq \emptyset} \|(\mathcal{D}^{\mu} S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m}\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)} \right)^q.
\end{aligned} \tag{1.3.26}$$

Для оценки правой части (1.3.26), используя сначала (1.2.5), а, затем применяя (1.1.1), при $n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset, \nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d,m} \neq \emptyset$, выводим

$$\begin{aligned}
& \|(\mathcal{D}^{\mu} S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m}\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)} \leq \|\mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m}\|_{L_{\infty}(\mathbb{R}^d)} \|\mathcal{D}^{\mu} S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l} f\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)} = \\
& c_{18} 2^{(\kappa, \lambda-\mu)} \|\mathcal{D}^{\mu} S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l} f\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)} \leq c_{19} 2^{(\kappa, \lambda-\mu)} 2^{(\kappa, \mu+s^{-1}\epsilon-q^{-1}\epsilon)} \|\mathcal{D}^{\mu} S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l} f\|_{L_s(Q_{\kappa,n}^d)} = \\
& c_{19} 2^{(\kappa, \lambda+s^{-1}\epsilon-q^{-1}\epsilon)} \|\mathcal{D}^{\mu} S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l} f\|_{L_s(Q_{\kappa,n}^d)}. \tag{1.3.27}
\end{aligned}$$

Далее, принимая во внимание, что в силу (1.3.13) имеет место включение

$$\begin{aligned}
& Q_{\kappa,n}^d \subset (2^{-\kappa} \nu_{\kappa}^D(\nu) + (\gamma^1 + \epsilon) 2^{-\kappa} B^d), \\
& n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset, \nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d,m} \cap Q_{\kappa,n}^d \neq \emptyset,
\end{aligned}$$

на основании (1.1.1), (1.1.3), (1.3.16) заключаем, что для $n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset, \nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d,m} \cap Q_{\kappa,n}^d \neq \emptyset$, выполняется неравенство

$$\begin{aligned} \|S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l} f\|_{L_s(Q_{\kappa,n}^d)} &\leq c_{20} \|S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l} f\|_{L_s(Q_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^d)} \leq \\ &c_{21} \|f\|_{L_s(Q_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^d)} \leq c_{21} \|f\|_{L_s(D \cap D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha})}. \end{aligned} \quad (1.3.28)$$

Объединяя (1.3.27) и (1.3.28), находим, что при $n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset, \nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset$, имеет место неравенство

$$\|(\mathcal{D}^{\mu} S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m}\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)} \leq c_{22} 2^{(\kappa, \lambda + s^{-1}\mathfrak{e} - q^{-1}\mathfrak{e})} \|f\|_{L_s(D \cap D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha})}.$$

Подставляя эту оценку в (1.3.26) и применяя (1.3.17), а, затем используя неравенство Гёльдера с показателем $s/q \leq 1$ и оценку (1.3.15), приходим к неравенству

$$\begin{aligned} &\left\| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} (\mathcal{D}^{\mu} S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)}^q \leq \\ &\sum_{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset} \left(\sum_{\substack{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : \\ Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset}} c_{22} 2^{(\kappa, \lambda + s^{-1}\mathfrak{e} - q^{-1}\mathfrak{e})} \|f\|_{L_s(D \cap D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha})} \right)^q \leq \\ &(c_{22} 2^{(\kappa, \lambda + s^{-1}\mathfrak{e} - q^{-1}\mathfrak{e})})^q \sum_{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset} \left(c_5 \|f\|_{L_s(D \cap D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha})} \right)^q = \\ &(c_{23} 2^{(\kappa, \lambda + s^{-1}\mathfrak{e} - q^{-1}\mathfrak{e})})^q \sum_{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset} \left(\int_{D \cap D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}} |f(x)|^s dx \right)^{q/s} \leq \\ &(c_{23} 2^{(\kappa, \lambda + s^{-1}\mathfrak{e} - q^{-1}\mathfrak{e})})^q \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset} \int_{D \cap D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}} |f(x)|^s dx \right)^{q/s} = \\ &(c_{23} 2^{(\kappa, \lambda + s^{-1}\mathfrak{e} - q^{-1}\mathfrak{e})})^q \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset} \int_D \chi_{D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}}(x) |f(x)|^s dx \right)^{q/s} = \\ &(c_{23} 2^{(\kappa, \lambda + s^{-1}\mathfrak{e} - q^{-1}\mathfrak{e})})^q \left(\int_D \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset} \chi_{D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}}(x) \right) |f(x)|^s dx \right)^{q/s} \leq \\ &(c_{23} 2^{(\kappa, \lambda + s^{-1}\mathfrak{e} - q^{-1}\mathfrak{e})})^q \left(\int_D c_4 |f(x)|^s dx \right)^{q/s} = (c_{24} 2^{(\kappa, \lambda + s^{-1}\mathfrak{e} - q^{-1}\mathfrak{e})} \|f\|_{L_s(D)})^q. \end{aligned} \quad (1.3.29)$$

Соединяя (1.3.25) с (1.3.29), получаем

$$\begin{aligned}\|\mathcal{D}^\lambda E_k^{d,l,m,D,\alpha} f\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} &\leq \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_\lambda^\mu c_{24} 2^{(\kappa, \lambda + s^{-1}\mathfrak{e} - q^{-1}\mathfrak{e})} \|f\|_{L_s(D)} = \\ &c_{25} 2^{(\kappa, \lambda + s^{-1}\mathfrak{e} - q^{-1}\mathfrak{e})} \|f\|_{L_s(D)} \leq c_{17} 2^{k(\alpha^{-1}, \lambda + (s^{-1} - q^{-1})\mathfrak{e})} \|f\|_{L_s(D)},\end{aligned}$$

что совпадает с (1.3.24) при $s \leq q$. Справедливость (1.3.24) при $q < s$ вытекает из соблюдения (1.3.24) при $q = s$ и неравенства

$$\begin{aligned}\|\mathcal{D}^\lambda E_k^{d,l,m,D,\alpha} f\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} &= \|\mathcal{D}^\lambda E_k^{d,l,m,D,\alpha} f\|_{L_q(G)} \leq \\ (\text{mes } G)^{1/q-1/s} \|\mathcal{D}^\lambda E_k^{d,l,m,D,\alpha} f\|_{L_s(G)} &\leq (\text{mes } G)^{1/q-1/s} \|\mathcal{D}^\lambda E_k^{d,l,m,D,\alpha} f\|_{L_s(\mathbb{R}^d)},\end{aligned}$$

где G – ограниченная область в $\mathbb{R}^d$ такая, что $G_\kappa^{d,m,D} \subset G$ при $\kappa = \kappa(k, \alpha)$, $k \in \mathbb{Z}_+ : k \geq k^0$. $\square$ Отметим, что в лемме 1.3.3 при $s \leq q$ и в предложении 1.3.1 условие ограниченности области D можно опустить.

Введем следующее обозначение. Пусть $d \in \mathbb{N}$, $\alpha \in \mathbb{R}_+^d$, D – ограниченная область в $\mathbb{R}^d$ и число $k \in \mathbb{N}$ таковы, что при $\kappa' = \kappa(k-1, \alpha)$ существует $\nu' \in \mathbb{Z}^d$, для которого $Q_{\kappa', \nu'}^d \subset D$, а также пусть $l \in \mathbb{Z}_+^d$, $m \in \mathbb{N}^d$. Тогда положим

$$\mathcal{E}_k^{d,l,m,D,\alpha} = E_\kappa^{d,l,m,D} - H_{\kappa, \kappa'}^{d,l,m,D} E_{\kappa'}^{d,l,m,D}, \quad \text{при } \kappa = \kappa(k, \alpha), \kappa' = \kappa(k-1, \alpha). \quad (1.3.30)$$

При $d \in \mathbf{n}$, $\alpha \in \mathbb{R}_+^d$ будем говорить, что область $D \subset \mathbb{R}^d$ является областью α -типа, если существуют константы $K^0(D, \alpha) \in \mathbb{Z}_+$, $\Gamma^0(D, \alpha) \in \mathbb{R}_+^d$, $c_{26}(D, \alpha) > 0$ такие, что для $k \in \mathbb{Z}_+ : k \geq K^0$, при $\kappa = \kappa(k, \alpha)$ выполняются следующие условия:

1) для каждого $\nu \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, \nu}^d \cap D \neq \emptyset$, существует $\nu' \in \mathbb{Z}^d$ такой, что соблюдается включение

$$Q_{\kappa, \nu'}^d \subset D \cap (2^{-\kappa} \nu + \Gamma^0 2^{-\kappa} B^d);$$

2) для любых $\nu, \nu' \in \mathbb{Z}^d$ таких, что $Q_{\kappa, \nu}^d \subset D$, $Q_{\kappa, \nu'}^d \subset D$, существуют последовательности $\nu^\iota \in \mathbb{Z}^d$, $j^\iota \in \mathcal{N}_{1,d}^1$, $\epsilon^\iota \in \{-1, 1\}$, $\iota = 0, \dots, \mathfrak{J}$, со следующими свойствами:

$$\mathfrak{J} \leq c_{26} \|\nu - \nu'\|_{l_\infty^d}; \quad (1.3.31)$$

$$\nu^0 = \nu, \nu^\mathfrak{J} = \nu', \nu^{\iota+1} = \nu^\iota + \epsilon^\iota e_{j^\iota}, \iota = 0, \dots, \mathfrak{J} - 1; \quad (1.3.32)$$

при $\iota = 0, \dots, \mathfrak{J} - 1$ справедливо включение

$$Q^\iota = \text{int}(\overline{Q}_{\kappa, \nu^\iota}^d \cup \overline{Q}_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^d) \subset D. \quad (1.3.33)$$

Предложение 1.3.4

Пусть $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{N}^d, m \in \mathbb{N}^d, \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(m), \alpha \in \mathbb{R}_+^d, D \subset \mathbb{R}^d$ – ограниченная область α -типа, $1 \leq p < \infty, 1 \leq q \leq \infty$. Тогда существуют константы $c_{27}(d, l, m, D, \alpha, \lambda, p, q) > 0, c_{28}(d, m, D, \alpha) > 0$ такие, что при $k \in \mathbb{Z}_+ : k > K^0(D, \alpha)$ (см. определение области α -типа), для $f \in L_p(D)$ соблюдается неравенство

$$\|\mathcal{D}^\lambda \mathcal{E}_k^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} \leq c_{27} 2^{k(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)} \sum_{j=1}^d \Omega_j^{l_j}(f, c_{28} 2^{-k/\alpha_j})_{L_p(D)}. \quad (1.3.34)$$

Доказательство.

В условиях предложения пусть $f \in L_p(D), k \in \mathbb{Z}_+ : k > K^0, p \leq q$. Тогда, полагая $\kappa = \kappa(k, \alpha), \kappa' = \kappa(k-1, \alpha), \mathfrak{k} = \kappa - \kappa'$, и принимая во внимание (1.2.11), (1.2.12), (1.2.13), (1.2.20), (1.3.23), имеем

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}^\lambda \mathcal{E}_k^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} &= \|\mathcal{D}^\lambda (E_\kappa^{d, l-\epsilon, m, D} f - H_{\kappa, \kappa'}^{d, l-\epsilon, m, D} (E_{\kappa'}^{d, l-\epsilon, m, D} f))\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} = \\ &= \left\| \mathcal{D}^\lambda \left(\sum_{\nu \in N_\kappa^{d, m, D}} (S_{\kappa, \nu_\kappa^D}^{d, l-\epsilon} f) g_{\kappa, \nu}^{d, m} - H_{\kappa, \kappa'}^{d, l-\epsilon, m, D} \left(\sum_{\nu' \in N_{\kappa'}^{d, m, D}} (S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D}^{d, l-\epsilon} f) g_{\kappa', \nu'}^{d, m} \right) \right) \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} = \\ &= \left\| \mathcal{D}^\lambda \left(\sum_{\nu \in N_\kappa^{d, m, D}} (S_{\kappa, \nu_\kappa^D}^{d, l-\epsilon} f) g_{\kappa, \nu}^{d, m} - \sum_{\nu \in N_\kappa^{d, m, D}} \left(\sum_{\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_\mathfrak{k}^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^\sharp}^m S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_\mathfrak{k}(\nu, \mathfrak{m}^\sharp))}^{d, l-\epsilon} f \right) g_{\kappa, \nu}^{d, m} \right) \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} = \\ &= \left\| \mathcal{D}^\lambda \left(\sum_{\nu \in N_\kappa^{d, m, D}} \left(\sum_{\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_\mathfrak{k}^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^\sharp}^m \right) (S_{\kappa, \nu_\kappa^D}^{d, l-\epsilon} f) g_{\kappa, \nu}^{d, m} - \right. \right. \\ &\quad \left. \sum_{\nu \in N_\kappa^{d, m, D}} \left(\sum_{\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_\mathfrak{k}^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^\sharp}^m S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_\mathfrak{k}(\nu, \mathfrak{m}^\sharp))}^{d, l-\epsilon} f \right) g_{\kappa, \nu}^{d, m} \right) \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} = \\ &= \left\| \mathcal{D}^\lambda \left(\sum_{\nu \in N_\kappa^{d, m, D}} \left(\left(\sum_{\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_\mathfrak{k}^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^\sharp}^m S_{\kappa, \nu_\kappa^D}^{d, l-\epsilon} f \right) - \left(\sum_{\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_\mathfrak{k}^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^\sharp}^m S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_\mathfrak{k}(\nu, \mathfrak{m}^\sharp))}^{d, l-\epsilon} f \right) \right) g_{\kappa, \nu}^{d, m} \right) \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} = \\ &= \left\| \mathcal{D}^\lambda \left(\sum_{\nu \in N_\kappa^{d, m, D}} \left(\sum_{\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_\mathfrak{k}^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^\sharp}^m \left((S_{\kappa, \nu_\kappa^D}^{d, l-\epsilon} f) - (S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_\mathfrak{k}(\nu, \mathfrak{m}^\sharp))}^{d, l-\epsilon} f) \right) \right) g_{\kappa, \nu}^{d, m} \right) \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} = \\ &= \left\| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d, m, D}} \mathcal{D}^\lambda \left(\left(\sum_{\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_\mathfrak{k}^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^\sharp}^m \left((S_{\kappa, \nu_\kappa^D}^{d, l-\epsilon} f) - (S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_\mathfrak{k}(\nu, \mathfrak{m}^\sharp))}^{d, l-\epsilon} f) \right) \right) g_{\kappa, \nu}^{d, m} \right) \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} = \\ &= \left\| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d, m, D}} \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_\lambda^\mu \mathcal{D}^\mu \left(\sum_{\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_\mathfrak{k}^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^\sharp}^m \left((S_{\kappa, \nu_\kappa^D}^{d, l-\epsilon} f) - (S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_\mathfrak{k}(\nu, \mathfrak{m}^\sharp))}^{d, l-\epsilon} f) \right) \right) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d, m} \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} = \\ &= \left\| \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_\lambda^\mu \sum_{\nu \in N_\kappa^{d, m, D}} \mathcal{D}^\mu \left(\sum_{\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_\mathfrak{k}^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^\sharp}^m \left((S_{\kappa, \nu_\kappa^D}^{d, l-\epsilon} f) - (S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_\mathfrak{k}(\nu, \mathfrak{m}^\sharp))}^{d, l-\epsilon} f) \right) \right) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d, m} \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \left\| \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_\lambda^\mu \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} \left(\sum_{\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_\sharp^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^\sharp}^m \mathcal{D}^\mu (S_{\kappa, \nu_\kappa^D}^{d,l-\epsilon} f - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_\sharp(\nu, \mathfrak{m}^\sharp))}^{d,l-\epsilon} f) \right) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} \leq \\
& \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_\lambda^\mu \left\| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} \left(\sum_{\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_\sharp^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^\sharp}^m \mathcal{D}^\mu (S_{\kappa, \nu_\kappa^D}^{d,l-\epsilon} f - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_\sharp(\nu, \mathfrak{m}^\sharp))}^{d,l-\epsilon} f) \right) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)}.
\end{aligned} \tag{1.3.35}$$

Оценивая правую часть (1.3.35), при $\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)$ с учетом (1.3.6), (1.3.4) получаем (ср. с (1.3.19))

$$\begin{aligned}
& \left\| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} \left(\sum_{\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_\sharp^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^\sharp}^m \mathcal{D}^\mu (S_{\kappa, \nu_\kappa^D}^{d,l-\epsilon} f - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_\sharp(\nu, \mathfrak{m}^\sharp))}^{d,l-\epsilon} f) \right) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)}^q = \\
& \int_{\mathbb{R}^d} \left| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} \left(\sum_{\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_\sharp^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^\sharp}^m \mathcal{D}^\mu (S_{\kappa, \nu_\kappa^D}^{d,l-\epsilon} f - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_\sharp(\nu, \mathfrak{m}^\sharp))}^{d,l-\epsilon} f) \right) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right|^q dx = \\
& \int_{G_\kappa^{d,m,D}} \left| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} \left(\sum_{\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_\sharp^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^\sharp}^m \mathcal{D}^\mu (S_{\kappa, \nu_\kappa^D}^{d,l-\epsilon} f - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_\sharp(\nu, \mathfrak{m}^\sharp))}^{d,l-\epsilon} f) \right) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right|^q dx = \\
& \sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa, n}^d \cap G_\kappa^{d,m,D} \neq \emptyset} \int_{Q_{\kappa, n}^d} \left| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} \left(\sum_{\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_\sharp^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^\sharp}^m \mathcal{D}^\mu (S_{\kappa, \nu_\kappa^D}^{d,l-\epsilon} f - \right. \right. \\
& \quad \left. \left. S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_\sharp(\nu, \mathfrak{m}^\sharp))}^{d,l-\epsilon} f) \right) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right|^q dx = \\
& \sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa, n}^d \cap G_\kappa^{d,m,D} \neq \emptyset} \int_{Q_{\kappa, n}^d} \left| \sum_{\substack{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}: \\ Q_{\kappa, n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d,m} \neq \emptyset}} \left(\sum_{\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_\sharp^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^\sharp}^m \mathcal{D}^\mu (S_{\kappa, \nu_\kappa^D}^{d,l-\epsilon} f - \right. \right. \\
& \quad \left. \left. S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_\sharp(\nu, \mathfrak{m}^\sharp))}^{d,l-\epsilon} f) \right) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right|^q dx = \\
& \sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa, n}^d \cap G_\kappa^{d,m,D} \neq \emptyset} \left\| \sum_{\substack{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}: \\ Q_{\kappa, n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d,m} \neq \emptyset}} \left(\sum_{\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_\sharp^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^\sharp}^m \mathcal{D}^\mu (S_{\kappa, \nu_\kappa^D}^{d,l-\epsilon} f - \right. \right. \\
& \quad \left. \left. S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_\sharp(\nu, \mathfrak{m}^\sharp))}^{d,l-\epsilon} f) \right) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right\|_{L_q(Q_{\kappa, n}^d)}^q \leq \\
& \sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa, n}^d \cap G_\kappa^{d,m,D} \neq \emptyset} \left(\sum_{\substack{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}: \\ Q_{\kappa, n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d,m} \neq \emptyset}} \left\| \left(\sum_{\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_\sharp^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^\sharp}^m \mathcal{D}^\mu (S_{\kappa, \nu_\kappa^D}^{d,l-\epsilon} f - \right. \right. \right. \\
& \quad \left. \left. \left. S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_\sharp(\nu, \mathfrak{m}^\sharp))}^{d,l-\epsilon} f) \right) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right\|_{L_q(Q_{\kappa, n}^d)} \right)^q \leq
\end{aligned}$$

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset} \left(\sum_{\substack{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : \\ Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset}} \sum_{\mathbf{m}^{\mathfrak{e}} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{e}}^m(\nu)} A_{\mathbf{m}^{\mathfrak{e}}}^m \left\| \mathcal{D}^{\mu}(S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\mathfrak{e}} f - \right. \right. \\ \left. \left. S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_{\mathfrak{e}}(\nu,\mathbf{m}^{\mathfrak{e}}))}^{d,l-\mathfrak{e}} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)} \right)^q. \quad (1.3.36)$$

Для оценки правой части (1.3.36), используя сначала (1.2.5), а, затем применяя (1.1.1), при $\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)$, $n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset$, $\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset$, $\mathbf{m}^{\mathfrak{e}} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{e}}^m(\nu)$ выводим

$$\begin{aligned} & \left\| \mathcal{D}^{\mu}(S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\mathfrak{e}} f - S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_{\mathfrak{e}}(\nu,\mathbf{m}^{\mathfrak{e}}))}^{d,l-\mathfrak{e}} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)} \leq \\ & \left\| \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_{\infty}(\mathbb{R}^d)} \left\| \mathcal{D}^{\mu}(S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\mathfrak{e}} f - S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_{\mathfrak{e}}(\nu,\mathbf{m}^{\mathfrak{e}}))}^{d,l-\mathfrak{e}} f) \right\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)} = \\ & c_{29} 2^{(\kappa,\lambda-\mu)} \left\| \mathcal{D}^{\mu}(S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\mathfrak{e}} f - S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_{\mathfrak{e}}(\nu,\mathbf{m}^{\mathfrak{e}}))}^{d,l-\mathfrak{e}} f) \right\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)} \leq \\ & c_{30} 2^{(\kappa,\lambda-\mu)} 2^{(\kappa,\mu+p^{-1}\mathfrak{e}-q^{-1}\mathfrak{e})} \left\| S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\mathfrak{e}} f - S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_{\mathfrak{e}}(\nu,\mathbf{m}^{\mathfrak{e}}))}^{d,l-\mathfrak{e}} f \right\|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)} = \\ & c_{30} 2^{(\kappa,\lambda+p^{-1}\mathfrak{e}-q^{-1}\mathfrak{e})} \left\| S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\mathfrak{e}} f - S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_{\mathfrak{e}}(\nu,\mathbf{m}^{\mathfrak{e}}))}^{d,l-\mathfrak{e}} f \right\|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)}. \quad (1.3.37) \end{aligned}$$

Оценим норму в правой части (1.3.37). Для этого, фиксировав $n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset$, $\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset$, $\mathbf{m}^{\mathfrak{e}} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{e}}^m(\nu)$, заметим, что

$$\begin{aligned} D \supset Q_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_{\mathfrak{e}}(\nu,\mathbf{m}^{\mathfrak{e}}))}^d &= 2^{-\kappa'} \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_{\mathfrak{e}}(\nu,\mathbf{m}^{\mathfrak{e}})) + 2^{-\kappa'} I^d = 2^{-\kappa} 2^{\mathfrak{e}} \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_{\mathfrak{e}}(\nu,\mathbf{m}^{\mathfrak{e}})) + \\ & 2^{-\kappa'} I^d \supset 2^{-\kappa} 2^{\mathfrak{e}} \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_{\mathfrak{e}}(\nu,\mathbf{m}^{\mathfrak{e}})) + 2^{-\kappa} I^d = Q_{\kappa,2^{\mathfrak{e}} \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_{\mathfrak{e}}(\nu,\mathbf{m}^{\mathfrak{e}}))}^d. \quad (1.3.38) \end{aligned}$$

Учитывая, что и $Q_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^d \subset D$, выберем последовательности $\nu^{\iota} \in \mathbb{Z}^d$, $j^{\iota} \in \mathcal{N}_{1,d}^1$, $\epsilon^{\iota} \in \{-1, 1\}$, $\iota = 0, \dots, \mathfrak{J}$, для которых $\nu^0 = \nu_{\kappa}^D(\nu)$, $\nu^{\mathfrak{J}} = 2^{\mathfrak{e}} \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_{\mathfrak{e}}(\nu,\mathbf{m}^{\mathfrak{e}}))$ и соблюдаются соотношения (1.3.31), (1.3.32), (1.3.33). Тогда

$$\begin{aligned} & \left\| S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\mathfrak{e}} f - S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_{\mathfrak{e}}(\nu,\mathbf{m}^{\mathfrak{e}}))}^{d,l-\mathfrak{e}} f \right\|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)} = \\ & \left\| S_{\kappa,\nu^0}^{d,l-\mathfrak{e}} f - S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_{\mathfrak{e}}(\nu,\mathbf{m}^{\mathfrak{e}}))}^{d,l-\mathfrak{e}} f \right\|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)} = \\ & \left\| S_{\kappa,\nu^0}^{d,l-\mathfrak{e}} f - \sum_{\iota=1}^{\mathfrak{J}} (S_{\kappa,\nu^{\iota}}^{d,l-\mathfrak{e}} f - S_{\kappa,\nu^{\iota-1}}^{d,l-\mathfrak{e}} f) - S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_{\mathfrak{e}}(\nu,\mathbf{m}^{\mathfrak{e}}))}^{d,l-\mathfrak{e}} f \right\|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)} = \\ & \left\| \sum_{\iota=0}^{\mathfrak{J}-1} (S_{\kappa,\nu^{\iota}}^{d,l-\mathfrak{e}} f - S_{\kappa,\nu^{\iota+1}}^{d,l-\mathfrak{e}} f) + S_{\kappa,\nu^{\mathfrak{J}}}^{d,l-\mathfrak{e}} f - S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_{\mathfrak{e}}(\nu,\mathbf{m}^{\mathfrak{e}}))}^{d,l-\mathfrak{e}} f \right\|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)} \leq \end{aligned}$$

$$\sum_{\iota=0}^{\mathfrak{J}-1} \|S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} + \|S_{\kappa, \nu^{\mathfrak{J}}}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell))}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)}. \quad (1.3.39)$$

Для проведения оценки слагаемых в правой части (1.3.39) отметим некоторые полезные для нас факты. При $\iota = 0, \dots, \mathfrak{J}, j = 1, \dots, d$ для $x \in \overline{Q}_{\kappa, \nu^\iota}^d$ ввиду (1.3.32), (1.3.13), (1.3.31) справедливо неравенство

$$\begin{aligned} & |x_j - 2^{-\kappa_j} n_j| \\ & \leq |x_j - 2^{-\kappa_j} (\nu^\iota)_j| + |2^{-\kappa_j} (\nu^\iota)_j - 2^{-\kappa_j} n_j| \leq 2^{-\kappa_j} + |2^{-\kappa_j} (\nu^\iota)_j - 2^{-\kappa_j} n_j| = \\ & 2^{-\kappa_j} + |2^{-\kappa_j} (\nu^\iota)_j - \sum_{i=0}^{\iota-1} (2^{-\kappa_j} (\nu^i)_j - 2^{-\kappa_j} (\nu^i)_j) - 2^{-\kappa_j} n_j| = \\ & 2^{-\kappa_j} + \left| \sum_{i=0}^{\iota-1} (2^{-\kappa_j} (\nu^{i+1})_j - 2^{-\kappa_j} (\nu^i)_j) + 2^{-\kappa_j} (\nu^0)_j - 2^{-\kappa_j} n_j \right| \leq \\ & 2^{-\kappa_j} + \sum_{i=0}^{\iota-1} |2^{-\kappa_j} (\nu^{i+1})_j - 2^{-\kappa_j} (\nu^i)_j| + |2^{-\kappa_j} (\nu^0)_j - 2^{-\kappa_j} n_j| \leq \\ & 2^{-\kappa_j} + \sum_{i=0}^{\iota-1} 2^{-\kappa_j} \|\nu^{i+1} - \nu^i\|_{l_\infty^d} + |2^{-\kappa_j} (\nu^0)_j - 2^{-\kappa_j} n_j| = \\ & 2^{-\kappa_j} + \sum_{i=0}^{\iota-1} 2^{-\kappa_j} \|\epsilon^i e_{ji}\|_{l_\infty^d} + |2^{-\kappa_j} (\nu_\kappa^D(\nu))_j - 2^{-\kappa_j} n_j| = \\ & 2^{-\kappa_j} + \sum_{i=0}^{\iota-1} 2^{-\kappa_j} + |2^{-\kappa_j} (\nu_\kappa^D(\nu))_j - 2^{-\kappa_j} n_j| = \\ & 2^{-\kappa_j} (\iota + 1) + |2^{-\kappa_j} (\nu_\kappa^D(\nu))_j - 2^{-\kappa_j} n_j| \leq 2^{-\kappa_j} (\mathfrak{J} + 1) + \Gamma_j^1 2^{-\kappa_j} \leq \\ & 2^{-\kappa_j} (c_{26} \|\nu_\kappa^D(\nu) - 2^\ell \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell))\|_{l_\infty^d} + 1) + \Gamma_j^1 2^{-\kappa_j}. \quad (1.3.40) \end{aligned}$$

Оценивая правую часть (1.3.40), имеем

$$\begin{aligned} & \|\nu_\kappa^D(\nu) - 2^\ell \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell))\|_{l_\infty^d} = \\ & \|\nu_\kappa^D(\nu) - \nu + \nu - 2^\ell \mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell) + 2^\ell \mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell) - 2^\ell \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell))\|_{l_\infty^d} \leq \\ & \|\nu_\kappa^D(\nu) - \nu\|_{l_\infty^d} + \|\nu - 2^\ell \mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell)\|_{l_\infty^d} + \|2^\ell \mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell) - 2^\ell \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell))\|_{l_\infty^d}, \quad (1.3.41) \end{aligned}$$

Замечая, что

$$\ell_j = [k/\alpha_j] - [(k-1)/\alpha_j] \leq 1 + 1/\alpha_j, j = 1, \dots, d, \quad (1.3.42)$$

получаем, что для $\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}$, $\mathbf{m}^{\mathfrak{k}} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}^m(\nu)$ при $j \in \mathcal{N}_{1,d}^1 \setminus f(\mathfrak{k})$ имеет место равенство

$$\nu_j - (2^{\mathfrak{k}} \mathbf{n}_{\mathfrak{k}}(\nu, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}}))_j = \nu_j - 2^{\mathfrak{k}j} (\mathbf{n}_{\mathfrak{k}}(\nu, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}}))_j = \nu_j - 1 \cdot \nu_j = 0,$$

а при $j \in f(\mathfrak{k})$ справедливо соотношение

$$\begin{aligned} |\nu_j - (2^{\mathfrak{k}} \mathbf{n}_{\mathfrak{k}}(\nu, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}}))_j| &= |\nu_j - 2^{\mathfrak{k}j} (\mathbf{n}_{\mathfrak{k}}(\nu, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}}))_j| = \\ &= |\nu_j - 2^{\mathfrak{k}j} (\nu_j 2^{-\mathfrak{k}j} - \sum_{s_j=1}^{\mathfrak{k}j} \mathbf{m}_{j, \mathfrak{k}j-s_j+1} 2^{-(\mathfrak{k}j-s_j+1)})| = \\ &= |\nu_j - \nu_j + \sum_{s_j=1}^{\mathfrak{k}j} \mathbf{m}_{j, \mathfrak{k}j-s_j+1} 2^{s_j-1}| = \sum_{s_j=1}^{\mathfrak{k}j} \mathbf{m}_{j, \mathfrak{k}j-s_j+1} 2^{s_j-1} \leq \\ &= \sum_{s_j=1}^{\mathfrak{k}j} (m_j + 1) 2^{s_j-1} \leq (m_j + 1) 2^{\mathfrak{k}j} \leq (m_j + 1) 2^{1+1/\alpha_j}, \end{aligned}$$

и, значит,

$$\|\nu - 2^{\mathfrak{k}} \mathbf{n}_{\mathfrak{k}}(\nu, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}})\|_{l_{\infty}^d} \leq \max_{j \in \mathcal{N}_{1,d}^1} (m_j + 1) 2^{1+1/\alpha_j}. \quad (1.3.43)$$

Учитывая, что для $\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}$, $\mathbf{m}^{\mathfrak{k}} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}^m(\nu)$ мультииндекс $\mathbf{n}_{\mathfrak{k}}(\nu, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}}) \in N_{\kappa'}^{d,m,D}$, согласно (1.3.12), (1.3.42) находим, что

$$\begin{aligned} \|2^{\mathfrak{k}} \mathbf{n}_{\mathfrak{k}}(\nu, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}}) - 2^{\mathfrak{k}} \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_{\mathfrak{k}}(\nu, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}}))\|_{l_{\infty}^d} &= \|2^{\mathfrak{k}} (\mathbf{n}_{\mathfrak{k}}(\nu, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}}) - \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_{\mathfrak{k}}(\nu, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}})))\|_{l_{\infty}^d} \leq \\ &\leq \|2^{\mathfrak{k}}\|_{l_{\infty}^d} \|\mathbf{n}_{\mathfrak{k}}(\nu, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}}) - \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_{\mathfrak{k}}(\nu, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}}))\|_{l_{\infty}^d} \leq c_3 \max_{j \in \mathcal{N}_{1,d}^1} 2^{1+1/\alpha_j}. \end{aligned} \quad (1.3.44)$$

Используя для оценки правой части (1.3.41) неравенства (1.3.12), (1.3.43), (1.3.44), выводим

$$\begin{aligned} \|\nu_{\kappa}^D(\nu) - 2^{\mathfrak{k}} \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_{\mathfrak{k}}(\nu, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}}))\|_{l_{\infty}^d} &\leq c_3 + (\max_{j \in \mathcal{N}_{1,d}^1} (m_j + 1) 2^{1+1/\alpha_j}) + c_3 \max_{j \in \mathcal{N}_{1,d}^1} 2^{1+1/\alpha_j} = \\ &= c_{31}(d, m, D, \alpha), \nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}, \mathbf{m}^{\mathfrak{k}} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{k}}^m(\nu). \end{aligned} \quad (1.3.45)$$

Объединяя (1.3.40), (1.3.45). видим, что для $\iota = 0, \dots, \mathfrak{J}$ имеет место включение

$$\overline{Q}_{\kappa, \nu^{\iota}}^d \subset (2^{-\kappa} n + \Gamma^2 2^{-\kappa} B^d)$$

с $\Gamma^2 = (c_{26} c_{31} + 1) \mathfrak{e} + \Gamma^1$, из которого с учетом (1.3.33) следует, что

$$Q_{\kappa, \nu^{\iota}}^d \cup Q_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^d \subset Q^{\iota} \subset D \cap (2^{-\kappa} n + \Gamma^2 2^{-\kappa} B^d), \iota = 0, \dots, \mathfrak{J} - 1. \quad (1.3.46)$$

Заметим еще, что для $x \in \overline{Q}_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell))}^d$ при $j = 1, \dots, d$, благодаря (1.3.42), (1.3.45), (1.3.13), соблюдается неравенство

$$\begin{aligned}
|x_j - 2^{-\kappa_j} n_j| &= |x_j - 2^{-\kappa'_j} (\nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell)))_j + 2^{-\kappa'_j} (\nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell)))_j - 2^{-\kappa_j} n_j| \leq \\
&|x_j - 2^{-\kappa'_j} (\nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell)))_j| + |2^{-\kappa'_j} (\nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell)))_j - 2^{-\kappa_j} n_j| \leq \\
&2^{-\kappa'_j} + |2^{-\kappa'_j} (\nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell)))_j - 2^{-\kappa_j} n_j| = \\
&2^{\mathfrak{k}_j} 2^{-\kappa_j} + |2^{-\kappa_j} 2^{\mathfrak{k}_j} (\nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell)))_j - 2^{-\kappa_j} n_j| \leq \\
&2^{1+1/\alpha_j} 2^{-\kappa_j} + 2^{-\kappa_j} |2^{\mathfrak{k}_j} (\nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell)))_j - n_j| \leq \\
&2^{1+1/\alpha_j} 2^{-\kappa_j} + 2^{-\kappa_j} |(2^{\mathfrak{k}_j} \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell)))_j - (\nu_{\kappa}^D(\nu))_j| + 2^{-\kappa_j} |(\nu_{\kappa}^D(\nu))_j - n_j| \leq \\
&2^{1+1/\alpha_j} 2^{-\kappa_j} + 2^{-\kappa_j} \|2^{\mathfrak{k}_j} \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell)) - \nu_{\kappa}^D(\nu)\|_{l_\infty^d} + |2^{-\kappa_j} (\nu_{\kappa}^D(\nu))_j - 2^{-\kappa_j} n_j| \leq \\
&2^{1+1/\alpha_j} 2^{-\kappa_j} + c_{31} 2^{-\kappa_j} + 2^{-\kappa_j} \Gamma_j^1 = 2^{-\kappa_j} \Gamma_j^3
\end{aligned}$$

с $\Gamma_j^3 = 2^{1+1/\alpha_j} + c_{31} + \Gamma_j^1$, т.е.

$$Q_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell))}^d \subset \overline{Q}_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell))}^d \subset (2^{-\kappa} n + \Gamma^3 2^{-\kappa} B^d). \quad (1.3.47)$$

Итак, задавая координаты вектора $\Gamma^4 \in \mathbb{R}_+^d$ соотношением $\Gamma_j^4 = \max(\Gamma_j^2, \Gamma_j^3)$, $j = 1, \dots, d$, и обозначая

$$D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha} = 2^{-\kappa} n + \Gamma^4 2^{-\kappa} B^d, n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset,$$

в силу (1.3.46), (1.3.47) имеем

$$Q_{\kappa, \nu^\ell}^d \cup Q_{\kappa, \nu^{\ell+1}}^d \subset Q^\ell \subset D \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}, \ell = 0, \dots, \mathfrak{J} - 1. \quad (1.3.48)$$

$$Q_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_\ell(\nu, \mathbf{m}^\ell))}^d \subset D \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}, \nu \in N_{\kappa}^{d, m, D} : Q_{\kappa, n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d, m} \neq \emptyset, \mathbf{m}^\ell \in \mathfrak{M}_\ell^m(\nu). \quad (1.3.49)$$

Из приведенных определений с учетом того, что $\Gamma^4 > \mathfrak{e}$, видно, что при $n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset$, справедливо включение

$$Q_{\kappa, n}^d \subset D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}, \quad (1.3.50)$$

а из (1.3.48), (1.3.50) следует, что

$$Q_{\kappa, n}^d \subset (2^{-\kappa} \nu^\ell + (\Gamma^4 + \mathfrak{e}) 2^{-\kappa} B^d), \ell = 0, \dots, \mathfrak{J}. \quad (1.3.51)$$

Учитывая (1.3.50), нетрудно видеть, что существует константа $c_{32}(d, m, D, \alpha) > 0$ такая, что для каждого $x \in \mathbb{R}^d$ число

$$\text{card}\{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset, x \in D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}\} \leq c_{32}. \quad (1.3.52)$$

Отметим еще, что вследствие (1.3.31), (1.3.45) справедлива оценка

$$\mathfrak{J} \leq c_{26} \|\nu^0 - \nu^{\mathfrak{J}}\|_{l_\infty^d} = c_{26} \|\nu_\kappa^D(\nu) - 2^\mathfrak{k} \nu_{\kappa'}^D(\mathbf{n}_\mathfrak{k}(\nu, \mathbf{m}^\mathfrak{k}))\|_{l_\infty^d} \leq c_{26} c_{31} = c_{33}(d, m, D, \alpha). \quad (1.3.53)$$

Принимая во внимание, что при $\iota = 0, \dots, \mathfrak{J} - 1$ ввиду (1.3.33), (1.3.32) выполняется равенство

$$Q^\iota = \begin{cases} 2^{-\kappa} \nu^\iota + 2^{-(\kappa - e_{j^\iota})} I^d, & \text{при } \epsilon^\iota = 1; \\ 2^{-\kappa} \nu^{\iota+1} + 2^{-(\kappa - e_{j^\iota})} I^d, & \text{при } \epsilon^\iota = -1, \end{cases}$$

определим линейный оператор $S^\iota : L_1(Q^\iota) \mapsto \mathcal{P}^{d, l-\epsilon}$, полагая

$$S^\iota = P_{\delta, x^0}^{d, l-\epsilon}$$

при $\delta = 2^{-(\kappa - e_{j^\iota})}$,

$$x^0 = \begin{cases} 2^{-\kappa} \nu^\iota, & \text{при } \epsilon^\iota = 1; \\ 2^{-\kappa} \nu^{\iota+1}, & \text{при } \epsilon^\iota = -1, \end{cases} \quad \iota = 0, \dots, \mathfrak{J} - 1.$$

Теперь проведем оценку слагаемых в правой части (1.3.39). При $\iota = 0, \dots, \mathfrak{J} - 1$, благодаря (1.3.51) применяя (1.1.1), а, затем используя (1.1.2), (1.1.3), (1.3.48), и наконец, пользуясь (1.1.4) и учитывая (1.3.48), приходим к неравенству

$$\begin{aligned} & \|S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} = \\ & \|S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l-\epsilon} f - S^\iota f + S^\iota f - S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} \leq \\ & \|S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l-\epsilon} f - S^\iota f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} + \|S^\iota f - S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} \leq \\ & c_{34} \|S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l-\epsilon} f - S^\iota f\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^\iota}^d)} + c_{34} \|S^\iota f - S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^d)} = \\ & c_{34} \|S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l-\epsilon} (f - S^\iota f)\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^\iota}^d)} + c_{34} \|S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l-\epsilon} (f - S^\iota f)\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^d)} \leq \\ & c_{35} \|f - S^\iota f\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^\iota}^d)} + c_{35} \|f - S^\iota f\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^d)} \leq c_{36} \|f - S^\iota f\|_{L_p(Q^\iota)} \leq \\ & c_{37} \sum_{j=1}^d ((2^{-(\kappa - e_{j^\iota})})_j)^{-1/p} \left(\int_{(2^{-(\kappa - e_{j^\iota})})_j B^1} \int_{Q_{l_j \xi e_j}^\iota} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \leq \\ & c_{38} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1} B^1} \int_{Q_{l_j \xi e_j}^\iota} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \leq \\ & c_{38} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1} B^1} \int_{(D \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha})_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \leq \end{aligned}$$

$$c_{38} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p}. \quad (1.3.54)$$

Для оценки последнего слагаемого в правой части (1.3.39), ввиду (1.3.51) используя (1.1.1), затем пользуясь (1.1.2), (1.1.3), учитывая (1.3.38), применяя (1.1.4) и принимая во внимание (1.3.49), получаем

$$\begin{aligned} & \|S_{\kappa, \nu \mathfrak{J}}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_{\mathfrak{t}}(\nu, \mathfrak{m}^{\mathfrak{t}}))}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} \leq \\ & c_{39} \|S_{\kappa, \nu \mathfrak{J}}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_{\mathfrak{t}}(\nu, \mathfrak{m}^{\mathfrak{t}}))}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu \mathfrak{J}}^d)} = \\ & c_{39} \|S_{\kappa, \nu \mathfrak{J}}^{d, l-\epsilon} (f - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_{\mathfrak{t}}(\nu, \mathfrak{m}^{\mathfrak{t}}))}^{d, l-\epsilon} f)\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu \mathfrak{J}}^d)} \leq \\ & c_{40} \|f - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_{\mathfrak{t}}(\nu, \mathfrak{m}^{\mathfrak{t}}))}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu \mathfrak{J}}^d)} \leq \\ & c_{40} \|f - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_{\mathfrak{t}}(\nu, \mathfrak{m}^{\mathfrak{t}}))}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_{\mathfrak{t}}(\nu, \mathfrak{m}^{\mathfrak{t}}))}^d)} \leq \\ & c_{41} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa'_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa'_j} B^1} \int_{(Q_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_{\mathfrak{t}}(\nu, \mathfrak{m}^{\mathfrak{t}}))}^d)^{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \leq \\ & c_{41} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{42} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{(D \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha})^{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \leq \\ & c_{41} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{42} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p}, \quad (1.3.55) \end{aligned}$$

где $c_{42} = \max_{j=1, \dots, d} 2^{1+1/\alpha_j} > 2$. Объединяя (1.3.39), (1.3.54), (1.3.55) и учитывая (1.3.53), при $n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset, \nu \in N_{\kappa}^{d, m, D} : Q_{\kappa, n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d, m} \neq \emptyset, \mathfrak{m}^{\mathfrak{t}} \in \mathfrak{M}_{\mathfrak{t}}^m(\nu)$ имеем

$$\begin{aligned} & \|S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_{\mathfrak{t}}(\nu, \mathfrak{m}^{\mathfrak{t}}))}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} \leq \\ & \mathfrak{I} c_{38} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} + \\ & c_{41} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{42} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \leq \\ & c_{33} c_{38} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{42} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} + \\ & c_{41} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{42} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} = \end{aligned}$$

$$c_{43} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{42} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p}. \quad (1.3.56)$$

Из (1.3.37) и (1.3.56) находим, что при $\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)$, $n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset$, $\nu \in N_{\kappa}^{d, m, D} : Q_{\kappa, n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d, m} \neq \emptyset$, $\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_{\sharp}^m(\nu)$ выполняется неравенство

$$\begin{aligned} & \|\mathcal{D}^\mu(S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_{\sharp}(\nu, \mathfrak{m}^\sharp))}^{d, l-\epsilon} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d, m}\|_{L_q(Q_{\kappa, n}^d)} \leq \\ & c_{44} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{42} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p}. \end{aligned}$$

Подставляя эту оценку в (1.3.36) и учитывая (1.2.20), (1.3.17), а затем, применяя неравенство Гёльдера с показателем q и неравенство Гёльдера с показателем $p/q \leq 1$, и, наконец, принимая во внимание (1.3.52) и используя неравенство Гёльдера с показателем $1/q$, при $\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)$ выводим

$$\begin{aligned} & \left\| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d, m, D}} \left(\sum_{\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_{\sharp}^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^\sharp}^m \mathcal{D}^\mu(S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\mathfrak{n}_{\sharp}(\nu, \mathfrak{m}^\sharp))}^{d, l-\epsilon} f) \right) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d, m} \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)}^q \leq \\ & \sum_{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset} \left(\sum_{\substack{\nu \in N_{\kappa}^{d, m, D} : \\ Q_{\kappa, n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d, m} \neq \emptyset}} \sum_{\mathfrak{m}^\sharp \in \mathfrak{M}_{\sharp}^m(\nu)} A_{\mathfrak{m}^\sharp}^m c_{44} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \times \right. \\ & \left. \left(\int_{c_{42} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \right)^q \leq \\ & \sum_{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset} \left(c_5 c_{44} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \times \right. \\ & \left. \left(\int_{c_{42} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \right)^q = \\ & (c_{45} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \sum_{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset} \left(\sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \times \right. \\ & \left. \left(\int_{c_{42} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \right)^q \leq \\ & (c_{46} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \sum_{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j q/p} \times \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \left(\int_{c_{42} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa, n}^{'d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} = \\
& (c_{46} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j q/p} \times \\
& \sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset} \left(\int_{c_{42} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa, n}^{'d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} \leq \\
& (c_{46} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j q/p} \times \\
& \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset} \int_{c_{42} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa, n}^{'d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} = \\
& (c_{46} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j q/p} \times \\
& \left(\int_{c_{42} 2^{-\kappa_j} B^1} \sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset} \int_{D_{l_j \xi e_j}} \chi_{D_{\kappa, n}^{'d, m, D, \alpha}}(x) |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} = \\
& (c_{46} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j q/p} \times \\
& \left(\int_{c_{42} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j}} \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset} \chi_{D_{\kappa, n}^{'d, m, D, \alpha}}(x) \right) |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} \leq \\
& (c_{46} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j q/p} \left(\int_{c_{42} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j}} c_{32} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} \leq \\
& (c_{47} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \left(\sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{42} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \right)^q = \\
& (c_{47} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{42} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p})^q \leq \\
& (c_{47} 2^{k(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)})^q \sum_{j=1}^d 2^{k/(\alpha_j p)} \left(\int_{c_{28} 2^{-k/\alpha_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p})^q \leq
\end{aligned}$$

$$(c_{48}2^{k(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)} \sum_{j=1}^d \Omega_j^{l_j}(f, c_{28}2^{-k/\alpha_j})_{L_p(D)})^q. \quad (1.3.57)$$

Соединяя (1.3.35) с (1.3.57), приходим к (1.3.34) при $p \leq q$. Для получения неравенства (1.3.34) при $q < p$, фиксировав ограниченную область D' в $\mathbb{R}^d$, для которой $\text{supp } h \subset D'$ для $h \in \mathcal{P}_\kappa^{d, l, m, D}$ при $\kappa \in \mathbb{Z}_+^d$, благодаря неравенству Гёльдера и соблюдению (1.3.34) при $q = p$, имеем

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}^\lambda \mathcal{E}_k^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} &= \|\mathcal{D}^\lambda \mathcal{E}_k^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f\|_{L_q(D')} \leq \\ c(D') \|\mathcal{D}^\lambda \mathcal{E}_k^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f\|_{L_p(D')} &= c(D') \|\mathcal{D}^\lambda \mathcal{E}_k^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} \leq \\ c_{27}2^{k(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)} \sum_{j=1}^d \Omega_j^{l_j}(f, c_{28}2^{-k/\alpha_j})_{L_p(D)}, & f \in L_p(D). \square \end{aligned}$$

Следствие

В условиях предложения 1.3.4 для $f \in L_p(D)$ при $k \in \mathbb{Z}_+ : k > K^0(D, \alpha)$, имеет место неравенство

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}^\lambda((E_k^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f) |_D) - \mathcal{D}^\lambda((E_{k-1}^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f) |_D)\|_{L_q(D)} \\ \leq c_{27}2^{k(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)} \sum_{j=1}^d \Omega_j^{l_j}(f, c_{28}2^{-k/\alpha_j})_{L_p(D)}. \end{aligned} \quad (1.3.58)$$

В самом деле, при соблюдении условий предложения 1.3.4 для $f \in L_p(D)$ при $k \in \mathbb{Z}_+ : k > K^0$, полагая $\kappa = \kappa(k, \alpha)$, $\kappa' = \kappa(k-1, \alpha)$, согласно (1.2.10), (1.3.30), (1.3.34) имеем

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}^\lambda((E_k^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f) |_D) - \mathcal{D}^\lambda((E_{k-1}^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f) |_D)\|_{L_q(D)} &= \\ \|\mathcal{D}^\lambda((E_\kappa^{d, l-\epsilon, m, D} f) |_D) - \mathcal{D}^\lambda((E_{\kappa'}^{d, l-\epsilon, m, D} f) |_D)\|_{L_q(D)} &= \\ \|\mathcal{D}^\lambda((E_\kappa^{d, l-\epsilon, m, D} f) |_D - (E_{\kappa'}^{d, l-\epsilon, m, D} f) |_D)\|_{L_q(D)} &= \\ \|\mathcal{D}^\lambda((E_\kappa^{d, l-\epsilon, m, D} f) |_D - (H_{\kappa, \kappa'}^{d, l-\epsilon, m, D}(E_{\kappa'}^{d, l-\epsilon, m, D} f)) |_D)\|_{L_q(D)} &= \\ \|\mathcal{D}^\lambda((E_\kappa^{d, l-\epsilon, m, D} f - H_{\kappa, \kappa'}^{d, l-\epsilon, m, D}(E_{\kappa'}^{d, l-\epsilon, m, D} f)) |_D)\|_{L_q(D)} &= \\ \|\mathcal{D}^\lambda((\mathcal{E}_k^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f) |_D)\|_{L_q(D)} &= \|(\mathcal{D}^\lambda(\mathcal{E}_k^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f)) |_D\|_{L_q(D)} \leq \\ \|\mathcal{D}^\lambda \mathcal{E}_k^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} &\leq c_{27}2^{k(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)} \sum_{j=1}^d \Omega_j^{l_j}(f, c_{28}2^{-k/\alpha_j})_{L_p(D)}. \end{aligned}$$

Предложение 1.3.5

Пусть выполнены условия предложения 1.3.4. Тогда существуют константы $c_{49}(d, l, m, D, \alpha, \lambda, p, q) > 0$, $c_{50}(d, m, D, \alpha) > 0$ такие, что если для функции $f \in L_p(D)$ функция

$$K(f, t) = K_{p,q}^{d,l,m,D,\alpha,\lambda}(f, t) = t^{-(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon) - 1} \sum_{j=1}^d \Omega_j^{l_j}(f, c_{50} t^{1/\alpha_j})_{L_p(D)} \in L_1(I), \quad (1.3.59)$$

то для любого $k \in \mathbb{Z}_+ : k \geq K^0$ справедливо неравенство

$$\|\mathcal{D}^\lambda f - \mathcal{D}^\lambda((E_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D)\|_{L_q(D)} \leq c_{49} \int_0^{2^{-k}} K(f, t) dt. \quad (1.3.60)$$

Доказательство.

Прежде всего заметим, что в условиях предложения 1.3.5 в силу предложения 1.3.1 для $f \in L_p(D)$ имеет место равенство (1.3.3) с константой K^0 вместо k^0 (см. определение области α -типа). Далее, пусть $f \in L_p(D)$ и соблюдается условие (1.3.59). Тогда согласно (1.3.58) при $k \in \mathbb{Z}_+ : k > K^0$, выполняется неравенство

$$\begin{aligned} & \|\mathcal{D}^\lambda((E_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D) - \mathcal{D}^\lambda((E_{k-1}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D)\|_{L_q(D)} \\ & \leq c_{27} 2^{k(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)} \sum_{j=1}^d \Omega_j^{l_j}(f, c_{28} 2^{-k/\alpha_j})_{L_p(D)} \leq \\ & c_{49} \int_{2^{-k}}^{2^{-k+1}} t^{-(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon) - 1} \sum_{j=1}^d \Omega_j^{l_j}(f, c_{50} t^{1/\alpha_j})_{L_p(D)} dt. \end{aligned} \quad (1.3.61)$$

Из (1.3.61) и (1.3.59) вытекает, что ряд

$$\mathcal{D}^\lambda((E_{K^0}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D) + \sum_{k=K^0+1}^{\infty} (\mathcal{D}^\lambda((E_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D) - \mathcal{D}^\lambda((E_{k-1}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D))$$

сходится в $L_q(D)$. Принимая во внимание это обстоятельство, а также равенство (1.3.3), для любой функции $\phi \in C_0^\infty(D)$ имеем

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{D}^\lambda f, \phi \rangle &= (-1)^{|\lambda|} \int_D f \mathcal{D}^\lambda \phi dx = (-1)^{|\lambda|} \int_D E_{K^0}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f \mathcal{D}^\lambda \phi dx + \\ & \sum_{k=K^0+1}^{\infty} (-1)^{|\lambda|} \int_D (E_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f - E_{k-1}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) \mathcal{D}^\lambda \phi dx = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \int_D \mathcal{D}^\lambda(E_{K^0}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) \phi dx \\
& + \sum_{k=K^0+1}^{\infty} \int_D (\mathcal{D}^\lambda(E_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) - \mathcal{D}^\lambda(E_{k-1}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f)) \phi dx \\
& = \int_D \left(\mathcal{D}^\lambda((E_{K^0}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D) + \right. \\
& \quad \left. \sum_{k=K^0+1}^{\infty} (\mathcal{D}^\lambda((E_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D) - \mathcal{D}^\lambda((E_{k-1}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D)) \right) \phi dx.
\end{aligned}$$

А это значит, что для обобщённой производной $\mathcal{D}^\lambda f$ функции f в $L_q(D)$ имеет место равенство

$$\mathcal{D}^\lambda f = \mathcal{D}^\lambda((E_{K^0}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D) + \sum_{k=K^0+1}^{\infty} \left(\mathcal{D}^\lambda((E_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D) - \mathcal{D}^\lambda((E_{k-1}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D) \right).$$

Исходя из этого равенства, используя (1.3.61), при $k \in \mathbb{Z}_+ : k \geq K^0$ выводим оценку

$$\begin{aligned}
& \|\mathcal{D}^\lambda f - \mathcal{D}^\lambda((E_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D)\|_{L_q(D)} \leq \\
& \sum_{j=k+1}^{\infty} \left\| \mathcal{D}^\lambda((E_j^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D) - \mathcal{D}^\lambda((E_{j-1}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D) \right\|_{L_q(D)} \\
& \leq \sum_{j=k+1}^{\infty} c_{49} \int_{2^{-j}}^{2^{-j+1}} K(f, t) dt = c_{49} \int_0^{2^{-k}} K(f, t) dt,
\end{aligned}$$

что совпадает с (1.3.60). $\square$

Предложение 1.3.6

Пусть $d \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{R}_+^d, l = l(\alpha), m \in \mathbb{N}^d, \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(m), D \subset \mathbb{R}^d$ – ограниченная область α -типа. Пусть ещё $1 \leq p < \infty, 1 \leq q \leq \infty$ и соблюдается условие

$$1 - (\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon) > 0. \quad (1.3.62)$$

Тогда существует константа $c_{51}(d, \alpha, m, D, \lambda, p, q) > 0$ такая, что для любой функции $f \in (\mathcal{H}_p^\alpha)'(D)$ при $k \in \mathbb{Z}_+ : k \geq K^0$, имеет место неравенство

$$\|\mathcal{D}^\lambda f - \mathcal{D}^\lambda E_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f\|_{L_q(D)} \leq c_{51} 2^{-k(1-(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon))}. \quad (1.3.63)$$

Доказательство.

Прежде всего заметим, что для параметров $d, \alpha, l, m, \lambda, p, q, D$, указанных в условии предложения, при соблюдении неравенства (1.3.62) для $f \in (\mathcal{H}_p^\alpha)'(D)$ при $t \in I$ справедливо соотношение

$$\begin{aligned}
K(f, t) &= t^{-(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon) - 1} \sum_{j=1}^d \Omega_j^{l_j}(f, c_{50} t^{1/\alpha_j})_{L_p(D)} \\
&\leq c_{52} t^{-(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)} \max_{j=1, \dots, d} \sup_{\tau > 0} \tau^{-\alpha_j} \Omega_j^{l_j}(f, \tau)_{L_p(D)} \in L_1(I). \quad (1.3.64)
\end{aligned}$$

Принимая во внимание (1.3.59) и (1.3.64), в соответствии с (1.3.60) заключаем, что для $f \in (\mathcal{H}_p^\alpha)'(D)$ при $k \in \mathbb{Z}_+ : k \geq K^0$, имеет место оценка

$$\begin{aligned}
&\|\mathcal{D}^\lambda f - \mathcal{D}^\lambda((E_k^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f) \mid_D)\|_{L_q(D)} \leq \\
&c_{49} \int_0^{2^{-k}} c_{52} t^{-(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)} dt = c_{51} 2^{-k(1 - (\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon))}. \square
\end{aligned}$$

Теорема 1.3.7

Пусть $d \in \mathbb{N}$, $\alpha \in \mathbb{R}_+^d$, $l = l(\alpha)$, $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d$. Пусть ещё $1 \leq p < \infty$, $1 \leq q \leq \infty$ и соблюдается условие (1.3.62). Тогда существуют константы $c_{53}(d, \alpha, \lambda, p, q) > 0$ и $c_{54}(d, \alpha) > 0$ такие, что для любого $\delta \in \mathbb{R}_+^d$ и любого $x^0 \in \mathbb{R}^d$ для $Q = x^0 + \delta I^d$ для любой функции $f \in (H_p^\alpha)'(Q)$ справедливо неравенство

$$\begin{aligned}
&\|\mathcal{D}^\lambda f - \mathcal{D}^\lambda P_{\delta, x^0}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_q(Q)} \leq \\
&c_{53} \delta^{-\lambda - p^{-1}\epsilon + q^{-1}\epsilon} \int_0^1 t^{-(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon) - 1} \times \\
&\sum_{j=1}^d \delta_j^{-1/p} t^{-p^{-1}/\alpha_j} \left(\int_{c_{54} \delta_j t^{1/\alpha_j} B^1} \int_{Q_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} dt. \quad (1.3.65)
\end{aligned}$$

Доказательство.

Нетрудно видеть, что при любом $\alpha \in \mathbb{R}_+^d$ куб I^d является ограниченной областью α -типа, причем константа $K^0 = K^0(D, \alpha)$ из определения области α -типа равна 0. Фиксировав $m \in \mathbb{N}^d$, для которого $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d(m)$, учитывая, что для $f \in (H_p^\alpha)'(I^d)$ в силу (1.3.62) имеет место (1.3.64) при $D = I^d$, а, следовательно, соблюдается (1.3.59), согласно (1.3.60) при $k = 0$, с учётом того, что ввиду (1.2.4) для $x \in I^d$ выполняется равенство $(E_0^{d, l-\epsilon, m, I^d, \alpha} f)(x) = (P_{\epsilon, 0}^{d, l-\epsilon} f)(x)$, получаем (1.3.65) при $\delta = \epsilon$, $x^0 = 0$. А отсюда выводим неравенство (1.3.65) при произвольных $\delta \in \mathbb{R}_+^d$ и $x^0 \in \mathbb{R}^d$ путём перехода от функции $f \in (H_p^\alpha)'(Q)$ к функции $(h_{\delta, x^0} f)(\cdot) = f(x^0 + \delta \cdot) \in (H_p^\alpha)'(I^d)$, и, учитывая тот факт, что $P_{\delta, x^0}^{d, l-\epsilon} f = h_{\delta, x^0}^{-1} P_{\epsilon, 0}^{d, l-\epsilon} h_{\delta, x^0} f$, $f \in L_1(Q)$. $\square$

Теорема 1.3.8

Пусть $d \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{R}_+^d, 1 \leq p < \infty, D \subset \mathbb{R}^d$ – ограниченная область α -типа и соблюдается условие

$$1 - (\alpha^{-1}, p^{-1}\mathfrak{e}) > 0. \quad (1.3.66)$$

Тогда имеет место включение

$$(H_p^\alpha)'(D) \subset C(D). \quad (1.3.67)$$

Доказательство.

Для доказательства (1.3.67) достаточно заметить, что при выполнении (1.3.66) и $m \in \mathbb{N}^d$ в силу (1.3.63) каждая функция $f \in (\mathcal{H}_p^\alpha)'(D)$, а, следовательно, и каждая функция $f \in (H_p^\alpha)'(D)$ является пределом в $L_\infty(D)$ равномерно сходящейся на $\overline{D}$ последовательности непрерывных в $\mathbb{R}^d$ функций $\{E_k^{d,l-\mathfrak{e},m,D,\alpha} f, k \in \mathbb{Z}_+ : k \geq K^0\}$. $\square$

§2. Продолжение функций из пространств $(H_p^\alpha)'(D)$ и $(B_{p,\theta}^\alpha)'(D)$

2.1. В этом пункте доказывается один из важнейших результатов работы

Теорема 2.1.1

Пусть $d \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{R}_+^d, 1 \leq p < \infty, 1 \leq \theta \leq \infty$ и $D \subset \mathbb{R}^d$ – ограниченная область α -типа. Тогда существует непрерывное линейное отображение $E^{d,\alpha,p,\theta,D} : (B_{p,\theta}^\alpha)'(D) \mapsto L_p(\mathbb{R}^d)$ такое, что для любой функции $f \in (B_{p,\theta}^\alpha)'(D)$ соблюдается равенство

$$(E^{d,\alpha,p,\theta,D} f)|_D = f, \quad (2.1.1)$$

а при $\mathfrak{l} \in \mathbb{Z}_+^d : \mathfrak{l} < \alpha$, существует константа $C_0(d, \alpha, p, \theta, D, \mathfrak{l}) > 0$, для которой выполняется неравенство

$$\|E^{d,\alpha,p,\theta,D} f\|_{(B_{p,\theta}^\alpha)^\mathfrak{l}(\mathbb{R}^d)} \leq C_0 \|f\|_{(B_{p,\theta}^\alpha)'(D)}. \quad (2.1.2)$$

Доказательство.

В условиях теоремы положим $l = l(\alpha)$ и фиксируем $m \in \mathbb{N}^d$ так, чтобы $l \in \mathbb{Z}_+^d(m)$. Отметим еще, что в качестве K^0 рассматривается константа из определения области α -типа. Сначала рассмотрим случай, когда $\theta \neq \infty$.

Прежде всего заметим, что для $f \in (B_{p,\theta}^\alpha)'(D)$ ряд

$$\sum_{k=K^0+1}^{\infty} \|\mathcal{E}_k^{d,l-\mathfrak{e},m,D,\alpha} f\|_{L_p(\mathbb{R}^d)}$$

сходится, ибо в силу (1.3.34) при $q = p, \lambda = 0$, и неравенства Гёльдера имеет место оценка

$$\begin{aligned}
\sum_{k \in \mathbb{N}: n \leq k \leq n+r} \|\mathcal{E}_k^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} &\leq \sum_{k \in \mathbb{N}: n \leq k \leq n+r} c_1 \sum_{j=1}^d \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-k/\alpha_j})_{L_p(D)} = \\
&= c_1 \sum_{j=1}^d \sum_{k \in \mathbb{N}: n \leq k \leq n+r} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-k/\alpha_j})_{L_p(D)} = \\
&= c_1 \sum_{j=1}^d \sum_{k \in \mathbb{N}: n \leq k \leq n+r} 2^{-k} 2^k \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-k/\alpha_j})_{L_p(D)} \leq \\
&\leq c_1 \sum_{j=1}^d \left(\sum_{k \in \mathbb{N}: n \leq k \leq n+r} 2^{-\theta' k} \right)^{1/\theta'} \left(\sum_{k \in \mathbb{N}: n \leq k \leq n+r} (2^k \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-k/\alpha_j})_{L_p(D)})^\theta \right)^{1/\theta} \leq \\
&\leq c_3 \sum_{j=1}^d \left(\sum_{k \in \mathbb{N}: n \leq k \leq n+r} 2^{-\theta' k} \right)^{1/\theta'} \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} ((2^{-(k-1)/\alpha_j})^{-\alpha_j} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-k/\alpha_j})_{L_p(D)})^\theta \right)^{1/\theta} \leq \\
&\leq c_4 \sum_{j=1}^d \left(\sum_{k \in \mathbb{N}: n \leq k \leq n+r} 2^{-\theta' k} \right)^{1/\theta'} \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} \int_{2^{-k/\alpha_j}}^{2^{-(k-1)/\alpha_j}} t^{-1-\theta\alpha_j} (\Omega_j^{l_j}(f, c_2 t)_{L_p(D)})^\theta dt \right)^{1/\theta} \leq \\
&\leq c_4 \sum_{j=1}^d \left(\sum_{k \in \mathbb{N}: n \leq k \leq n+r} 2^{-\theta' k} \right)^{1/\theta'} \left(\int_{\mathbb{R}_+} t^{-1-\theta\alpha_j} (\Omega_j^{l_j}(f, c_2 t)_{L_p(D)})^\theta dt \right)^{1/\theta} \leq \\
&\leq c_5 \sum_{j=1}^d \left(\sum_{k \in \mathbb{N}: n \leq k \leq n+r} 2^{-\theta' k} \right)^{1/\theta'} \left(\int_{\mathbb{R}_+} t^{-1-\theta\alpha_j} (\Omega_j^{l_j}(f, t)_{L_p(D)})^\theta dt \right)^{1/\theta}, \\
&\quad n \in \mathbb{N} : n > K^0, r \in \mathbb{Z}_+, \quad (2.1.3)
\end{aligned}$$

где $\theta' = \theta/(\theta - 1)$.

Поэтому для $f \in (B_{p,\theta}^\alpha)'(D)$ ряд $\sum_{k=K^0+1}^\infty \mathcal{E}_k^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f$ сходится в $L_p(\mathbb{R}^d)$. Определим отображение $E^{d, \alpha, p, \theta, D} : (B_{p,\theta}^\alpha)'(D) \mapsto L_p(\mathbb{R}^d)$, полагая для $f \in (B_{p,\theta}^\alpha)'(D)$ значение

$$E^{d, \alpha, p, \theta, D} f = E_{K^0}^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f + \sum_{k=K^0+1}^\infty \mathcal{E}_k^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f = E_{K^0}^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f + E'^{d, \alpha, p, \theta, D} f, \quad (2.1.4)$$

где

$$E'^{d, \alpha, p, \theta, D} f = \sum_{k=K^0+1}^\infty \mathcal{E}_k^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f. \quad (2.1.5)$$

Ясно, что отображение $E^{d, \alpha, p, \theta, D}$ линейно, а, вследствие (2.1.4), (1.3.30), (1.2.10), (1.3.3), с учетом обозначений $\kappa = \kappa(k, \alpha)$, $\kappa' = \kappa(k-1, \alpha)$, $k > K^0$,

в $L_p(D)$ выполняется равенство

$$\begin{aligned}
(E^{d,\alpha,p,\theta,D} f) |_D &= (E_{K^0}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D + \sum_{k=K^0+1}^{\infty} (\mathcal{E}_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D = \\
(E_{K^0}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D &+ \sum_{k=K^0+1}^{\infty} ((E_{\kappa}^{d,l-\epsilon,m,D} f) |_D - (H_{\kappa,\kappa'}^{d,l-\epsilon,m,D} (E_{\kappa'}^{d,l-\epsilon,m,D} f)) |_D) = \\
(E_{K^0}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D &+ \sum_{k=K^0+1}^{\infty} ((E_{\kappa}^{d,l-\epsilon,m,D} f) |_D - (E_{\kappa'}^{d,l-\epsilon,m,D} f) |_D) = \\
(E_{K^0}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D &+ \sum_{k=K^0+1}^{\infty} ((E_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D - (E_{k-1}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D) = \\
(E_{K^0}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D &+ \sum_{k=K^0+1}^{\infty} (E_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f - E_{k-1}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) |_D = f,
\end{aligned}$$

т.е. соблюдается (2.1.1).

Покажем, что при $\mathfrak{l} \in \mathbb{Z}_+^d : \mathfrak{l} < \alpha$, отображение, которое каждой функции $f \in (B_{p,\theta}^\alpha)'(D)$ ставит в соответствие функцию $E_{K^0}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f$ является непрерывным отображением пространства $(B_{p,\theta}^\alpha)'(D)$ в $(B_{p,\theta}^\alpha)^{\mathfrak{l}}(\mathbb{R}^d)$. Действительно, для $\mathcal{F} = E_{K^0}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f$, $f \in (B_{p,\theta}^\alpha)'(D)$, при $j = 1, \dots, d$ и $h \in \mathbb{R}$, согласно (1.1.6), (1.3.24), с одной стороны имеет место неравенство

$$\begin{aligned}
\|\Delta_{he_j}^{l_j-\mathfrak{l}_j}(\mathcal{D}_j^{\mathfrak{l}_j} \mathcal{F})\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} &= \|\Delta_{he_j}^{l_j-\mathfrak{l}_j}(\mathcal{D}_j^{\mathfrak{l}_j} E_{K^0}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f)\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} \leq \\
|h|^{l_j-\mathfrak{l}_j} \|\mathcal{D}_j^{l_j e_j} E_{K^0}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} &\leq \\
|h|^{l_j-\mathfrak{l}_j} c_6 2^{K^0(\alpha^{-1}, l_j e_j)} \|f\|_{L_p(D)} &= c_7 |h|^{l_j-\mathfrak{l}_j} \|f\|_{L_p(D)},
\end{aligned}$$

а с другой стороны –

$$\|\Delta_{he_j}^{l_j-\mathfrak{l}_j}(\mathcal{D}_j^{\mathfrak{l}_j} \mathcal{F})\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} \leq c_8 \|\mathcal{D}_j^{\mathfrak{l}_j} \mathcal{F}\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} = c_8 \|\mathcal{D}_j^{\mathfrak{l}_j} E_{K^0}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} \leq c_9 \|f\|_{L_p(D)}.$$

Отсюда видим, что при $j = 1, \dots, d$, $t \in \mathbb{R}_+$ выполняются неравенства

$$\Omega_j^{l_j-\mathfrak{l}_j}(\mathcal{D}_j^{\mathfrak{l}_j} \mathcal{F}, t)_{L_p(\mathbb{R}^d)} \leq c_7 t^{l_j-\mathfrak{l}_j} \|f\|_{L_p(D)}; \Omega_j^{l_j-\mathfrak{l}_j}(\mathcal{D}_j^{\mathfrak{l}_j} \mathcal{F}, t)_{L_p(\mathbb{R}^d)} \leq c_9 \|f\|_{L_p(D)}.$$

Используя эти неравенства, получаем, что

$$\begin{aligned}
&\left(\int_{\mathbb{R}_+} t^{-1-\theta(\alpha_j-\mathfrak{l}_j)} (\Omega_j^{l_j-\mathfrak{l}_j}(\mathcal{D}_j^{\mathfrak{l}_j} \mathcal{F}, t)_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta dt \right)^{1/\theta} = \\
&\left(\int_I t^{-1-\theta(\alpha_j-\mathfrak{l}_j)} (\Omega_j^{l_j-\mathfrak{l}_j}(\mathcal{D}_j^{\mathfrak{l}_j} \mathcal{F}, t)_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta dt + \int_1^\infty t^{-1-\theta(\alpha_j-\mathfrak{l}_j)} (\Omega_j^{l_j-\mathfrak{l}_j}(\mathcal{D}_j^{\mathfrak{l}_j} \mathcal{F}, t)_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta dt \right)^{1/\theta} \leq
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \left(\int_I t^{-1-\theta(\alpha_j - l_j)} (c_7 t^{l_j - l_j} \|f\|_{L_p(D)})^\theta dt + \int_1^\infty t^{-1-\theta(\alpha_j - l_j)} (c_9 \|f\|_{L_p(D)})^\theta dt \right)^{1/\theta} = \\
& \left(c_7^\theta \int_I t^{-1+\theta(l_j - \alpha_j)} dt + c_9^\theta \int_1^\infty t^{-1-\theta(\alpha_j - l_j)} dt \right)^{1/\theta} \|f\|_{L_p(D)} = \\
& c_{10} \|f\|_{L_p(D)} \leq c_{10} \|f\|_{(B_{p,\theta}^\alpha)'(D)}, f \in (B_{p,\theta}^\alpha)'(D), j = 1, \dots, d.
\end{aligned}$$

Из сказанного с учетом (1.3.24) вытекает, что для $f \in (B_{p,\theta}^\alpha)'(D)$ справедливо неравенство

$$\|E_{K^0}^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f\|_{(B_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d)} \leq c_{11} \|f\|_{(B_{p,\theta}^\alpha)'(D)}. \quad (2.1.6)$$

Теперь проверим, что существует константа $c_{12}(d, \alpha, p, \theta, D) > 0$ такая, что для $f \in (B_{p,\theta}^\alpha)'(D)$ выполняется неравенство

$$\|E'^{d,\alpha,p,\theta,D} f\|_{(B_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d)} \leq c_{12} \|f\|_{(B_{p,\theta}^\alpha)'(D)}. \quad (2.1.7)$$

В самом деле, в силу (2.1.5), (2.1.3) справедливо неравенство

$$\begin{aligned}
\|E'^{d,\alpha,p,\theta,D} f\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} & \leq \sum_{k=K^0+1}^\infty \|\mathcal{E}_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} \leq \\
& c_5 \sum_{j=1}^d \left(\sum_{k=K^0+1}^\infty 2^{-\theta' k} \right)^{1/\theta'} \left(\int_{\mathbb{R}_+} t^{-1-\theta\alpha_j} (\Omega_j^{l_j}(f, t)_{L_p(D)})^\theta dt \right)^{1/\theta} \leq \\
& c_{13} \|f\|_{(B_{p,\theta}^\alpha)'(D)}. \quad (2.1.8)
\end{aligned}$$

Далее, пользуясь тем, что для $f \in (B_{p,\theta}^\alpha)'(D)$ при $i = 1, \dots, d, k \in \mathbb{Z}_+ : k > K^0$, ввиду (1.3.34) справедлива оценка

$$\begin{aligned}
\|\mathcal{D}_i^{l_i} \mathcal{E}_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} & \leq c_{14} 2^{k(\alpha^{-1}, l_i e_i)} \sum_{j=1}^d \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-k/\alpha_j})_{L_p(D)} \leq \\
& c_{15} 2^{kl_i/\alpha_i} \sum_{j=1}^d 2^{-k} (c_2 2^{-k/\alpha_j})^{-\alpha_j} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-k/\alpha_j})_{L_p(D)} \leq \\
& c_{16} 2^{-k(1-l_i/\alpha_i)} \max_{j=1,\dots,d} \sup_{t \in \mathbb{R}_+} t^{-\alpha_j} \Omega_j^{l_j}(f, t)_{L_p(D)},
\end{aligned}$$

с учетом (1.1.7) заключаем, что ряд

$$\sum_{k=K^0+1}^\infty \mathcal{D}_i^{l_i} \mathcal{E}_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f$$

сходится в $L_p(\mathbb{R}^d)$. Отсюда и из (2.1.5) приходим к выводу, что в $L_p(\mathbb{R}^d)$ имеет место равенство

$$\mathcal{D}_i^{\mathfrak{l}_i} E'^{d,\alpha,p,\theta,D} f = \sum_{k=K^0+1}^{\infty} \mathcal{D}_i^{\mathfrak{l}_i} \mathcal{E}_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f, f \in (B_{p,\theta}^\alpha)'(D), i = 1, \dots, d. \quad (2.1.9)$$

Принимая во внимание (2.1.9), (1.3.34), а также неравенство Гёльдера и (2.1.3), для $f \in (B_{p,\theta}^\alpha)'(D)$ при $i = 1, \dots, d$ имеем

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}_i^{\mathfrak{l}_i} E'^{d,\alpha,p,\theta,D} f\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} &= \left\| \sum_{k=K^0+1}^{\infty} \mathcal{D}_i^{\mathfrak{l}_i} \mathcal{E}_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f \right\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} \leq \\ &\sum_{k=K^0+1}^{\infty} \|\mathcal{D}_i^{\mathfrak{l}_i} \mathcal{E}_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} \leq \\ &\sum_{k=K^0+1}^{\infty} c_{14} 2^{k(\alpha^{-1}, \mathfrak{l}_i e_i)} \sum_{j=1}^d \Omega_j^{\mathfrak{l}_j} (f, c_2 2^{-k/\alpha_j})_{L_p(D)} = \\ &c_{14} \sum_{j=1}^d \sum_{k=K^0+1}^{\infty} 2^{k\mathfrak{l}_i/\alpha_i} \Omega_j^{\mathfrak{l}_j} (f, c_2 2^{-k/\alpha_j})_{L_p(D)} = \\ &c_{14} \sum_{j=1}^d \sum_{k=K^0+1}^{\infty} 2^{-k(1-\mathfrak{l}_i/\alpha_i)} 2^k \Omega_j^{\mathfrak{l}_j} (f, c_2 2^{-k/\alpha_j})_{L_p(D)} \leq \\ &c_{14} \sum_{j=1}^d \left(\sum_{k=K^0+1}^{\infty} 2^{-k\theta'(1-\mathfrak{l}_i/\alpha_i)} \right)^{1/\theta'} \left(\sum_{k=K^0+1}^{\infty} (2^k \Omega_j^{\mathfrak{l}_j} (f, c_2 2^{-k/\alpha_j})_{L_p(D)})^\theta \right)^{1/\theta} \leq \\ &c_{17} \sum_{j=1}^d \left(\sum_{k=K^0+1}^{\infty} 2^{-k\theta'(1-\mathfrak{l}_i/\alpha_i)} \right)^{1/\theta'} \left(\int_{\mathbb{R}_+} t^{-1-\theta\alpha_j} (\Omega_j^{\mathfrak{l}_j} (f, t)_{L_p(D)})^\theta dt \right)^{1/\theta} \leq \\ &c_{18} \|f\|_{(B_{p,\theta}^\alpha)'(D)}. \quad (2.1.10) \end{aligned}$$

Наконец, для функции $F = E'^{d,\alpha,p,\theta,D} f, f \in (B_{p,\theta}^\alpha)'(D)$, при $i = 1, \dots, d$ оценим

$$\begin{aligned} &\left(\int_{\mathbb{R}_+} t^{-1-\theta(\alpha_i-\mathfrak{l}_i)} (\Omega_i^{\mathfrak{l}_i-\mathfrak{l}_i} (\mathcal{D}_i^{\mathfrak{l}_i} F, t)_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta dt \right)^{1/\theta} = \\ &\left(\int_I t^{-1-\theta(\alpha_i-\mathfrak{l}_i)} (\Omega_i^{\mathfrak{l}_i-\mathfrak{l}_i} (\mathcal{D}_i^{\mathfrak{l}_i} F, t)_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta dt + \int_1^\infty t^{-1-\theta(\alpha_i-\mathfrak{l}_i)} (\Omega_i^{\mathfrak{l}_i-\mathfrak{l}_i} (\mathcal{D}_i^{\mathfrak{l}_i} F, t)_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta dt \right)^{1/\theta}. \end{aligned} \quad (2.1.11)$$

Учитывая, что при $i = 1, \dots, d$ для $t \in \mathbb{R}_+$ справедливо неравенство

$$\begin{aligned} \Omega_i^{l_i-l_i}(\mathcal{D}_i^{l_i} F, t)_{L_p(\mathbb{R}^d)} &= \sup_{\{h \in \mathbb{R}: h \in tB^1\}} \|\Delta_{he_i}^{l_i-l_i} \mathcal{D}_i^{l_i} F\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} \leq \\ &\sup_{\{h \in \mathbb{R}: h \in tB^1\}} c_{19} \|\mathcal{D}_i^{l_i} F\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} = c_{19} \|\mathcal{D}_i^{l_i} F\|_{L_p(\mathbb{R}^d)}, \end{aligned}$$

находим, что

$$\begin{aligned} \int_1^\infty t^{-1-\theta(\alpha_i-l_i)} (\Omega_i^{l_i-l_i}(\mathcal{D}_i^{l_i} F, t)_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta dt &\leq \\ \int_1^\infty t^{-1-\theta(\alpha_i-l_i)} (c_{19} \|\mathcal{D}_i^{l_i} F\|_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta dt &= \\ (c_{19} \|\mathcal{D}_i^{l_i} F\|_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta \int_1^\infty t^{-1-\theta(\alpha_i-l_i)} dt &= (c_{20} \|\mathcal{D}_i^{l_i} F\|_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta. \end{aligned}$$

Подставляя последнюю оценку в (2.1.11) и применяя неравенство Гёльдера, получаем, что

$$\begin{aligned} \left(\int_{\mathbb{R}_+} t^{-1-\theta(\alpha_i-l_i)} (\Omega_i^{l_i-l_i}(\mathcal{D}_i^{l_i} F, t)_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta dt \right)^{1/\theta} &\leq \\ \left(\int_I t^{-1-\theta(\alpha_i-l_i)} (\Omega_i^{l_i-l_i}(\mathcal{D}_i^{l_i} F, t)_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta dt + (c_{20} \|\mathcal{D}_i^{l_i} F\|_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta \right)^{1/\theta} &\leq \\ \left(\int_I t^{-1-\theta(\alpha_i-l_i)} (\Omega_i^{l_i-l_i}(\mathcal{D}_i^{l_i} F, t)_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta dt \right)^{1/\theta} + c_{20} \|\mathcal{D}_i^{l_i} F\|_{L_p(\mathbb{R}^d)}. \quad (2.1.12) \end{aligned}$$

Таким образом, приходим к необходимости оценки

$$\left(\int_I t^{-1-\theta(\alpha_i-l_i)} (\Omega_i^{l_i-l_i}(\mathcal{D}_i^{l_i} F, t)_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta dt \right)^{1/\theta}$$

для $i = 1, \dots, d$. Проведём эту оценку.

Пользуясь тем, что для любого $i = 1, \dots, d$ имеет место представление $I = \cup_{k \in \mathbb{N}} [2^{-k/\alpha_i}, 2^{-(k-1)/\alpha_i})$, получаем, что при $i = 1, \dots, d$ соблюдается неравенство

$$\begin{aligned} \left(\int_I t^{-1-\theta(\alpha_i-l_i)} (\Omega_i^{l_i-l_i}(\mathcal{D}_i^{l_i} F, t)_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta dt \right)^{1/\theta} &= \\ \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} \int_{[2^{-k/\alpha_i}, 2^{-(k-1)/\alpha_i})} t^{-1-\theta(\alpha_i-l_i)} (\Omega_i^{l_i-l_i}(\mathcal{D}_i^{l_i} F, t)_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta dt \right)^{1/\theta} &\leq \end{aligned}$$

$$\left(\sum_{k \in \mathbb{N}} \int_{[2^{-k/\alpha_i}, 2^{-(k-1)/\alpha_i})} (2^{-k/\alpha_i})^{-1-\theta(\alpha_i-l_i)} (\Omega_i^{l_i-l_i} (\mathcal{D}_i^{l_i} F, 2^{-(k-1)/\alpha_i})_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta dt \right)^{1/\theta} \leq$$

$$\left(\sum_{k \in \mathbb{N}} c_{21}^\theta 2^{k\theta(1-l_i/\alpha_i)} (\Omega_i^{l_i-l_i} (\mathcal{D}_i^{l_i} F, c_{22} 2^{-k/\alpha_i})_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta \right)^{1/\theta}. \quad (2.1.13)$$

При $i = 1, \dots, d, k \in \mathbb{N}$, чтобы оценить $\Omega_i^{l_i-l_i} (\mathcal{D}_i^{l_i} F, c_{22} 2^{-k/\alpha_i})_{L_p(\mathbb{R}^d)}$, для $h \in (c_{22} 2^{-k/\alpha_i} B^1)$ с учётом (2.1.9), (2.1.10) имеем

$$\begin{aligned} \|\Delta_{he_i}^{l_i-l_i} \mathcal{D}_i^{l_i} F\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} &= \left\| \Delta_{he_i}^{l_i-l_i} \left(\sum_{\kappa=K^0+1}^{\infty} \mathcal{D}_i^{l_i} \mathcal{E}_\kappa^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f \right) \right\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} = \\ &= \left\| \sum_{\kappa=K^0+1}^{\infty} \Delta_{he_i}^{l_i-l_i} (\mathcal{D}_i^{l_i} \mathcal{E}_\kappa^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f) \right\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} \leq \\ &= \sum_{\kappa=K^0+1}^{\infty} \|\Delta_{he_i}^{l_i-l_i} (\mathcal{D}_i^{l_i} \mathcal{E}_\kappa^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f)\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} = \\ &= \sum_{\kappa: K^0+1 \leq \kappa \leq k} \|\Delta_{he_i}^{l_i-l_i} (\mathcal{D}_i^{l_i} \mathcal{E}_\kappa^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f)\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} + \\ &+ \sum_{\kappa \geq \max(K^0+1, k+1)} \|\Delta_{he_i}^{l_i-l_i} (\mathcal{D}_i^{l_i} \mathcal{E}_\kappa^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f)\|_{L_p(\mathbb{R}^d)}. \quad (2.1.14) \end{aligned}$$

При оценке первой суммы в правой части (2.1.14), пользуясь (1.1.6), (1.3.34) при $q = p, \lambda = l_i e_i$, выводим

$$\begin{aligned} \sum_{\kappa: K^0+1 \leq \kappa \leq k} \|\Delta_{he_i}^{l_i-l_i} (\mathcal{D}_i^{l_i} \mathcal{E}_\kappa^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f)\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} &\leq \\ &\sum_{\kappa: K^0+1 \leq \kappa \leq k} |h|^{l_i-l_i} \|\mathcal{D}^{l_i e_i} (\mathcal{E}_\kappa^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f)\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} \leq \\ &\sum_{\kappa: K^0+1 \leq \kappa \leq k} c_{23} 2^{-k(l_i-l_i)/\alpha_i} c_{24} 2^{\kappa l_i/\alpha_i} \sum_{j=1}^d \Omega_j^{l_j} (f, c_2 2^{-\kappa/\alpha_j})_{L_p(D)} \leq \\ &c_{25} 2^{-k(l_i-l_i)/\alpha_i} \sum_{j=1}^d \sum_{\kappa=1}^k 2^{\kappa l_i/\alpha_i} \Omega_j^{l_j} (f, c_2 2^{-\kappa/\alpha_j})_{L_p(D)}, \\ &h \in (c_{22} 2^{-k/\alpha_i} B^1), k \in \mathbb{N}, i = 1, \dots, d. \quad (2.1.15) \end{aligned}$$

Оценивая вторую сумму в правой части (2.1.14), в силу (1.3.34) при $q = p, \lambda = l_i e_i$ получаем

$$\begin{aligned}
& \sum_{\kappa \geq \max(K^0+1, k+1)} \|\Delta_{he_i}^{l_i-l_i}(\mathcal{D}_i^{l_i} \mathcal{E}_\kappa^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f)\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} \leq \\
& \sum_{\kappa \geq \max(K^0+1, k+1)} c_{26} \|\mathcal{D}_i^{l_i} \mathcal{E}_\kappa^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} \leq \\
& c_{26} \sum_{\kappa \geq \max(K^0+1, k+1)} c_{14} 2^{\kappa l_i / \alpha_i} \sum_{j=1}^d \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)} \leq \\
& c_{27} \sum_{j=1}^d \sum_{\kappa=k+1}^{\infty} 2^{\kappa l_i / \alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)}, \\
& h \in (c_{22} 2^{-k / \alpha_i} B^1), k \in \mathbb{N}, i = 1, \dots, d. \quad (2.1.16)
\end{aligned}$$

Соединяя (2.1.14), (2.1.15), (2.1.16), заключаем, что для $k \in \mathbb{N}, i = 1, \dots, d$ соблюдается неравенство

$$\begin{aligned}
\Omega_i^{l_i-l_i}(\mathcal{D}_i^{l_i} F, c_{22} 2^{-k / \alpha_i})_{L_p(\mathbb{R}^d)} &= \sup_{h \in (c_{22} 2^{-k / \alpha_i} B^1)} \|\Delta_{he_i}^{l_i-l_i} \mathcal{D}_i^{l_i} F\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} \leq \\
& c_{25} 2^{-k(l_i-l_i) / \alpha_i} \sum_{j=1}^d \sum_{\kappa=1}^k 2^{\kappa l_i / \alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)} + \\
& c_{27} \sum_{j=1}^d \sum_{\kappa=k+1}^{\infty} 2^{\kappa l_i / \alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)} \leq \\
& c_{28} \sum_{j=1}^d \left(2^{-k(l_i-l_i) / \alpha_i} \sum_{\kappa=1}^k 2^{\kappa l_i / \alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)} + \right. \\
& \left. \sum_{\kappa=k+1}^{\infty} 2^{\kappa l_i / \alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)} \right).
\end{aligned}$$

При $i = 1, \dots, d$, подставляя эту оценку в (2.1.13) и применяя неравенство Гёльдера, приходим к соотношению

$$\begin{aligned}
& \left(\int_I t^{-1-\theta(\alpha_i-l_i)} (\Omega_i^{l_i-l_i}(\mathcal{D}_i^{l_i} F, t)_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta dt \right)^{1/\theta} \leq \\
& c_{21} \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} 2^{k\theta(1-l_i/\alpha_i)} (c_{28} \sum_{j=1}^d \left(2^{-k(l_i-l_i) / \alpha_i} \sum_{\kappa=1}^k 2^{\kappa l_i / \alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)} + \right. \right. \\
& \left. \left. \sum_{\kappa=k+1}^{\infty} 2^{\kappa l_i / \alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)} \right)^\theta \right)^{1/\theta} \leq
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& c_{29} \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} 2^{k\theta(1-l_i/\alpha_i)} c_{30} \sum_{j=1}^d \left(2^{-k(l_i-l_i)/\alpha_i} \sum_{\kappa=1}^k 2^{\kappa l_i/\alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa/\alpha_j})_{L_p(D)} + \right. \right. \\
& \quad \left. \left. \sum_{\kappa=k+1}^{\infty} 2^{\kappa l_i/\alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa/\alpha_j})_{L_p(D)} \right)^{\theta} \right)^{1/\theta} = \\
& c_{31} \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} \sum_{j=1}^d 2^{k\theta(1-l_i/\alpha_i)} \left(2^{-k(l_i-l_i)/\alpha_i} \sum_{\kappa=1}^k 2^{\kappa l_i/\alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa/\alpha_j})_{L_p(D)} + \right. \right. \\
& \quad \left. \left. \sum_{\kappa=k+1}^{\infty} 2^{\kappa l_i/\alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa/\alpha_j})_{L_p(D)} \right)^{\theta} \right)^{1/\theta} = \\
& c_{31} \left(\sum_{j=1}^d \sum_{k \in \mathbb{N}} 2^{k\theta(1-l_i/\alpha_i)} \left(2^{-k(l_i-l_i)/\alpha_i} \sum_{\kappa=1}^k 2^{\kappa l_i/\alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa/\alpha_j})_{L_p(D)} + \right. \right. \\
& \quad \left. \left. \sum_{\kappa=k+1}^{\infty} 2^{\kappa l_i/\alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa/\alpha_j})_{L_p(D)} \right)^{\theta} \right)^{1/\theta} \leq \\
& c_{31} \left(\sum_{j=1}^d \sum_{k \in \mathbb{N}} 2^{k\theta(1-l_i/\alpha_i)} c_{32} \left((2^{-k(l_i-l_i)/\alpha_i} \sum_{\kappa=1}^k 2^{\kappa l_i/\alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa/\alpha_j})_{L_p(D)})^{\theta} + \right. \right. \\
& \quad \left. \left. \left(\sum_{\kappa=k+1}^{\infty} 2^{\kappa l_i/\alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa/\alpha_j})_{L_p(D)} \right)^{\theta} \right) \right)^{1/\theta} = \\
& c_{33} \left(\sum_{j=1}^d \sum_{k \in \mathbb{N}} \left(2^{-k(l_i/\alpha_i-1)\theta} \left(\sum_{\kappa=1}^k 2^{\kappa l_i/\alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa/\alpha_j})_{L_p(D)} \right)^{\theta} + \right. \right. \\
& \quad \left. \left. 2^{k\theta(1-l_i/\alpha_i)} \left(\sum_{\kappa=k+1}^{\infty} 2^{\kappa l_i/\alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa/\alpha_j})_{L_p(D)} \right)^{\theta} \right) \right)^{1/\theta} = \\
& c_{33} \left(\sum_{j=1}^d \sum_{k \in \mathbb{N}} 2^{-k(l_i/\alpha_i-1)\theta} \left(\sum_{\kappa=1}^k 2^{\kappa l_i/\alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa/\alpha_j})_{L_p(D)} \right)^{\theta} + \right. \\
& \quad \left. \sum_{j=1}^d \sum_{k \in \mathbb{N}} 2^{k\theta(1-l_i/\alpha_i)} \left(\sum_{\kappa=k+1}^{\infty} 2^{\kappa l_i/\alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa/\alpha_j})_{L_p(D)} \right)^{\theta} \right)^{1/\theta}. \quad (2.1.17)
\end{aligned}$$

Далее, проводя оценку правой части (2.1.17), фиксируем $\epsilon \in I$, для которого при $i = 1, \dots, d$ выполняются неравенства $l_i/\alpha_i - 1 - \epsilon > 0$, $1 - l_i/\alpha_i - \epsilon > 0$. Тогда при $i, j = 1, \dots, d, k \in \mathbb{N}$, применяя неравенство Гёльдера, имеем

$$\begin{aligned}
& \left(\sum_{\kappa=1}^k 2^{\kappa l_i / \alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)} \right)^\theta = \\
& \left(\sum_{\kappa=1}^k 2^{\kappa l_i / \alpha_i - \kappa - \epsilon \kappa} 2^{\epsilon \kappa} 2^\kappa \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)} \right)^\theta \leq \\
& \left(\left(\sum_{\kappa=1}^k 2^{\kappa(l_i / \alpha_i - 1 - \epsilon)\theta'} \right)^{1/\theta'} \left(\sum_{\kappa=1}^k 2^{\kappa \epsilon \theta} 2^{\kappa \theta} (\Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)})^\theta \right)^{1/\theta} \right)^\theta \leq \\
& (c_{34} 2^{k(l_i / \alpha_i - 1 - \epsilon)\theta'})^{\theta/\theta'} \sum_{\kappa=1}^k 2^{\kappa \epsilon \theta} 2^{\kappa \theta} (\Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)})^\theta = \\
& c_{35} 2^{k(l_i / \alpha_i - 1 - \epsilon)\theta} \sum_{\kappa=1}^k 2^{\kappa \epsilon \theta} 2^{\kappa \theta} (\Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)})^\theta. \quad (2.1.18)
\end{aligned}$$

Используя (2.1.18) и принимая во внимание вывод неравенства (2.1.3), получаем

$$\begin{aligned}
& \sum_{k \in \mathbb{N}} 2^{-k(l_i / \alpha_i - 1)\theta} \left(\sum_{\kappa=1}^k 2^{\kappa l_i / \alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)} \right)^\theta \leq \\
& \sum_{k \in \mathbb{N}} 2^{-k(l_i / \alpha_i - 1)\theta} c_{35} 2^{k(l_i / \alpha_i - 1 - \epsilon)\theta} \sum_{\kappa=1}^k 2^{\kappa \epsilon \theta} 2^{\kappa \theta} (\Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)})^\theta = \\
& c_{35} \sum_{k \in \mathbb{N}} 2^{-k \epsilon \theta} \sum_{\kappa=1}^k 2^{\kappa \epsilon \theta} 2^{\kappa \theta} (\Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)})^\theta = \\
& c_{35} \sum_{k \in \mathbb{N}} \sum_{\kappa=1}^k 2^{-k \epsilon \theta} 2^{\kappa \epsilon \theta} 2^{\kappa \theta} (\Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)})^\theta = \\
& c_{35} \sum_{k \in \mathbb{N}, \kappa \in \mathbb{N}: \kappa \leq k} 2^{-k \epsilon \theta} 2^{\kappa \epsilon \theta} 2^{\kappa \theta} (\Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)})^\theta = \\
& c_{35} \sum_{\kappa \in \mathbb{N}} \left(\sum_{k=\kappa}^\infty 2^{-k \epsilon \theta} \right) 2^{\kappa \epsilon \theta} 2^{\kappa \theta} (\Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)})^\theta \leq \\
& c_{35} \sum_{\kappa \in \mathbb{N}} c_{36} 2^{-\kappa \epsilon \theta} 2^{\kappa \epsilon \theta} 2^{\kappa \theta} (\Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)})^\theta = \\
& c_{37} \sum_{\kappa \in \mathbb{N}} (2^\kappa \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)})^\theta \leq \\
& c_{38} \int_{\mathbb{R}_+} t^{-1-\theta \alpha_j} (\Omega_j^{l_j}(f, t)_{L_p(D)})^\theta dt, i, j = 1, \dots, d. \quad (2.1.19)
\end{aligned}$$

Продолжая оценку правой части (2.1.17), при $i, j = 1, \dots, d, k \in \mathbb{N}$, пользуясь с учетом (2.1.3) неравенством Гёльдера, выводим

$$\begin{aligned}
& \left(\sum_{\kappa=k+1}^{\infty} 2^{\kappa l_i / \alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)} \right)^{\theta} = \\
& \quad \left(\sum_{\kappa=k+1}^{\infty} 2^{\kappa l_i / \alpha_i} 2^{\kappa \epsilon} 2^{-\kappa} 2^{-\kappa \epsilon} 2^{\kappa} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)} \right)^{\theta} \leq \\
& \quad \left(\left(\sum_{\kappa=k+1}^{\infty} 2^{-\kappa(1-l_i/\alpha_i-\epsilon)\theta'} \right)^{1/\theta'} \left(\sum_{\kappa=k+1}^{\infty} 2^{-\kappa \epsilon \theta} 2^{\kappa \theta} (\Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)})^{\theta} \right)^{1/\theta} \right)^{\theta} \leq \\
& \quad (c_{39} 2^{-k(1-l_i/\alpha_i-\epsilon)\theta'})^{\theta/\theta'} \sum_{\kappa=k+1}^{\infty} 2^{-\kappa \epsilon \theta} 2^{\kappa \theta} (\Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)})^{\theta} = \\
& \quad c_{40} 2^{-k(1-l_i/\alpha_i-\epsilon)\theta} \sum_{\kappa=k+1}^{\infty} 2^{-\kappa \epsilon \theta} 2^{\kappa \theta} (\Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)})^{\theta}. \quad (2.1.20)
\end{aligned}$$

Пользуясь (2.1.20), находим, что

$$\begin{aligned}
& \sum_{k \in \mathbb{N}} 2^{k\theta(1-l_i/\alpha_i)} \left(\sum_{\kappa=k+1}^{\infty} 2^{\kappa l_i / \alpha_i} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)} \right)^{\theta} \leq \\
& \quad \sum_{k \in \mathbb{N}} 2^{k\theta(1-l_i/\alpha_i)} c_{40} 2^{-k(1-l_i/\alpha_i-\epsilon)\theta} \sum_{\kappa=k+1}^{\infty} 2^{-\kappa \epsilon \theta} 2^{\kappa \theta} (\Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)})^{\theta} = \\
& \quad c_{40} \sum_{k \in \mathbb{N}} 2^{k\epsilon \theta} \sum_{\kappa=k+1}^{\infty} 2^{-\kappa \epsilon \theta} 2^{\kappa \theta} (\Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)})^{\theta} \leq \\
& \quad c_{40} \sum_{k \in \mathbb{N}} 2^{k\epsilon \theta} \sum_{\kappa=k}^{\infty} 2^{-\kappa \epsilon \theta} (2^{\kappa} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)})^{\theta} = \\
& \quad c_{40} \sum_{k \in \mathbb{N}, \kappa \in \mathbb{N}: \kappa \geq k} 2^{k\epsilon \theta} 2^{-\kappa \epsilon \theta} (2^{\kappa} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)})^{\theta} = \\
& \quad c_{40} \sum_{\kappa \in \mathbb{N}} \left(\sum_{k=1}^{\kappa} 2^{k\epsilon \theta} \right) 2^{-\kappa \epsilon \theta} (2^{\kappa} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)})^{\theta} \leq \\
& \quad c_{40} \sum_{\kappa \in \mathbb{N}} c_{41} 2^{\kappa \epsilon \theta} 2^{-\kappa \epsilon \theta} (2^{\kappa} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)})^{\theta} = \\
& \quad c_{42} \sum_{\kappa \in \mathbb{N}} (2^{\kappa} \Omega_j^{l_j}(f, c_2 2^{-\kappa / \alpha_j})_{L_p(D)})^{\theta} \leq \\
& \quad c_{43} \int_{\mathbb{R}_+} t^{-1-\theta \alpha_j} (\Omega_j^{l_j}(f, t)_{L_p(D)})^{\theta} dt \quad (\text{см. вывод (2.1.3)}), i, j = 1, \dots, d. \quad (2.1.21)
\end{aligned}$$

Соединяя (2.1.17), (2.1.19), (2.1.21) и применяя неравенство Гёльдера с показателем $1/\theta \leq 1$, приходим к неравенству

$$\begin{aligned} & \left(\int_I t^{-1-\theta(\alpha_i - l_i)} (\Omega_i^{l_i - l_i} (\mathcal{D}_i^{l_i} F, t)_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta dt \right)^{1/\theta} \leq \\ & c_{33} \left(\sum_{j=1}^d c_{44} \int_{\mathbb{R}_+} t^{-1-\theta\alpha_j} (\Omega_j^{l_j} (f, t)_{L_p(D)})^\theta dt \right)^{1/\theta} \leq \\ & c_{45} \sum_{j=1}^d \left(\int_{\mathbb{R}_+} t^{-1-\theta\alpha_j} (\Omega_j^{l_j} (f, t)_{L_p(D)})^\theta dt \right)^{1/\theta}, \end{aligned}$$

которое в сочетании с (2.1.12) влечет неравенство

$$\begin{aligned} & \left(\int_{\mathbb{R}_+} t^{-1-\theta(\alpha_i - l_i)} (\Omega_i^{l_i - l_i} (\mathcal{D}_i^{l_i} F, t)_{L_p(\mathbb{R}^d)})^\theta dt \right)^{1/\theta} \leq \\ & c_{46} \left(\sum_{j=1}^d \left(\int_{\mathbb{R}_+} t^{-1-\theta\alpha_j} (\Omega_j^{l_j} (f, t)_{L_p(D)})^\theta dt \right)^{1/\theta} + \|\mathcal{D}_i^{l_i} F\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} \right) = \\ & c_{46} \left(\sum_{j=1}^d \left(\int_{\mathbb{R}_+} t^{-1-\theta\alpha_j} (\Omega_j^{l_j} (f, t)_{L_p(D)})^\theta dt \right)^{1/\theta} + \|\mathcal{D}_i^{l_i} (E^{d, \alpha, p, \theta, D} f)\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} \right), \\ & i = 1, \dots, d. \quad (2.1.22) \end{aligned}$$

Из (2.1.8), (2.1.10), (2.1.22) следует (2.1.7). Соединяя (2.1.6), (2.1.7) и учитывая (2.1.4), приходим к (2.1.2) при $\theta \neq \infty$. При $\theta = \infty$ доказательство теоремы проводится по той же схеме с заменой в соответствующих местах операции суммирования на операцию взятия супремума или максимума. $\square$

Следствие

В условиях теоремы 2.1.1 имеет место включение

$$(B_{p, \theta}^\alpha)'(D) \subset (B_{p, \theta}^\alpha)^l(D), \quad (2.1.23)$$

и для любой функции $f \in (B_{p, \theta}^\alpha)'(D)$ выполняется неравенство

$$\|f\|_{(B_{p, \theta}^\alpha)^l(D)} \leq C_0 \|f\|_{(B_{p, \theta}^\alpha)'(D)}. \quad (2.1.24)$$

Для получения (2.1.23), (2.1.24) достаточно применить теорему 2.1.1 и неравенство

$$\|(E^{d, \alpha, p, \theta, D} f) |_D \|_{(B_{p, \theta}^\alpha)^l(D)} \leq \|E^{d, \alpha, p, \theta, D} f\|_{(B_{p, \theta}^\alpha)^l(\mathbb{R}^d)}.$$

Из (1.1.8), (1.1.9) и (2.1.23), (2.1.24) вытекает, что в условиях теоремы 2.1.1

имеет место равенство $(B_{p,\theta}^\alpha)'(D) = (B_{p,\theta}^\alpha)^l(D)$ и нормы $\|\cdot\|_{(B_{p,\theta}^\alpha)^l(D)}, \|\cdot\|_{(B_{p,\theta}^\alpha)'(D)}$ эквивалентны.

2.2. В этом пункте приведем используемые в следующих параграфах соотношения между нормами образов и прообразов при некоторых отображениях рассматриваемых пространств.

При $d \in \mathbb{N}$ для $\delta \in \mathbb{R}_+^d$ и $x^0 \in \mathbb{R}^d$ обозначим через h_{δ,x^0} отображение, которое каждой функции f , заданной на некотором множестве $S \subset \mathbb{R}^d$, ставит в соответствие функцию $h_{\delta,x^0}f$, определяемую на множестве $\{x \in \mathbb{R}^d : x^0 + \delta x \in S\} = \delta^{-1}(S - x^0)$ равенством $(h_{\delta,x^0}f)(x) = f(x^0 + \delta x)$. Так как для $\delta \in \mathbb{R}_+^d, x^0 \in \mathbb{R}^d$ отображение $\mathbb{R}^d \ni x \mapsto x^0 + \delta x \in \mathbb{R}^d$ — взаимно однозначно, то отображение h_{δ,x^0} является биекцией на себя множества всех функций с областью определения в $\mathbb{R}^d$. При этом обратное отображение h_{δ,x^0}^{-1} задается равенством

$$(h_{\delta,x^0}^{-1}f)(x) = f(\delta^{-1}(x - x^0)) = (h_{\delta',x'^0}f)(x) \text{ с } \delta' = \delta^{-1}, x'^0 = -\delta^{-1}x^0. \quad (2.2.1)$$

Отметим, что при $1 \leq p \leq \infty$ для $f \in L_p(x^0 + \delta D)$, где D — область в $\mathbb{R}^d, \delta \in \mathbb{R}_+^d, x^0 \in \mathbb{R}^d$, имеет место равенство

$$\begin{aligned} \|h_{\delta,x^0}f\|_{L_p(D)} &= \left(\int_D |f(x^0 + \delta y)|^p dy \right)^{1/p} = \left(\int_{x^0 + \delta D} |f(x)|^p \delta^{-\epsilon} dx \right)^{1/p} = \\ &= \delta^{-p^{-1}\epsilon} \left(\int_{x^0 + \delta D} |f(x)|^p dx \right)^{1/p} = \delta^{-p^{-1}\epsilon} \|f\|_{L_p(x^0 + \delta D)}, \end{aligned} \quad (2.2.2)$$

а, следовательно, для $f \in L_p(D)$ выполняется равенство

$$\|h_{\delta,x^0}^{-1}f\|_{L_p(x^0 + \delta D)} = \delta^{p^{-1}\epsilon} \|h_{\delta,x^0}h_{\delta,x^0}^{-1}f\|_{L_p(D)} = \delta^{p^{-1}\epsilon} \|f\|_{L_p(D)}. \quad (2.2.3)$$

Лемма 2.2.1

Пусть $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d, D$ — область в $\mathbb{R}^d, 1 \leq p < \infty, \delta \in \mathbb{R}_+^d, x^0 \in \mathbb{R}^d$. Тогда при $j = 1, \dots, d, t \in \mathbb{R}_+$ для $f \in L_p(x^0 + \delta D)$ справедливо равенство

$$\Omega_j^{l_j}((h_{\delta,x^0}f), t)_{L_p(D)} = \delta^{-p^{-1}\epsilon} \Omega_j^{l_j}(f, \delta_j t)_{L_p(x^0 + \delta D)}. \quad (2.2.4)$$

Доказательство.

В условиях леммы при $j = 1, \dots, d$ для $f \in L_p(x^0 + \delta D)$, делая замену переменных $\eta = \delta_j^{-1}\xi, y = \delta^{-1}(x - x^0)$, находим, что соблюдается равенство

$$\begin{aligned}
& \int_{tB^1} \int_{D_{l_j \eta e_j}} |(\Delta_{\eta e_j}^{l_j}(h_{\delta, x^0} f))(y)|^p dy d\eta = \\
& \int_{\{(\eta, y): \eta \in tB^1, y \in D_{l_j \eta e_j}\}} \left| \sum_{i=0}^{l_j} C_{l_j}^i (-1)^{l_j-i} (h_{\delta, x^0} f)(y + i\eta e_j) \right|^p d\eta dy = \\
& \int_{\{(\eta, y): \eta \in tB^1, y \in D_{l_j \eta e_j}\}} \left| \sum_{i=0}^{l_j} C_{l_j}^i (-1)^{l_j-i} f(x^0 + \delta y + i\delta_j \eta e_j) \right|^p d\eta dy = \\
& \int_{\{(\xi, x): \xi \in \delta_j tB^1, x \in (x^0 + \delta D)_{l_j \xi e_j}\}} \left| \sum_{i=0}^{l_j} C_{l_j}^i (-1)^{l_j-i} f(x + i\xi e_j) \right|^p \delta^{-\epsilon} \delta_j^{-1} d\xi dx = \\
& \delta^{-\epsilon} \delta_j^{-1} \int_{\delta_j tB^1} \int_{(x^0 + \delta D)_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi.
\end{aligned}$$

Откуда выводим

$$\begin{aligned}
\Omega_j^{l_j}((h_{\delta, x^0} f), t)_{L_p(D)} &= ((2t)^{-1} \int_{tB^1} \int_{D_{l_j \eta e_j}} |(\Delta_{\eta e_j}^{l_j}(h_{\delta, x^0} f))(y)|^p dy d\eta)^{1/p} = \\
& ((2t)^{-1} \delta^{-\epsilon} \delta_j^{-1} \int_{\delta_j tB^1} \int_{(x^0 + \delta D)_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi)^{1/p} = \\
& \delta^{-p^{-1}\epsilon} ((2\delta_j t)^{-1} \int_{\delta_j tB^1} \int_{(x^0 + \delta D)_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi)^{1/p} = \\
& \delta^{-p^{-1}\epsilon} \Omega_j^{l_j}(f, \delta_j t)_{L_p(x^0 + \delta D)}, t \in \mathbb{R}_+, f \in L_p(x^0 + \delta D), j = 1, \dots, d,
\end{aligned}$$

что совпадает с (2.2.4). $\square$

Лемма 2.2.2

Пусть $d \in \mathbb{N}$, D — область в $\mathbb{R}^d$, $\alpha \in \mathbb{R}_+^d$, $1 \leq p < \infty$, $1 \leq \theta \leq \infty$, $\delta \in \mathbb{R}_+^d$, $x^0 \in \mathbb{R}^d$. Тогда существуют константы $c_1(d, \alpha, p, \delta) > 0$, $c_2(d, \alpha, p, \delta) > 0$ такие, что для любой функции $f \in (B_{p, \theta}^\alpha)'(x^0 + \delta D)$ соблюдается неравенство

$$\|h_{\delta, x^0} f\|_{(B_{p, \theta}^\alpha)'(D)} \leq c_1 \|f\|_{(B_{p, \theta}^\alpha)'(x^0 + \delta D)}, \quad (2.2.5)$$

а для $f \in (B_{p, \theta}^\alpha)'(D)$ выполняется неравенство

$$\|h_{\delta, x^0}^{-1} f\|_{(B_{p, \theta}^\alpha)'(x^0 + \delta D)} \leq c_2 \|f\|_{(B_{p, \theta}^\alpha)'(D)}. \quad (2.2.6)$$

Доказательство.

В условиях леммы, полагая $l = l(\alpha)$, для $f \in (B_{p, \theta}^\alpha)'(x^0 + \delta D)$ при $j = 1, \dots, d$ в силу (2.2.4) функция $t^{-1-\theta\alpha_j} (\Omega_j^{l_j}((h_{\delta, x^0} f), t)_{L_p(D)})^\theta$ суммируема на $\mathbb{R}_+$, и справедливо соотношение

$$\begin{aligned}
& \left(\int_{\mathbb{R}_+} t^{-1-\theta\alpha_j} (\Omega_j^{l_j}((h_{\delta,x^0}f), t)_{L_p(D)})^\theta dt \right)^{1/\theta} = \\
& \left(\int_{\mathbb{R}_+} t^{-1-\theta\alpha_j} (\delta^{-p^{-1}\epsilon} \Omega_j^{l_j}(f, \delta_j t)_{L_p(x^0+\delta D)})^\theta dt \right)^{1/\theta} = \\
& \delta^{-p^{-1}\epsilon} \left(\int_{\mathbb{R}_+} t^{-1-\theta\alpha_j} (\Omega_j^{l_j}(f, \delta_j t)_{L_p(x^0+\delta D)})^\theta dt \right)^{1/\theta} = \\
& \delta^{-p^{-1}\epsilon} \left(\int_{\mathbb{R}_+} (\delta_j^{-1}\tau)^{-1-\theta\alpha_j} (\Omega_j^{l_j}(f, \delta_j \delta_j^{-1}\tau)_{L_p(x^0+\delta D)})^\theta \delta_j^{-1} d\tau \right)^{1/\theta} = \\
& \delta^{-p^{-1}\epsilon} \left(\int_{\mathbb{R}_+} \delta_j^{\theta\alpha_j} \tau^{-1-\theta\alpha_j} (\Omega_j^{l_j}(f, \tau)_{L_p(x^0+\delta D)})^\theta d\tau \right)^{1/\theta} = \\
& \delta^{-p^{-1}\epsilon} \delta_j^{\alpha_j} \left(\int_{\mathbb{R}_+} \tau^{-1-\theta\alpha_j} (\Omega_j^{l_j}(f, \tau)_{L_p(x^0+\delta D)})^\theta d\tau \right)^{1/\theta}. \quad (2.2.7)
\end{aligned}$$

Объединяя неравенства (2.2.7) и (2.2.2), приходим к (2.2.5). Наконец, для $f \in (B_{p,\theta}^\alpha)'(D)$, применяя (2.2.1), (2.2.5), получаем, что $h_{\delta,x^0}^{-1}f \in (B_{p,\theta}^\alpha)'(x^0 + \delta D)$ и соблюдается (2.2.6). $\square$

§3. Восстановление частных производных функций из неизотропных классов Никольского и Бесова по значениям функций в заданном числе точек

3.1. В этом пункте будет установлена оценка сверху величины наилучшей точности линейного восстановления в пространстве $L_q(D)$ частной производной $\mathcal{D}^\lambda f$ по значениям в n точках функций f из классов $(\mathcal{H}_p^\alpha)'(D)$ и $(\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(D)$, определенных в ограниченной области $D\alpha$ -типа.

Но сначала опишем постановку задачи.

Пусть T – топологическое пространство, $C(T)$ – пространство непрерывных вещественных функций, заданных на T , X – банахово пространство над $\mathbb{R}$ и $U : D(U) \mapsto X$ – линейный оператор с областью определения $D(U) \subset C(T)$. Пусть ещё $\mathcal{K} \subset D(U)$ – некоторый класс функций.

Для $n \in \mathbb{N}$ через $\Phi_n(C(T))$ обозначим совокупность всех отображений $\phi : C(T) \mapsto \mathbb{R}^n$, для каждого из которых существует набор точек $\{t^j \in T, j = 1, \dots, n\}$ такой, что $\phi(f) = (f(t^1), \dots, f(t^n))$, $f \in C(T)$, а также через $\mathcal{A}^n(X)(\bar{\mathcal{A}}^n(X))$ обозначим множество всех отображений (всех линейных отображений) $A : \mathbb{R}^n \mapsto X$.

Тогда при $n \in \mathbb{N}$ положим

$$\sigma_n(U, \mathcal{K}, X) = \inf_{A \in \mathcal{A}^n(X), \phi \in \Phi_n(C(T))} \sup_{f \in \mathcal{K}} \|Uf - A \circ \phi(f)\|_X,$$

а

$$\bar{\sigma}_n(U, \mathcal{K}, X) = \inf_{A \in \overline{\mathcal{A}}^n(X), \phi \in \Phi_n(C(T))} \sup_{f \in \mathcal{K}} \|Uf - A \circ \phi(f)\|_X.$$

Для доказательства основного утверждения этого пункта, теоремы 3.1.2, потребуется взятая из [6]

Лемма 3.1.1

Пусть $d \in \mathbb{N}$ и $l \in \mathbb{Z}_+^d$. Тогда справедливы следующие утверждения:

1) отображение $\mathcal{J}^{d,l} : \mathcal{P}^{d,l} \mapsto \mathbb{R}^{(l+\epsilon)^c}$, которое каждому полиному $f \in \mathcal{P}^{d,l}$ ставит в соответствие набор вещественных чисел $y = \{y_\lambda = f(\lambda), \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l)\}$, является изоморфизмом;

2) для $\rho, \sigma, \tau \in \mathbb{R}_+^d$ существует константа $c_1(d, l, \rho, \sigma, \tau) > 0$ такая, что для любого $\delta \in \mathbb{R}_+^d$, для любых точек $x^0, y^0 \in \mathbb{R}^d$ таких, что $y^0 \in (x^0 + \sigma\delta B^d)$, и любого множества $Q \subset (y^0 + \tau\delta B^d)$, для любого полинома $f \in \mathcal{P}^{d,l}$ справедлива оценка

$$\sup_{x \in Q} |f(x)| \leq c_1 \max_{\lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l)} |f(x^0 + \rho\delta\lambda)|. \quad (3.1.1)$$

Теорема 3.1.2

Пусть $d \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{R}_+^d, D \subset \mathbb{R}^d$ – ограниченная область α -типа, $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d, 1 \leq p < \infty, 1 \leq q \leq \infty$ таковы, что выполняются условия (1.3.66) и (1.3.62). Пусть ещё $T = D, X = L_q(D), D(U) = \{f \in C(D) : \mathcal{D}^\lambda f \in L_q(D)\}, U = \mathcal{D}^\lambda, \mathcal{K} = (\mathcal{H}_p^\alpha)'(D), (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(D)$, где $\theta \in \mathbb{R} : \theta \geq 1$. Тогда существуют константы $c_2(d, \alpha, D, p, q, \lambda) > 0, n_0 \in \mathbb{N}$ такие, что для любого $n \in \mathbb{N} : n \geq n_0$, соблюдается неравенство

$$\bar{\sigma}_n(U, \mathcal{K}, X) \leq c_2 n^{-(1-(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon)) / (\alpha^{-1}, \epsilon)}. \quad (3.1.2)$$

Доказательство.

Учитывая включение (1.1.7), доказательство достаточно провести лишь в случае $\mathcal{K} = (\mathcal{H}_p^\alpha)'(D)$. Так что рассмотрим этот случай.

Прежде всего отметим, что соблюдение условий (1.3.66) и (1.3.62) обеспечивает включение $\mathcal{K} \subset D(U)$, и, следовательно, величина $\bar{\sigma}_n(U, \mathcal{K}, X)$ определена.

В условиях теоремы фиксируем $l = l(\alpha) \in \mathbb{N}^d, m \in \mathbb{N}^d : \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(m)$ и константу $K^0 = K^0(D, \alpha) \in \mathbb{Z}_+$ (см. определение области α -типа). При $k \in \mathbb{Z}_+ : k \geq K^0$, положим $n(k, \alpha, D) = l^\epsilon \cdot \text{card } \mathcal{N}_\kappa(D)$ при $\kappa = \kappa(k, \alpha)$, где $\mathcal{N}_\kappa(D) = \{\nu \in \mathbb{Z}_+^d : Q_{\kappa, \nu}^d \subset D\}$.

Пусть теперь $n \in \mathbb{N} : n \geq n(K^0, \alpha, D)$. Тогда выберем $k \in \mathbb{Z}_+ : k \geq K^0$, так, чтобы имело место соотношение

$$n(k, \alpha, D) \leq n \leq n(k+1, \alpha, D). \quad (3.1.3)$$

Далее, для $\kappa = \kappa(k, \alpha)$ построим систему точек

$$x_{\kappa, \nu}^{\mu} = 2^{-\kappa}(\nu + \frac{1}{4}\mathfrak{e} + \frac{1}{2}l^{-1}\mu) \in Q_{\kappa, \nu}^d, \nu \in \mathcal{N}_{\kappa}(D), \mu \in \mathbb{Z}_+^d(l - \mathfrak{e}),$$

и определим отображение $\phi \in \Phi_{n(k, \alpha, D)}(C(D))$, полагая для $f \in C(D)$ значение

$$\phi(f) = \{f(x_{\kappa, \nu}^{\mu}), \nu \in \mathcal{N}_{\kappa}(D), \mu \in \mathbb{Z}_+^d(l - \mathfrak{e})\}.$$

Пользуясь леммой 3.1.1, возьмём систему полиномов $\{\pi_{\mu}^{d, l-\mathfrak{e}} \in \mathcal{P}^{d, l-\mathfrak{e}}, \mu \in \mathbb{Z}_+^d(l - \mathfrak{e})\}$ такую, что для $\mu, \mu' \in \mathbb{Z}_+^d(l - \mathfrak{e})$ значение

$$\pi_{\mu}^{d, l-\mathfrak{e}}(\mu') = \begin{cases} 1, & \text{при } \mu' = \mu; \\ 0, & \text{при } \mu' \neq \mu, \end{cases}$$

и обозначим через $R_{\kappa, \nu, \mu}^{d, l-\mathfrak{e}}$ полином из $\mathcal{P}^{d, l-\mathfrak{e}}$ равный $R_{\kappa, \nu, \mu}^{d, l-\mathfrak{e}}(x) = \pi_{\mu}^{d, l-\mathfrak{e}}(2l2^{\kappa}(x - x_{\kappa, \nu}^0))$, $\nu \in \mathcal{N}_{\kappa}(D)$, $\mu \in \mathbb{Z}_+^d(l - \mathfrak{e})$.

Нетрудно видеть, что при $\nu \in \mathcal{N}_{\kappa}(D)$, $\mu, \mu' \in \mathbb{Z}_+^d(l - \mathfrak{e})$ значение $R_{\kappa, \nu, \mu}^{d, l-\mathfrak{e}}(x_{\kappa, \nu}^{\mu'}) = \pi_{\mu}^{d, l-\mathfrak{e}}(\mu')$.

Определим для $\nu \in \mathcal{N}_{\kappa}(D)$ линейный оператор $R_{\kappa, \nu}^{d, l-\mathfrak{e}} : \mathbb{R}^{n(k, \alpha, D)} \mapsto \mathcal{P}^{d, l-\mathfrak{e}}$, полагая для $t = \{t_{\nu', \mu} \in \mathbb{R}, \nu' \in \mathcal{N}_{\kappa}(D), \mu \in \mathbb{Z}_+^d(l - \mathfrak{e})\}$ значение

$$R_{\kappa, \nu}^{d, l-\mathfrak{e}}t = \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(l - \mathfrak{e})} t_{\nu, \mu} R_{\kappa, \nu, \mu}^{d, l-\mathfrak{e}}.$$

Принимая во внимание сказанное выше, получаем, что при $\nu \in \mathcal{N}_{\kappa}(D)$ для $f \in C(D)$ и $\mu \in \mathbb{Z}_+^d(l - \mathfrak{e})$ имеет место равенство

$$(R_{\kappa, \nu}^{d, l-\mathfrak{e}} \circ \phi(f))(x_{\kappa, \nu}^{\mu}) = f(x_{\kappa, \nu}^{\mu}). \quad (3.1.4)$$

Теперь определим оператор $A \in \overline{\mathcal{A}}^{n(k, \alpha, D)}(X)$, полагая для $t = \{t_{\nu, \mu} \in \mathbb{R}, \nu \in \mathcal{N}_{\kappa}(D), \mu \in \mathbb{Z}_+^d(l - \mathfrak{e})\}$ значение

$$At = \mathcal{D}^{\lambda} \left(\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d, m, D}} (R_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d, l-\mathfrak{e}} t) g_{\kappa, \nu}^{d, m} \right) \text{ (см. п. 1.3.)}.$$

Тогда для $f \in \mathcal{K}$ имеем

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}^{\lambda} f - A \circ \phi(f)\|_X &\leq \|\mathcal{D}^{\lambda} f - \mathcal{D}^{\lambda} E_k^{d, l-\mathfrak{e}, m, D, \alpha}(f)\|_{L_q(D)} \\ &\quad + \|\mathcal{D}^{\lambda} E_k^{d, l-\mathfrak{e}, m, D} f - A \circ \phi(f)\|_{L_q(D)}. \end{aligned} \quad (3.1.5)$$

Оценку первого слагаемого в правой части (3.1.5) даёт (1.3.63). При оценке второго слагаемого в правой части (3.1.5) будем действовать так

же, как при доказательстве предложения 1.3.4, опираясь на те же вспомогательные объекты, что и там. Используя (1.3.23), имеем

$$\begin{aligned}
& \|\mathcal{D}^\lambda E_\kappa^{d,l-\epsilon,m,D} f - A \circ \phi(f)\|_{L_q(D)} = \\
& \quad \|\mathcal{D}^\lambda E_\kappa^{d,l-\epsilon,m,D} f - \mathcal{D}^\lambda \left(\sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} (R_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} \phi(f)) g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right)\|_{L_q(D)} \leq \\
& \quad \|\mathcal{D}^\lambda E_\kappa^{d,l-\epsilon,m,D} f - \mathcal{D}^\lambda \left(\sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} (R_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} \phi(f)) g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right)\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} = \\
& \quad \|\mathcal{D}^\lambda ((E_\kappa^{d,l-\epsilon,m,D} f) - \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} (R_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} \phi(f)) g_{\kappa,\nu}^{d,m})\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} = \\
& \quad \|\mathcal{D}^\lambda \left(\sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} (S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) g_{\kappa,\nu}^{d,m} - \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} (R_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} \phi(f)) g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right)\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} = \\
& \quad \|\mathcal{D}^\lambda \left(\sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} ((S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - (R_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} \phi(f))) g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right)\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} = \\
& \quad \left\| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} \mathcal{D}^\lambda (((S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - (R_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} \phi(f))) g_{\kappa,\nu}^{d,m}) \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} = \\
& \quad \left\| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_\lambda^\mu \mathcal{D}^\mu ((S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - (R_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} \phi(f))) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} = \\
& \quad \left\| \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_\lambda^\mu \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} \mathcal{D}^\mu ((S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - (R_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} \phi(f))) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} \leq \\
& \quad \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_\lambda^\mu \left\| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} \mathcal{D}^\mu ((S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - (R_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} \phi(f))) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)}.
\end{aligned} \tag{3.1.6}$$

Оценивая правую часть (3.1.6), при $\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)$ с учетом (1.3.6), (1.3.4) получаем

$$\begin{aligned}
& \left\| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} \mathcal{D}^\mu ((S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - (R_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} \phi(f))) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)}^q = \\
& \quad \int_{\mathbb{R}^d} \left| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} \mathcal{D}^\mu ((S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - (R_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} \phi(f))) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right|^q dx = \\
& \quad \int_{G_\kappa^{d,m,D}} \left| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} \mathcal{D}^\mu ((S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - (R_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} \phi(f))) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right|^q dx =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \sum_{\substack{n \in \mathbb{Z}^d: \\ Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset}} \int_{Q_{\kappa,n}^d} \left| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} \mathcal{D}^{\mu}((S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D}^{d,l-\epsilon} f) - (R_{\kappa,\nu_{\kappa}^D}^{d,l-\epsilon} \phi(f))) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right|^q dx = \\
& \sum_{\substack{n \in \mathbb{Z}^d: \\ Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset}} \int_{Q_{\kappa,n}^d} \left| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}: Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset} \mathcal{D}^{\mu}((S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D}^{d,l-\epsilon} f) - \right. \\
& \quad \left. (R_{\kappa,\nu_{\kappa}^D}^{d,l-\epsilon} \phi(f))) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right|^q dx = \\
& \sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset} \left\| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}: Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset} \mathcal{D}^{\mu}((S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D}^{d,l-\epsilon} f) - \right. \\
& \quad \left. (R_{\kappa,\nu_{\kappa}^D}^{d,l-\epsilon} \phi(f))) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)}^q \leq \\
& \sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset} \left(\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}: Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset} \left\| \mathcal{D}^{\mu}(S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D}^{d,l-\epsilon} f - \right. \right. \\
& \quad \left. \left. R_{\kappa,\nu_{\kappa}^D}^{d,l-\epsilon} \phi(f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)} \right)^q. \quad (3.1.7)
\end{aligned}$$

Для оценки правой части (3.1.7), используя сначала (1.2.5), а затем, применяя (1.1.1), при $\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)$, $n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset$, $\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset$, выводим

$$\begin{aligned}
& \left\| \mathcal{D}^{\mu}(S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D}^{d,l-\epsilon} f - R_{\kappa,\nu_{\kappa}^D}^{d,l-\epsilon} \phi(f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)} \leq \\
& \left\| \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_{\infty}(\mathbb{R}^d)} \left\| \mathcal{D}^{\mu}(S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D}^{d,l-\epsilon} f - R_{\kappa,\nu_{\kappa}^D}^{d,l-\epsilon} \phi(f)) \right\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)} = \\
& c_3 2^{(\kappa, \lambda-\mu)} \left\| \mathcal{D}^{\mu}(S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D}^{d,l-\epsilon} f - R_{\kappa,\nu_{\kappa}^D}^{d,l-\epsilon} \phi(f)) \right\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)} \leq \\
& c_4 2^{(\kappa, \lambda-\mu)} 2^{(\kappa, \mu-q^{-1}\epsilon)} \left\| S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D}^{d,l-\epsilon} f - R_{\kappa,\nu_{\kappa}^D}^{d,l-\epsilon} \phi(f) \right\|_{L_{\infty}(Q_{\kappa,n}^d)} = \\
& c_4 2^{(\kappa, \lambda-q^{-1}\epsilon)} \left\| S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D}^{d,l-\epsilon} f - R_{\kappa,\nu_{\kappa}^D}^{d,l-\epsilon} \phi(f) \right\|_{L_{\infty}(Q_{\kappa,n}^d)}. \quad (3.1.8)
\end{aligned}$$

Далее, с учетом того, что в силу (1.3.13) имеет место включение

$$\begin{aligned}
Q_{\kappa,n}^d & \subset (2^{-\kappa} \nu_{\kappa}^D(\nu) + (\gamma^1 + \epsilon) 2^{-\kappa} B^d), \\
n & \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset, \nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \cap Q_{\kappa,n}^d \neq \emptyset,
\end{aligned}$$

применяя (3.1.1), затем используя (3.1.4), (1.3.65), наконец, делая замену переменной, получаем, что при $n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset$, $\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \cap Q_{\kappa,n}^d \neq \emptyset$, выполняется неравенство

$$\begin{aligned}
& \|S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^{d, l-\epsilon} f - R_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^{d, l-\epsilon} \phi(f)\|_{L^\infty(Q_{\kappa, n}^d)} = \\
& \sup_{x \in Q_{\kappa, n}^d} |(S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^{d, l-\epsilon} f)(x) - (R_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^{d, l-\epsilon} \phi(f))(x)| \leq \\
& c_5 \max_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(l-\epsilon)} \left| (S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^{d, l-\epsilon} f)(x_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^0 + \frac{1}{2} l^{-1} 2^{-\kappa} \mu) - (R_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^{d, l-\epsilon} \phi(f))(x_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^0 + \frac{1}{2} l^{-1} 2^{-\kappa} \mu) \right| = \\
& c_5 \max_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(l-\epsilon)} |(S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^{d, l-\epsilon} f)(x_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^\mu) - (R_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^{d, l-\epsilon} \phi(f))(x_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^\mu)| = \\
& c_5 \max_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(l-\epsilon)} |(S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^{d, l-\epsilon} f)(x_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^\mu) - f(x_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^\mu)| \leq \\
& c_5 \sup_{x \in Q_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^d} |(S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^{d, l-\epsilon} f)(x) - f(x)| = \\
& c_5 \|f - S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^{d, l-\epsilon} f\|_{L^\infty(Q_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^d)} \leq c_6 2^{(\kappa, p^{-1}\epsilon)} \int_0^1 t^{-(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon)-1} \\
& \times \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} t^{-p^{-1}/\alpha_j} \left(\int_{c_7 2^{-\kappa_j} t^{1/\alpha_j} B^1} \int_{(Q_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^d)_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} dt \leq \\
& c_6 2^{k(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon)} \int_0^1 t^{-(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon)-1} \\
& \times \sum_{j=1}^d (2^{-k} t)^{-p^{-1}/\alpha_j} \left(\int_{c_8 (2^{-k} t)^{1/\alpha_j} B^1} \int_{(Q_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^d)_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} dt = \\
& c_6 \int_0^{2^{-k}} t^{-(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon)-1} \\
& \times \sum_{j=1}^d t^{-p^{-1}/\alpha_j} \left(\int_{c_8 t^{1/\alpha_j} B^1} \int_{(Q_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^d)_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} dt. \quad (3.1.9)
\end{aligned}$$

Объединяя (3.1.8), (3.1.9) и учитывая (1.3.48) при $\iota = 0$ и то обстоятельство, что $\nu^0 = \nu_{\kappa}^D(\nu)$, выводим

$$\begin{aligned}
& \|\mathcal{D}^\mu(S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^{d, l-\epsilon} f - R_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^{d, l-\epsilon} \phi(f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d, m}\|_{L_q(Q_{\kappa, n}^d)} \leq \\
& c_4 2^{(\kappa, \lambda-q^{-1}\epsilon)} c_6 \int_0^{2^{-k}} t^{-(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon)-1} \\
& \times \sum_{j=1}^d t^{-p^{-1}/\alpha_j} \left(\int_{c_8 t^{1/\alpha_j} B^1} \int_{(Q_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^d)_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} dt \leq \\
& c_9 2^{k(\alpha^{-1}, \lambda-q^{-1}\epsilon)} \int_0^{2^{-k}} t^{-(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon)-1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \times \sum_{j=1}^d t^{-p^{-1}/\alpha_j} \left(\int_{c_8 t^{1/\alpha_j} B^1} \int_{(D \cap D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha})_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} dt \leq \\
& \quad c_9 2^{k(\alpha^{-1}, \lambda - q^{-1}\epsilon)} \int_0^{2^{-k}} t^{-(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon) - 1} \\
& \quad \times \sum_{j=1}^d t^{-p^{-1}/\alpha_j} \left(\int_{c_8 t^{1/\alpha_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} dt, \\
& n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset, \nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \cap Q_{\kappa,n}^d \neq \emptyset, \mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda).
\end{aligned} \tag{3.1.10}$$

Выбирая $\epsilon > 0$ так, чтобы соблюдалось неравенство $1 - (\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon) - \epsilon > 0$, из (3.1.10), пользуясь неравенством Гёльдера, выводим оценку

$$\begin{aligned}
& \|\mathcal{D}^\mu(S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f - R_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} \phi(f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m}\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)} \leq \\
& \quad c_9 2^{k(\alpha^{-1}, \lambda - q^{-1}\epsilon)} \int_0^{2^{-k}} t^{\epsilon-1/q'} t^{-(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon) - \epsilon - 1/q} \\
& \quad \times \sum_{j=1}^d t^{-p^{-1}/\alpha_j} \left(\int_{c_8 t^{1/\alpha_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} dt \leq \\
& \quad c_{10} 2^{k(\alpha^{-1}, \lambda - q^{-1}\epsilon) - k\epsilon} \left(\int_0^{2^{-k}} t^{-q(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon) - q\epsilon - 1} \sum_{j=1}^d t^{-(qp^{-1})/\alpha_j} \right. \\
& \quad \times \left. \left(\int_{c_8 t^{1/\alpha_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} dt \right)^{1/q}, \\
& n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset, \nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \cap Q_{\kappa,n}^d \neq \emptyset, \mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda).
\end{aligned}$$

Подставляя эту оценку в (3.1.7) и проводя соответствующие выкладки, в частности, используя (1.3.17), применяя неравенство Гёльдера с показателем $p/q \leq 1$ и (1.3.52), для $f \in \mathcal{K}$ при $p \leq q, \mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)$ получаем

$$\begin{aligned}
& \left\| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} \mathcal{D}^\mu((S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - (R_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} \phi(f))) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)}^q \leq \\
& \quad \sum_{n \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,n}^d \cap G_{\kappa}^{d,m,D} \neq \emptyset} \left(\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D} : Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset} c_{10} 2^{k(\alpha^{-1}, \lambda - q^{-1}\epsilon) - k\epsilon} \right. \\
& \quad \times \left. \left(\int_0^{2^{-k}} t^{-q(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon) - q\epsilon - 1} \sum_{j=1}^d t^{-(qp^{-1})/\alpha_j} \right. \right.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \times \left(\int_{c_8 t^{1/\alpha_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} dt \Big)^{1/q} \Big)^q \leq \\
& \sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset} \left(c_{11} 2^{k(\alpha^{-1}, \lambda - q^{-1}\epsilon) - k\epsilon} \left(\int_0^{2^{-k}} t^{-q(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon) - q\epsilon - 1} \sum_{j=1}^d t^{-(qp^{-1})/\alpha_j} \right. \right. \\
& \times \left. \left. \left(\int_{c_8 t^{1/\alpha_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} dt \right)^{1/q} \right)^q = \\
& (c_{11} 2^{k(\alpha^{-1}, \lambda - q^{-1}\epsilon) - k\epsilon})^q \sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset} \int_0^{2^{-k}} t^{-q(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon) - q\epsilon - 1} \sum_{j=1}^d t^{-(qp^{-1})/\alpha_j} \\
& \times \left(\int_{c_8 t^{1/\alpha_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} dt = \\
& (c_{11} 2^{k(\alpha^{-1}, \lambda - q^{-1}\epsilon) - k\epsilon})^q \int_0^{2^{-k}} t^{-q(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon) - q\epsilon - 1} \sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset} \sum_{j=1}^d t^{-(qp^{-1})/\alpha_j} \\
& \times \left(\int_{c_8 t^{1/\alpha_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} dt = \\
& (c_{11} 2^{k(\alpha^{-1}, \lambda - q^{-1}\epsilon) - k\epsilon})^q \int_0^{2^{-k}} t^{-q(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon) - q\epsilon - 1} \sum_{j=1}^d t^{-(qp^{-1})/\alpha_j} \times \\
& \sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset} \left(\int_{c_8 t^{1/\alpha_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} dt \leq \\
& (c_{11} 2^{k(\alpha^{-1}, \lambda - q^{-1}\epsilon) - k\epsilon})^q \int_0^{2^{-k}} t^{-q(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon) - q\epsilon - 1} \sum_{j=1}^d t^{-(qp^{-1})/\alpha_j} \\
& \times \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset} \int_{c_8 t^{1/\alpha_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} dt = \\
& (c_{11} 2^{k(\alpha^{-1}, \lambda - q^{-1}\epsilon) - k\epsilon})^q \int_0^{2^{-k}} t^{-q(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon) - q\epsilon - 1} \sum_{j=1}^d t^{-(qp^{-1})/\alpha_j} \\
& \times \left(\int_{c_8 t^{1/\alpha_j} B^1} \sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset} \int_{D_{l_j \xi e_j}} \chi_{D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}}(x) |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} dt =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (c_{11}2^{k(\alpha^{-1}, \lambda - q^{-1}\epsilon) - k\epsilon})^q \int_0^{2^{-k}} t^{-q(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon) - q\epsilon - 1} \sum_{j=1}^d t^{-(qp^{-1})/\alpha_j} \\
& \times \left(\int_{c_8 t^{1/\alpha_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j}} \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}^d: Q_{\kappa, n}^d \cap G_{\kappa}^{d, m, D} \neq \emptyset} \chi_{D_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}}(x) \right) |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} dt \leq \\
& (c_{11}2^{k(\alpha^{-1}, \lambda - q^{-1}\epsilon) - k\epsilon})^q \int_0^{2^{-k}} t^{-q(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon) - q\epsilon - 1} \sum_{j=1}^d t^{-(qp^{-1})/\alpha_j} \\
& \times \left(\int_{c_8 t^{1/\alpha_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j}} c_{12} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} dt \leq \\
& (c_{13}2^{k(\alpha^{-1}, \lambda - q^{-1}\epsilon) - k\epsilon})^q \int_0^{2^{-k}} t^{-q(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon) - q\epsilon - 1} \sum_{j=1}^d \left((2c_8 t^{1/\alpha_j})^{-p^{-1}} \right. \\
& \times \left. \left(\int_{c_8 t^{1/\alpha_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \right)^q dt = \\
& (c_{13}2^{k(\alpha^{-1}, \lambda - q^{-1}\epsilon) - k\epsilon})^q \int_0^{2^{-k}} t^{-q(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon) - q\epsilon - 1} \sum_{j=1}^d \left(\Omega_j^{l_j}(f, c_8 t^{1/\alpha_j})_{L_p(D)} \right)^q dt \leq \\
& (c_{13}2^{k(\alpha^{-1}, \lambda - q^{-1}\epsilon) - k\epsilon})^q \int_0^{2^{-k}} t^{-q(\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon) - q\epsilon - 1} c_{14} t^q dt = \\
& (c_{15}2^{k(\alpha^{-1}, \lambda - q^{-1}\epsilon) - k\epsilon})^q \int_0^{2^{-k}} t^{q(1 - (\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon) - \epsilon) - 1} dt = \\
& (c_{15}2^{k(\alpha^{-1}, \lambda - q^{-1}\epsilon) - k\epsilon})^q c_{16} 2^{-kq(1 - (\alpha^{-1}, p^{-1}\epsilon) - \epsilon)} = \\
& (c_{17}2^{-k(1 - (\alpha^{-1}, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon))})^q. \quad (3.1.11)
\end{aligned}$$

Соединяя (3.1.6) и (3.1.11), приходим к оценке

$$\|\mathcal{D}^\lambda E_{\kappa}^{d, l-\epsilon, m, D} f - A \circ \phi(f)\|_{L_q(D)} \leq c_{18} 2^{-k(1 - (\alpha^{-1}, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon))}. \quad (3.1.12)$$

Подстановка оценок (1.3.63) и (3.1.12) в (3.1.5) приводит к неравенству

$$\|\mathcal{D}^\lambda f - A \circ \phi(f)\|_{L_q(D)} \leq c_{19} 2^{-k(1 - (\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon))}, f \in \mathcal{K}, p \leq q. \quad (3.1.13)$$

В условиях теоремы 3.1.2 выполнение неравенства (3.1.13) при $q < p$ вытекает из соблюдения неравенства (3.1.13) при $q = p$ и того факта, что при $q < p$ для $h \in L_p(D)$ справедливо неравенство $\|h\|_{L_q(D)} \leq c_{20} \|h\|_{L_p(D)}$.

Из (3.1.13) с учётом (3.1.3) следует, что

$$\bar{\sigma}_n(U, \mathcal{K}, X) \leq \bar{\sigma}_{n(k, \alpha, D)}(U, \mathcal{K}, X) \leq c_{19} 2^{-k(1 - (\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon))}.$$

Отсюда, пользуясь тем, что для n , удовлетворяющего (3.1.3), справедливо соотношение $n \leq c_{21}(\alpha, D)2^{k(\alpha^{-1}, \epsilon)}$, приходим к (3.1.2). $\square$

3.2. В этом пункте выводится оценка снизу величины наилучшей точности восстановления в $L_q(D)$ производной $\mathcal{D}^\lambda f$ по значениям в n точках функций f из $(\mathcal{H}_p^\alpha)'(D), (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(D)$.

Теорема 3.2.1

В условиях теоремы 3.1.2 существует константа $c_1(d, \alpha, D, p, \theta, q, \lambda) > 0$ такая, что при $n \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство

$$\sigma_n(U, \mathcal{K}, X) \geq c_1 n^{-(1-(\alpha^{-1}, \lambda+(p^{-1}-q^{-1})+\epsilon))/(\alpha^{-1}, \epsilon)}. \quad (3.2.1)$$

В основе доказательства теоремы 3.2.1 лежит лемма 3.2.2, установленная в [6].

Лемма 3.2.2

Пусть $d \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{R}_+^d, \theta \in \mathbb{R} : \theta \geq 1, 1 \leq p < \infty, 1 \leq q \leq \infty, \lambda \in \mathbb{Z}_+^d$ и $\mathfrak{l} = \mathfrak{l}(\alpha) \in \mathbb{Z}_+^d$. Тогда существует константа $c_2(d, \alpha, p, \theta, q, \lambda) > 0$ такая, что для любого $n \in \mathbb{N}$ для любого набора точек $x^1, \dots, x^n \in I^d$ можно построить функцию $f \in C_0^\infty(I^d) \cap (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)^{\mathfrak{l}}(\mathbb{R}^d)$, для которой

$$f(x^i) = 0, i = 1, \dots, n, \quad (3.2.2)$$

и

$$\|\mathcal{D}^\lambda f\|_{L_q(I^d)} \geq c_2 n^{-(1-(\alpha^{-1}, \lambda+(p^{-1}-q^{-1})+\epsilon))/(\alpha^{-1}, \epsilon)}. \quad (3.2.3)$$

Отметим, что функция f в формулировке леммы 3.2.2, приведенной в [6], принадлежит $C_0^\infty(\mathbb{R}^d) \cap (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)^{\mathfrak{l}}(I^d)$. Однако, как видно из доказательства леммы, на самом деле $f \in C_0^\infty(I^d) \cap (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)^{\mathfrak{l}}(\mathbb{R}^d)$.

Доказательство теоремы 3.2.1.

Принимая во внимание включение (1.1.7), доказательство проводим в случае $\mathcal{K} = (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(D)$.

Фиксируем точку $x^0 \in \mathbb{R}^d$ и вектор $\delta \in \mathbb{R}_+^d$ такие, что $Q = (x^0 + \delta I^d) \subset D$, и пусть $n \in \mathbb{N}, A \in \mathcal{A}^n(X)$ и $\phi \in \Phi_n(C(D))$ определяется системой точек $y^1, \dots, y^n \in D$.

Для $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d$, удовлетворяющего условиям теоремы 3.2.1, возьмём функцию $f \in (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)^{\mathfrak{l}}(\mathbb{R}^d) \cap C_0^\infty(I^d)$, обладающую свойствами (3.2.2) и (3.2.3), где $x^i = \delta^{-1}(y^i - x^0), i = 1, \dots, n$. Рассмотрим функцию $F = h_{\delta, x^0}^{-1} f$ (см. п. 2.2.). Тогда, поскольку ввиду (1.1.8) функция $f \in (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d) \cap C_0^\infty(I^d)$, то в силу (2.2.1), (2.2.7) функция $F \in (c_3(\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d)) \cap C_0^\infty(Q)$. Полагая $\mathcal{F} = (1/c_3)F|_D$, получаем, что $\text{supp } \mathcal{F} \subset Q, \mathcal{F} \in (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(D), \mathcal{F}(y^i) = (1/c_3)F(y^i) = (1/c_3)f(\delta^{-1}(y^i - x^0)) = (1/c_3)f(x^i) = 0, i = 1, \dots, n$.

При этом ввиду (3.2.3) соблюдается неравенство

$$\begin{aligned} c_2 n^{-(1-(\alpha^{-1}, \lambda+(p^{-1}-q^{-1})_+ \epsilon))/(\alpha^{-1}, \epsilon)} &\leq \|\mathcal{D}^\lambda f\|_{L_q(I^d)} \\ &= \|\mathcal{D}^\lambda(h_{\delta, x^0} F)\|_{L_q(I^d)} = c_4(\delta, \lambda, q) \|\mathcal{D}^\lambda F\|_{L_q(Q)} = c_5 \|\mathcal{D}^\lambda \mathcal{F}\|_{L_q(Q)} = c_5 \|\mathcal{D}^\lambda \mathcal{F}\|_{L_q(D)} = \\ &= c_5 \|\mathcal{D}^\lambda \mathcal{F} - A \circ \phi(\mathcal{F}) + A \circ \phi(0) - \mathcal{D}^\lambda 0\|_{L_q(D)} \leq 2c_5 \sup_{g \in \mathcal{K}} \|\mathcal{D}^\lambda g - A \circ \phi(g)\|_X. \end{aligned}$$

Отсюда, в силу произвольности $A \in \mathcal{A}^n(X)$ и $\phi \in \Phi_n(C(D))$, заключаем, что имеет место (3.2.1). $\square$

§4. Задача С.Б. Стечкина

для оператора частного дифференцирования
на неизотропных классах функций Никольского и Бесова

4.1. В этом пункте будет получена оценка сверху наилучшей точности приближения в $L_q(D)$ оператора $\mathcal{D}^\lambda$ ограниченными операторами, действующими из $L_s(D)$ в $L_q(D)$, на классах $(\mathcal{H}_p^\alpha)'(D)$ и $(\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(D)$, где D – ограниченная область α -типа в $\mathbb{R}^d$.

Напомним постановку общей задачи, частным случаем которой является задача, рассматриваемая в этом параграфе.

Пусть X, Y – банаховы пространства, $\mathcal{B}(X, Y)$ – банахово пространство непрерывных линейных операторов $V : X \mapsto Y$ с обычной нормой, $A : D(A) \mapsto Y$ – линейный оператор с областью определения $D(A) \subset X$. Пусть ещё множество $\mathcal{K} \subset D(A)$ и $\rho > 0$.

Требуется описать поведение в зависимости от ρ величины

$$E(A, X, Y, \mathcal{K}, \rho) = \inf_{\{V \in \mathcal{B}(X, Y) : \|V\|_{\mathcal{B}(X, Y)} \leq \rho\}} \sup_{x \in \mathcal{K}} \|Ax - Vx\|_Y.$$

Теорема 4.1.1

Пусть $d \in \mathbb{N}$, $\alpha \in \mathbb{R}_+^d$, $1 \leq p < \infty$, $1 \leq q, s \leq \infty$ и $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d$ удовлетворяют условию (1.3.62), а также при $p < s$ соблюдается неравенство

$$1 - (\alpha^{-1}, (p^{-1} - s^{-1})_+ \epsilon) > 0,$$

и, кроме того, выполняется неравенство

$$(\alpha^{-1}, \lambda + (s^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon) > 0.$$

Пусть ещё $D \subset \mathbb{R}^d$ – ограниченная область α -типа, $A = \mathcal{D}^\lambda$, $D(A) = \{f \in L_s(D) : \mathcal{D}^\lambda f \in L_q(D)\}$, $X = L_s(D)$, $Y = L_q(D)$, $\mathcal{K} = (\mathcal{H}_p^\alpha)'(D)$, $(\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(D)$, где $\theta \in \mathbb{R} : \theta \geq 1$, $\gamma = 1 - (\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon)$, $\tau = (\alpha^{-1}, \lambda + (s^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon)$.

Тогда существуют константы $\rho_1(d, \alpha, D, q, s, \lambda) > 0$ и $c_1(d, \alpha, D, p, q, s, \lambda) > 0$ такие, что для $\rho \geq \rho_1$ справедливо неравенство

$$E(A, X, Y, \mathcal{K}, \rho) \leq c_1 \rho^{-\gamma/\tau}. \quad (4.1.1)$$

Для доказательства теоремы 4.1.1 достаточно заметить, что в условиях теоремы множество $\mathcal{K} \subset D(A)$, и если взять $l = l(\alpha)$, $m \in \mathbb{N}^d$: $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d(m)$, то для каждого достаточно большого $k \in \mathbb{Z}_+$ для оператора $V : L_s(D) \mapsto L_q(D)$, определяемого равенством

$$Vf = (\mathcal{D}^\lambda(E_k^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f))|_D,$$

в силу (1.3.63), (1.3.24) (см. также (1.1.7)) выполняются соотношения

$$\sup_{f \in \mathcal{K}} \|\mathcal{D}^\lambda f - Vf\|_{L_q(D)} \leq c_2 2^{-k(1-(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon))},$$

и

$$\|V\|_{\mathcal{B}(L_s(D), L_q(D))} \leq c_3 2^{k(\alpha^{-1}, \lambda + (s^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon)},$$

а, следовательно,

$$\inf_{\{\mathcal{V} \in \mathcal{B}(X, Y) : \|\mathcal{V}\|_{\mathcal{B}(X, Y)} \leq c_3 2^{k(\alpha^{-1}, \lambda + (s^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon)}\}} \sup_{f \in \mathcal{K}} \|\mathcal{D}^\lambda f - \mathcal{V}f\|_Y \leq c_2 2^{-k(1-(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon))}. \quad \square$$

4.2. В этом пункте проводится оценка снизу величины, которая рассматривалась в п. 4.1. Для доказательства этой оценки используем утверждение, справедливость которого по существу установлена в [6] при доказательстве теоремы 3.2.4, опирающейся на леммы 3.2.2, 3.2.3. При этом будем пользоваться следующим обозначением. Для множества S , состоящего из функций f , область определения которых содержит множество $D \subset \mathbb{R}^d$, через $S|_D$ обозначим множество $S|_D = \{f|_D : f \in S\}$.

Теорема 4.2.1

Пусть $d, \alpha, p, q, s, \lambda$ удовлетворяют условиям теоремы 4.1.1 и $\mathfrak{l} = \mathfrak{l}(\alpha)$ (см. п. 1.1.). Пусть ещё $A = \mathcal{D}^\lambda$, $D(A) = \{f \in L_s(I^d) : \mathcal{D}^\lambda f \in L_q(I^d)\}$, $X = L_s(I^d)$, $Y = L_q(I^d)$, $\mathcal{K} = ((\mathcal{B}_{p, \theta}^\alpha)^{\mathfrak{l}}(\mathbb{R}^d) \cap C_0^\infty(I^d))|_{I^d}$, где $\theta \in \mathbb{R} : \theta \geq 1$, $\gamma = 1 - (\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon)$, $\tau = (\alpha^{-1}, \lambda + (s^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon)$. Тогда существуют константы $c_1(d, \alpha, p, \theta, q, s, \lambda) > 0$ и $\rho_1(d, \alpha, q, s, \lambda) > 0$ такие, что для $\rho > \rho_1$ выполняется неравенство

$$E(A, X, Y, \mathcal{K}, \rho) \geq c_1 \rho^{-\gamma/\tau}. \quad (4.2.1)$$

Теорема 4.2.2

В условиях и обозначениях теоремы 4.1.1 существуют константы $\rho_2(d, \alpha, D, q, s, \lambda) > 0$, $c_2(d, \alpha, D, p, \theta, q, s, \lambda) > 0$ такие, что при $\rho > \rho_2$ соблюдается неравенство (4.2.1) с константой c_2 вместо c_1 .

Доказательство.

Ввиду включения (1.1.7) рассмотрим лишь случай, когда $\mathcal{K} = (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(D)$. Фиксируем $x^0 \in \mathbb{R}^d$ и $\delta \in \mathbb{R}_+^d$ такие, что $Q = (x^0 + \delta I^d) \subset D$. Прежде всего, отметим, что в силу (1.1.8), (4.2.1) при $\rho > \rho_1$ верно неравенство

$$c_1 \rho^{-\gamma/\tau} \leq E(\mathcal{D}^\lambda, L_s(I^d), L_q(I^d), ((\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d) \cap C_0^\infty(I^d))|_{I^d}, \rho). \quad (4.2.2)$$

Далее, заметим, что для $f \in L_s(I^d) : \mathcal{D}^\lambda f \in L_q(I^d), V \in \mathcal{B}(L_s(Q), L_q(Q))$ имеет место соотношение

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}^\lambda f - (h_{\delta,x^0} V h_{\delta,x^0}^{-1}) f\|_{L_q(I^d)} &= \left(\int_{I^d} |\mathcal{D}^\lambda f - (h_{\delta,x^0} V h_{\delta,x^0}^{-1}) f|^q dx \right)^{1/q} = \\ &= \left(\int_Q |h_{\delta,x^0}^{-1}(\mathcal{D}^\lambda f) - V(h_{\delta,x^0}^{-1} f)|^q \delta^{-\epsilon} dy \right)^{1/q} = \\ &= \delta^{-q^{-1}\epsilon} \left(\int_Q |\delta^\lambda \mathcal{D}^\lambda(h_{\delta,x^0}^{-1} f) - V(h_{\delta,x^0}^{-1} f)|^q dy \right)^{1/q} = \\ &= \delta^{\lambda-q^{-1}\epsilon} \|\mathcal{D}^\lambda(h_{\delta,x^0}^{-1} f) - \delta^{-\lambda} V(h_{\delta,x^0}^{-1} f)\|_{L_q(Q)}. \end{aligned}$$

Отметим еще, что для $V \in \mathcal{B}(L_s(Q), L_q(Q))$, вследствие (2.2.2), (2.2.3), норма

$$\begin{aligned} \|h_{\delta,x^0} V h_{\delta,x^0}^{-1}\|_{\mathcal{B}(L_s(I^d), L_q(I^d))} &\leq \|h_{\delta,x^0}\|_{\mathcal{B}(L_q(Q), L_q(I^d))} \\ &\leq \|V\|_{\mathcal{B}(L_s(Q), L_q(Q))} \|h_{\delta,x^0}^{-1}\|_{\mathcal{B}(L_s(I^d), L_s(Q))} \leq \\ &\leq \delta^{-q^{-1}\epsilon} \|V\|_{\mathcal{B}(L_s(Q), L_q(Q))} \delta^{s^{-1}\epsilon} = \delta^{s^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon} \|V\|_{\mathcal{B}(L_s(Q), L_q(Q))}. \end{aligned}$$

Учитывая эти обстоятельства, а также (2.2.1), (2.2.7), при $\rho \in \mathbb{R}_+$ для $V \in \mathcal{B}(L_s(Q), L_q(Q)) : \|V\|_{\mathcal{B}(L_s(Q), L_q(Q))} \leq \delta^\lambda \rho$, получаем, что

$$\begin{aligned} &\inf_{\{U \in \mathcal{B}(L_s(I^d), L_q(I^d)) : \|U\|_{\mathcal{B}(L_s(I^d), L_q(I^d))} \leq \delta^{\lambda+s^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon} \rho\}} \sup_{f \in ((\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d) \cap C_0^\infty(I^d))|_{I^d}} \|\mathcal{D}^\lambda f - Uf\|_{L_q(I^d)} \leq \\ &\sup_{f \in ((\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d) \cap C_0^\infty(I^d))|_{I^d}} \|\mathcal{D}^\lambda f - (h_{\delta,x^0} V h_{\delta,x^0}^{-1}) f\|_{L_q(I^d)} = \\ &\sup_{f \in ((\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d) \cap C_0^\infty(I^d))|_{I^d}} \delta^{\lambda-q^{-1}\epsilon} \|\mathcal{D}^\lambda(h_{\delta,x^0}^{-1} f) - \delta^{-\lambda} V(h_{\delta,x^0}^{-1} f)\|_{L_q(Q)} = \end{aligned}$$

$$\delta^{\lambda-q^{-1}\epsilon} \sup_{f \in ((\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d) \cap C_0^\infty(I^d))|_{I^d}} \|\mathcal{D}^\lambda(h_{\delta,x_0}^{-1}f) - \delta^{-\lambda}V(h_{\delta,x_0}^{-1}f)\|_{L_q(Q)} \leq$$

$$\delta^{\lambda-q^{-1}\epsilon} \sup_{F \in (c_3(\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d) \cap C_0^\infty(Q))} \|\mathcal{D}^\lambda(F|_Q) - \delta^{-\lambda}V(F|_Q)\|_{L_q(Q)},$$

и, значит,

$$c_3 \inf_{\substack{\mathcal{V} \in \mathcal{B}(L_s(Q), L_q(Q)): \\ \|\mathcal{V}\|_{\mathcal{B}(L_s(Q), L_q(Q))} \leq \rho}} \sup_{F \in (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d) \cap C_0^\infty(Q)} \|\mathcal{D}^\lambda(F|_Q) - \mathcal{V}(F|_Q)\|_{L_q(Q)} \geq$$

$$\delta^{-\lambda+q^{-1}\epsilon} \inf_{\substack{\{U \in \mathcal{B}(L_s(I^d), L_q(I^d)): \\ \|U\|_{\mathcal{B}(L_s(I^d), L_q(I^d))} \leq \delta^{\lambda+s^{-1}\epsilon-q^{-1}\epsilon}\rho\}}} \sup_{f \in ((\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d) \cap C_0^\infty(I^d))|_{I^d}} \|\mathcal{D}^\lambda f - Uf\|_{L_q(I^d)}.$$

(4.2.3)

Пользуясь тем, что для $F \in C_0^\infty(Q)$ справедливо равенство $F|_D = (\mathcal{I}^Q(F|_Q))|_D$ ($\mathcal{I}^Q$ см. в п. 1.3.), а для $\mathcal{V} \in \mathcal{B}(L_s(D), L_q(D))$ имеет место неравенство

$$\|(\mathcal{V}((\mathcal{I}^Q f)|_D))|_Q\|_{L_q(Q)} \leq \|\mathcal{V}((\mathcal{I}^Q f)|_D)\|_{L_q(D)} \leq$$

$$\|\mathcal{V}\|_{\mathcal{B}(L_s(D), L_q(D))} \|(\mathcal{I}^Q f)|_D\|_{L_s(D)} =$$

$$\|\mathcal{V}\|_{\mathcal{B}(L_s(D), L_q(D))} \|((\mathcal{I}^Q f)|_D)|_Q\|_{L_s(Q)} =$$

$$\|\mathcal{V}\|_{\mathcal{B}(L_s(D), L_q(D))} \|f\|_{L_s(Q)}, f \in L_s(Q),$$

для $\mathcal{V} \in \mathcal{B}(L_s(D), L_q(D)) : \|\mathcal{V}\|_{\mathcal{B}(L_s(D), L_q(D))} \leq \rho$, выводим

$$\sup_{f \in (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(D)} \|\mathcal{D}^\lambda f - \mathcal{V}f\|_{L_q(D)} \geq$$

$$\sup_{F \in (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d) \cap C_0^\infty(Q)} \|\mathcal{D}^\lambda(F|_D) - \mathcal{V}(F|_D)\|_{L_q(D)} \geq$$

$$\sup_{F \in (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d) \cap C_0^\infty(Q)} \|(\mathcal{D}^\lambda(F|_D))|_Q - (\mathcal{V}(F|_D))|_Q\|_{L_q(Q)} =$$

$$\sup_{F \in (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d) \cap C_0^\infty(Q)} \|\mathcal{D}^\lambda(F|_Q) - (\mathcal{V}((\mathcal{I}^Q(F|_Q))|_D))|_Q\|_{L_q(Q)} \geq$$

$$\inf_{V \in \mathcal{B}(L_s(Q), L_q(Q)) : \|V\|_{\mathcal{B}(L_s(Q), L_q(Q))} \leq \rho} \sup_{F \in (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d) \cap C_0^\infty(Q)} \|\mathcal{D}^\lambda(F|_Q) - V(F|_Q)\|_{L_q(Q)},$$

а, следовательно,

$$\inf_{\mathcal{V} \in \mathcal{B}(L_s(D), L_q(D)) : \|\mathcal{V}\|_{\mathcal{B}(L_s(D), L_q(D))} \leq \rho} \sup_{f \in (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(D)} \|\mathcal{D}^\lambda f - \mathcal{V}f\|_{L_q(D)} \geq$$

$$\inf_{V \in \mathcal{B}(L_s(Q), L_q(Q)) : \|V\|_{\mathcal{B}(L_s(Q), L_q(Q))} \leq \rho} \sup_{F \in (\mathcal{B}_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d) \cap C_0^\infty(Q)} \|\mathcal{D}^\lambda(F|_Q) - V(F|_Q)\|_{L_q(Q)}.$$

(4.2.4)

Соединяя (4.2.4), (4.2.3), (4.2.2), заключаем, что при $\rho > \rho_2 = \delta^{-\lambda-s^{-1}\epsilon+q^{-1}\epsilon}\rho_1$ соблюдается неравенство (4.2.1), где $A, X, Y, \mathcal{K}$ имеют тот же смысл, что в формулировке теоремы 4.1.1. $\square$

§5. Поперечники классов $\mathcal{D}^\lambda(B((H_p^\alpha)'(D)))$ и $\mathcal{D}^\lambda(B((B_{p,\theta}^\alpha)'(D)))$ в пространстве $L_q(D)$

5.1. В этом пункте введём в рассмотрение подходящие нам пространства кусочно-полиномиальных функций и установим некоторые вспомогательные утверждения, касающиеся самих пространств и линейных отображений в эти пространства, с помощью которых проводятся верхние оценки изучаемых поперечников. Но сначала приведем взятую из [6] лемму 5.1.1.

Лемма 5.1.1

Пусть $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d, 1 \leq p \leq \infty$. Тогда существует константа $c_1(d, l) > 0$ такая, что для любого $\delta \in \mathbb{R}_+^d$ и любого $x^0 \in \mathbb{R}^d$ для $Q = x^0 + \delta I^d$ можно построить систему линейных операторов $P_{\delta, x^0}^{d, l, \lambda} : L_1(Q) \mapsto \mathcal{P}^{d, l}, \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l)$, обладающих следующими свойствами:

1) для $f \in L_p(Q)$ при $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l)$ справедливо неравенство

$$\|P_{\delta, x^0}^{d, l, \lambda} f\|_{L_p(Q)} \leq c_1 \|f\|_{L_p(Q)}; \quad (5.1.1)$$

2) для $f \in \mathcal{P}^{d, l}$ при $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l)$ имеет место равенство

$$P_{\delta, x^0}^{d, l, \lambda}(f | Q) = f; \quad (5.1.2)$$

3) если при $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l)$ для $f \in L_1(Q)$ её обобщённая производная $\mathcal{D}^\lambda f \in L_1(Q)$, то соблюдается равенство

$$\mathcal{D}^\lambda P_{\delta, x^0}^{d, l, \lambda} f = P_{\delta, x^0}^{d, l-\lambda, 0} \mathcal{D}^\lambda f. \quad (5.1.3)$$

Введем в рассмотрение следующие пространства кусочно-полиномиальных функций.

При $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d$ и области $D \subset \mathbb{R}^d$ положим

$$N_\kappa^{d, D} = \{\nu \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, \nu}^d \cap D \neq \emptyset\}$$

и через $\mathcal{P}_\kappa^{d, l, D}$ обозначим линейное пространство, состоящее из функций $f : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$, для каждой из которых существует набор полиномов $\{f_\nu \in \mathcal{P}^{d, l}, \nu \in N_\kappa^{d, D}\}$ такой, что для $x \in \mathbb{R}^d$ выполняется равенство

$$f(x) = \sum_{\nu \in N_\kappa^{d, D}} f_\nu(x) \chi_{\kappa, \nu}^d(x), \quad (5.1.4)$$

где $\chi_{\kappa,\nu}^d$ — характеристическая функция множества $Q_{\kappa,\nu}^d = 2^{-\kappa}\nu + 2^{-\kappa}I^d$.

Нетрудно видеть, что при $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d$ и области $D \subset \mathbb{R}^d$ отображение, которое каждому набору полиномов $\{f_\nu \in \mathcal{P}_\nu^{d,l}, \nu \in N_\kappa^{d,D}\}$ ставит в соответствие функцию f , задаваемую равенством (5.1.4), является изоморфизмом прямого произведения $\text{card } N_\kappa^{d,D}$ экземпляров пространства $\mathcal{P}_\kappa^{d,l}$ на пространство $\mathcal{P}_\kappa^{d,l,D}$. Обозначая через $R_\kappa^{d,l,D} = \dim \mathcal{P}_\kappa^{d,l,D} = (l + \mathfrak{e})^{\mathfrak{e}} \text{card } N_\kappa^{d,D}$, отметим, что для $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d$, и ограниченной области $D \subset \mathbb{R}^d$ существуют константы $c_2(d, l, D) > 0$ и $c_3(d, l, D) > 0$ такие, что при $\kappa \in \mathbb{Z}_+^d$ выполняется неравенство

$$c_2 2^{(\kappa, \mathfrak{e})} < R_\kappa^{d,l,D} < c_3 2^{(\kappa, \mathfrak{e})}.$$

При тех же d, l, D и $\alpha \in \mathbb{R}_+^d, k \in \mathbb{Z}_+$ будем обозначать $\mathcal{P}_k^{d,l,D,\alpha} = \mathcal{P}_\kappa^{d,l,D}$, $R_k^{d,l,D,\alpha} = R_\kappa^{d,l,D}$ при $\kappa = \kappa(k, \alpha)$.

Нетрудно убедиться в том, что справедлива

Лемма 5.1.2

Пусть $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d, D$ — область в $\mathbb{R}^d, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, \kappa' \in \mathbb{Z}_+^d : \kappa' \leq \kappa$. Тогда для $f \in \mathcal{P}_{\kappa'}^{d,l,D}$ имеет место включение

$$\left(\sum_{\nu \in N_\kappa^{d,D}} \chi_{\kappa,\nu}^d \right) f \in \mathcal{P}_\kappa^{d,l,D}. \quad (5.1.5)$$

Доказательство.

Прежде всего, заметим, что поскольку при $\kappa, \kappa' \in \mathbb{Z}_+^d$ для каждого $\nu \in \mathbb{Z}^d$ соблюдается соотношение

$$Q_{\kappa,\nu}^d = Q_{\kappa,\nu}^d \cap \mathbb{R}^d = Q_{\kappa,\nu}^d \cap (\cup_{\nu' \in \mathbb{Z}^d} \overline{Q}_{\kappa',\nu'}^d) = \cup_{\nu' \in \mathbb{Z}^d} (Q_{\kappa,\nu}^d \cap \overline{Q}_{\kappa',\nu'}^d) \neq \emptyset,$$

то существует $\nu' \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa,\nu}^d \cap \overline{Q}_{\kappa',\nu'}^d \neq \emptyset$, а для такого ν' ввиду открытости $Q_{\kappa,\nu}^d$ множество $Q_{\kappa,\nu}^d \cap Q_{\kappa',\nu'}^d \neq \emptyset$.

Кроме того, при $\kappa, \kappa' \in \mathbb{Z}_+^d : \kappa' \leq \kappa$, если $\nu, \nu' \in \mathbb{Z}^d$ таковы, что $Q_{\kappa,\nu}^d \cap Q_{\kappa',\nu'}^d \neq \emptyset$, то, выбирая $x \in Q_{\kappa,\nu}^d \cap Q_{\kappa',\nu'}^d$, имеем

$$2^{-\kappa}\nu < x < 2^{-\kappa'}\nu' + 2^{-\kappa'};$$

и

$$2^{-\kappa'}\nu' < x < 2^{-\kappa}\nu + 2^{-\kappa},$$

или

$$\nu < 2^{\kappa-\kappa'}\nu' + 2^{\kappa-\kappa'}; 2^{\kappa-\kappa'}\nu' < \nu + \mathfrak{e},$$

а это значит, что

$$\nu \leq 2^{\kappa-\kappa'}\nu' + 2^{\kappa-\kappa'} - \mathfrak{e}; 2^{\kappa-\kappa'}\nu' \leq \nu,$$

откуда

$$2^{-\kappa'} \nu' \leq 2^{-\kappa} \nu, 2^{-\kappa} \nu + 2^{-\kappa} \leq 2^{-\kappa'} \nu' + 2^{-\kappa'},$$

т.е. $Q_{\kappa, \nu}^d \subset Q_{\kappa', \nu'}^d$.

Учитывая это обстоятельство, отметим еще, что при $\kappa, \kappa' \in \mathbb{Z}_+^d : \kappa' \leq \kappa$, для $\nu \in N_{\kappa}^{d, D}$, если $\nu' \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, \nu}^d \cap Q_{\kappa', \nu'}^d \neq \emptyset$, то $\nu' \in N_{\kappa'}^{d, D}$, ибо в этом случае

$$D \cap Q_{\kappa', \nu'}^d \supset D \cap Q_{\kappa, \nu}^d \neq \emptyset.$$

И обратно, при $\kappa, \kappa' \in \mathbb{Z}_+^d : \kappa' \leq \kappa$, для каждого $\nu' \in N_{\kappa'}^{d, D}$ существует $\nu \in N_{\kappa}^{d, D}$, для которого $Q_{\kappa, \nu}^d \cap Q_{\kappa', \nu'}^d \neq \emptyset$, поскольку, выбирая $x \in D \cap Q_{\kappa', \nu'}^d$, можно найти $\nu \in \mathbb{Z}^d$, такой, что $x \in \overline{Q}_{\kappa, \nu}^d$, что в силу открытости $D \cap Q_{\kappa', \nu'}^d$ влечет непустоту множества $D \cap Q_{\kappa', \nu'}^d \cap Q_{\kappa, \nu}^d$.

На основании сказанного заключаем, что в условиях леммы для каждого $\nu \in \mathbb{Z}^d$ существует единственный мультииндекс $\nu'(\nu) \in \mathbb{Z}^d$ такой, что $Q_{\kappa, \nu}^d \cap Q_{\kappa', \nu'(\nu)}^d \neq \emptyset$, причем

$$Q_{\kappa, \nu}^d \subset Q_{\kappa', \nu'(\nu)}^d, \quad (5.1.6)$$

и отображение $\mathbb{Z}^d \ni \nu \mapsto \nu'(\nu) \in \mathbb{Z}^d$ отображает $N_{\kappa}^{d, D}$ на $N_{\kappa'}^{d, D}$. Принимая во внимание эти обстоятельства, для $f = \sum_{\nu' \in N_{\kappa'}^{d, D}} f_{\nu'} \chi_{\kappa', \nu'}^d \in \mathcal{P}_{\kappa'}^{d, l, D}$ с учетом (5.1.6) имеем

$$\begin{aligned} \left(\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d, D}} \chi_{\kappa, \nu}^d \right) f &= \left(\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d, D}} \chi_{\kappa, \nu}^d \right) \left(\sum_{\nu' \in N_{\kappa'}^{d, D}} f_{\nu'} \chi_{\kappa', \nu'}^d \right) = \\ &= \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d, D}} \chi_{\kappa, \nu}^d \left(\sum_{\nu' \in N_{\kappa'}^{d, D}} f_{\nu'} \chi_{\kappa', \nu'}^d \right) = \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d, D}} \left(\sum_{\nu' \in N_{\kappa'}^{d, D}} f_{\nu'} \chi_{\kappa, \nu}^d \chi_{\kappa', \nu'}^d \right) = \\ &= \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d, D}} \left(\sum_{\nu' \in N_{\kappa'}^{d, D} : Q_{\kappa, \nu}^d \cap Q_{\kappa', \nu'}^d \neq \emptyset} f_{\nu'} \chi_{\kappa, \nu}^d \chi_{\kappa', \nu'}^d \right) = \\ &= \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d, D}} f_{\nu'(\nu)} \chi_{\kappa, \nu}^d \chi_{\kappa', \nu'(\nu)}^d = \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d, D}} f_{\nu'(\nu)} \chi_{\kappa, \nu}^d \in \mathcal{P}_{\kappa}^{d, l, D}, \quad (5.1.7) \end{aligned}$$

что завершает доказательство (5.1.5). $\square$

Для формулировки леммы 5.1.3 введём следующие обозначения.

Для $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d, \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l), \kappa \in \mathbb{Z}_+^d, \nu \in \mathbb{Z}^d$ обозначим через $S_{\kappa, \nu}^{d, l, \lambda} : L_1(Q_{\kappa, \nu}^d) \mapsto \mathcal{P}^{d, l}$ линейный оператор, определяемый равенством

$$S_{\kappa, \nu}^{d, l, \lambda} = P_{\delta, x^0}^{d, l, \lambda} \text{ при } \delta = 2^{-\kappa}, x^0 = 2^{-\kappa} \nu$$

(см. лемму 5.1.1).

Для $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d, \lambda, \mu \in \mathbb{Z}_+^d(l), \alpha \in \mathbb{R}_+^d$, ограниченной области D в $\mathbb{R}^d$ при $k \in \mathbb{Z}_+$, для которого при $\kappa = \kappa(k, \alpha)$ существует $\nu \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, \nu}^d \subset D$, определим непрерывный линейный оператор $\mathcal{U}_{k, \lambda}^{d, l, \mu, D, \alpha} : L_1(D) \mapsto \mathcal{P}_k^{d, l-\lambda, D, \alpha} \cap L_\infty(\mathbb{R}^d)$, полагая для $f \in L_1(D)$ значение

$$\mathcal{U}_{k, \lambda}^{d, l, \mu, D, \alpha} f = \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d, D}} (\mathcal{D}^\lambda S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d, l, \mu}(f|_{Q_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^d})) \chi_{\kappa, \nu}^d$$

при $\kappa = \kappa(k, \alpha)$.

Лемма 5.1.3

Пусть $d \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{R}_+^d, l = l(\alpha), \lambda \in \mathbb{Z}_+^d, D \subset \mathbb{R}^d$ – ограниченная область α -типа. Пусть ещё $1 \leq p < \infty, 1 \leq q \leq \infty$ и соблюдается условие (1.3.62). Тогда существует константа $c_4(d, \alpha, D, \lambda, p, q) > 0$ такая, что для любой функции $f \in (\mathcal{H}_p^\alpha)'(D)$ при $k \in \mathbb{Z}_+ : k \geq K^0$ (K^0 см. в п. 1.3.) соблюдается неравенство

$$\|\mathcal{D}^\lambda f - \mathcal{U}_{k, 0}^{d, l-\epsilon-\lambda, 0, D, \alpha} \mathcal{D}^\lambda f\|_{L_q(D)} \leq c_4 2^{-k(1-(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1}-q^{-1})+\epsilon))}. \quad (5.1.8)$$

Доказательство.

В условиях леммы фиксируем $m \in \mathbb{N}^d : \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(m)$. Тогда для $f \in (\mathcal{H}_p^\alpha)'(D)$ при $k \in \mathbb{Z}_+ : k \geq K^0$, и $\kappa = \kappa(k, \alpha)$ имеем

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}^\lambda f - \mathcal{U}_{k, 0}^{d, l-\epsilon-\lambda, 0, D, \alpha} \mathcal{D}^\lambda f\|_{L_q(D)} &\leq \|\mathcal{D}^\lambda f - \mathcal{D}^\lambda E_k^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f\|_{L_q(D)} \\ &+ \|\mathcal{D}^\lambda E_k^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f - \mathcal{U}_{k, 0}^{d, l-\epsilon-\lambda, 0, D, \alpha} \mathcal{D}^\lambda f\|_{L_q(D)}. \end{aligned} \quad (5.1.9)$$

Оценку первого слагаемого в правой части (5.1.9) даёт (1.3.63). А для оценки второго слагаемого в правой части (5.1.9), учитывая (1.3.23) и тот факт, что ввиду (1.2.4) выполняется равенство

$$\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d, m, D}} (\mathcal{D}^\mu g_{\kappa, \nu}^{d, m})|_D = \begin{cases} 1, & \text{при } \mu = 0; \\ 0, & \text{при } \mu \in \mathbb{Z}_+^d(m) \setminus \{0\}, \end{cases}$$

имеем

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}^\lambda E_k^{d, l-\epsilon, m, D, \alpha} f - \mathcal{U}_{k, 0}^{d, l-\epsilon-\lambda, 0, D, \alpha} \mathcal{D}^\lambda f\|_{L_q(D)} &= \\ \|\mathcal{D}^\lambda (E_k^{d, l-\epsilon, m, D} f) - \mathcal{U}_{k, 0}^{d, l-\epsilon-\lambda, 0, D, \alpha} \mathcal{D}^\lambda f\|_{L_q(D)} &= \\ \|\mathcal{D}^\lambda (\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d, m, D}} (S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d, l-\epsilon} f) g_{\kappa, \nu}^{d, m}) - \mathcal{U}_{k, 0}^{d, l-\epsilon-\lambda, 0, D, \alpha} \mathcal{D}^\lambda f\|_{L_q(D)} &= \\ \|\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d, m, D}} \mathcal{D}^\lambda ((S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d, l-\epsilon} f) g_{\kappa, \nu}^{d, m}) - \mathcal{U}_{k, 0}^{d, l-\epsilon-\lambda, 0, D, \alpha} \mathcal{D}^\lambda f\|_{L_q(D)} &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \left\| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_{\lambda}^{\mu} (\mathcal{D}^{\mu} (S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} - \mathcal{U}_{k,0}^{d,l-\epsilon-\lambda,0,D,\alpha} \mathcal{D}^{\lambda} f \right\|_{L_q(D)} = \\
& \left\| \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_{\lambda}^{\mu} \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} (\mathcal{D}^{\mu} (S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} - \mathcal{U}_{k,0}^{d,l-\epsilon-\lambda,0,D,\alpha} \mathcal{D}^{\lambda} f \right\|_{L_q(D)} = \\
& \left\| \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_{\lambda}^{\mu} \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} (\mathcal{D}^{\mu} (S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} - \right. \\
& \left. \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_{\lambda}^{\mu} (\mathcal{U}_{k,0}^{d,l-\epsilon-\mu,0,D,\alpha} \mathcal{D}^{\mu} f) \left(\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right) \right\|_{L_q(D)} = \\
& \left\| \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_{\lambda}^{\mu} \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} (\mathcal{D}^{\mu} (S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} - \right. \\
& \left. \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_{\lambda}^{\mu} \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} (\mathcal{U}_{k,0}^{d,l-\epsilon-\mu,0,D,\alpha} \mathcal{D}^{\mu} f) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right\|_{L_q(D)} = \\
& \left\| \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_{\lambda}^{\mu} \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} (\mathcal{D}^{\mu} (S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - (\mathcal{U}_{k,0}^{d,l-\epsilon-\mu,0,D,\alpha} \mathcal{D}^{\mu} f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right\|_{L_q(D)} \leq \\
& \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_{\lambda}^{\mu} \left\| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} (\mathcal{D}^{\mu} (S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - (\mathcal{U}_{k,0}^{d,l-\epsilon-\mu,0,D,\alpha} \mathcal{D}^{\mu} f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right\|_{L_q(D)}.
\end{aligned} \tag{5.1.10}$$

Для проведения оценки правой части (5.1.10) заметим, что в силу (5.1.3) справедливо равенство

$$\begin{aligned}
\mathcal{U}_{k,0}^{d,l-\epsilon-\mu,0,D,\alpha} \mathcal{D}^{\mu} f &= \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,D}} (S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon-\mu,0} ((\mathcal{D}^{\mu} f) |_{Q_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^d})) \chi_{\kappa, \nu}^d = \\
& \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,D}} (\mathcal{D}^{\mu} S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon,\mu} (f |_{Q_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^d})) \chi_{\kappa, \nu}^d = \mathcal{U}_{k,\mu}^{d,l-\epsilon,\mu,D,\alpha} f, \mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda),
\end{aligned} \tag{5.1.11}$$

и имеет место соотношение

$$D = \cup_{\nu \in N_{\kappa}^{d,D}} (D \cap \overline{Q}_{\kappa, \nu}^d) = (\cup_{\nu \in N_{\kappa}^{d,D}} (D \cap Q_{\kappa, \nu}^d)) \cup A_{\kappa}^D \subset (\cup_{\nu \in N_{\kappa}^{d,D}} Q_{\kappa, \nu}^d) \cup A_{\kappa}^D, \tag{5.1.12}$$

причем множества в правой части (5.1.12) попарно не пересекаются и $\text{mes } A_{\kappa}^D = 0$. Принимая во внимание (5.1.11), (5.1.12), при $\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)$ выводим

$$\left\| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,m,D}} (\mathcal{D}^{\mu} (S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - (\mathcal{U}_{k,0}^{d,l-\epsilon-\mu,0,D,\alpha} \mathcal{D}^{\mu} f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa, \nu}^{d,m} \right\|_{L_q(D)}^q =$$

$$\begin{aligned}
& \int_D \left| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} (\mathcal{D}^\mu(S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - (\mathcal{U}_{k,\mu}^{d,l-\epsilon,\mu,D,\alpha} f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right|^q dx \leq \\
& \int_{\bigcup_{n \in N_\kappa^{d,D}} Q_{\kappa,n}^d} \left| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} (\mathcal{D}^\mu(S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - (\mathcal{U}_{k,\mu}^{d,l-\epsilon,\mu,D,\alpha} f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right|^q dx = \\
& \sum_{n \in N_\kappa^{d,D}} \int_{Q_{\kappa,n}^d} \left| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} (\mathcal{D}^\mu(S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - (\mathcal{U}_{k,\mu}^{d,l-\epsilon,\mu,D,\alpha} f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right|^q dx = \\
& \sum_{n \in N_\kappa^{d,D}} \int_{Q_{\kappa,n}^d} \left| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} (\mathcal{D}^\mu(S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - \mathcal{D}^\mu(S_{\kappa,\nu_\kappa^D(n)}^{d,l-\epsilon,\mu} f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right|^q dx = \\
& \sum_{n \in N_\kappa^{d,D}} \int_{Q_{\kappa,n}^d} \left| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D} : Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset} (\mathcal{D}^\mu(S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - \mathcal{D}^\mu(S_{\kappa,\nu_\kappa^D(n)}^{d,l-\epsilon,\mu} f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right|^q dx = \\
& \sum_{n \in N_\kappa^{d,D}} \left\| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D} : Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset} (\mathcal{D}^\mu(S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - \mathcal{D}^\mu(S_{\kappa,\nu_\kappa^D(n)}^{d,l-\epsilon,\mu} f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)}^q \leq \\
& \sum_{n \in N_\kappa^{d,D}} \left(\sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D} : Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset} \left\| (\mathcal{D}^\mu(S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - \mathcal{D}^\mu(S_{\kappa,\nu_\kappa^D(n)}^{d,l-\epsilon,\mu} f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)} \right)^q.
\end{aligned} \tag{5.1.13}$$

Используя (1.2.5), (1.1.1), для $\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)$, $n \in N_\kappa^{d,D}$, $\nu \in N_\kappa^{d,m,D} : Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset$, находим, что

$$\begin{aligned}
& \|(\mathcal{D}^\mu(S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - \mathcal{D}^\mu(S_{\kappa,\nu_\kappa^D(n)}^{d,l-\epsilon,\mu} f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m}\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)} \leq \\
& \|\mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m}\|_{L_\infty(\mathbb{R}^d)} \|\mathcal{D}^\mu((S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f) - (S_{\kappa,\nu_\kappa^D(n)}^{d,l-\epsilon,\mu} f))\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)} \leq \\
& c_5 2^{(\kappa,\lambda-\mu)} c_6 2^{(\kappa,\mu+p^{-1}\epsilon-q^{-1}\epsilon)} \|S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f - S_{\kappa,\nu_\kappa^D(n)}^{d,l-\epsilon,\mu} f\|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)} = \\
& c_7 2^{(\kappa,\lambda+p^{-1}\epsilon-q^{-1}\epsilon)} \|S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f - S_{\kappa,\nu_\kappa^D(n)}^{d,l-\epsilon,\mu} f\|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)}. \tag{5.1.14}
\end{aligned}$$

Оценим норму в правой части (5.1.14). Фиксировав $n \in N_\kappa^{d,D}$, $\nu \in N_\kappa^{d,m,D} : Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset$, для $Q_{\kappa,\nu_\kappa^D(n)}^d \subset D$ и $Q_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^d \subset D$ выберем последовательности $\nu^\iota \in \mathbb{Z}^d$, $j^\iota \in \mathcal{N}_{1,d}^1$, $\epsilon^\iota \in \{-1, 1\}$, $\iota = 0, \dots, \mathfrak{J}$, для которых $\nu^0 = \nu_\kappa^D(\nu)$, $\nu^\mathfrak{J} = \nu_\kappa^D(n)$ и соблюдаются соотношения (1.3.31), (1.3.32), (1.3.33). Тогда

$$\begin{aligned}
& \|S_{\kappa,\nu_\kappa^D(\nu)}^{d,l-\epsilon} f - S_{\kappa,\nu_\kappa^D(n)}^{d,l-\epsilon,\mu} f\|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)} = \|S_{\kappa,\nu^0}^{d,l-\epsilon} f - S_{\kappa,\nu^\mathfrak{J}}^{d,l-\epsilon,\mu} f\|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)} = \\
& \|S_{\kappa,\nu^0}^{d,l-\epsilon} f - \sum_{\iota=1}^{\mathfrak{J}} (S_{\kappa,\nu^\iota}^{d,l-\epsilon} f - S_{\kappa,\nu^\iota}^{d,l-\epsilon} f) - S_{\kappa,\nu^\mathfrak{J}}^{d,l-\epsilon,\mu} f\|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)} =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \left\| \sum_{\iota=0}^{\mathfrak{J}-1} (S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l-\epsilon} f) + S_{\kappa, \nu^{\mathfrak{J}}}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa, \nu_\kappa^D(n)}^{d, l-\epsilon, \mu} f \right\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} \leq \\
& \sum_{\iota=0}^{\mathfrak{J}-1} \|S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} + \|S_{\kappa, \nu^{\mathfrak{J}}}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa, \nu_\kappa^D(n)}^{d, l-\epsilon, \mu} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)}. \quad (5.1.15)
\end{aligned}$$

Для проведения оценки слагаемых в правой части (5.1.15) приведем некоторые полезные для нас факты. Прежде всего, заметим, что $N_\kappa^{d, D} \subset N_\kappa^{d, m, D} \cap \{\nu' \in \mathbb{Z}^d : Q_{\kappa, \nu'}^d \cap G_\kappa^{d, m, D} \neq \emptyset\}$ (см. п. 1.3.). С учетом этого замечания отметим, что вследствие (1.3.31), (1.3.13), (1.3.12) имеет место оценка

$$\begin{aligned}
\mathfrak{J} & \leq c_8 \|\nu^0 - \nu^{\mathfrak{J}}\|_{l_\infty^d} = c_8 \|\nu_\kappa^D(\nu) - \nu_\kappa^D(n)\|_{l_\infty^d} \leq \\
& c_8 (\|\nu_\kappa^D(\nu) - n\|_{l_\infty^d} + \|n - \nu_\kappa^D(n)\|_{l_\infty^d}) \leq \\
& c_8 (\|\gamma^1\|_{l_\infty^d} + c_9) = c_{10}(d, m, D, \alpha). \quad (5.1.16)
\end{aligned}$$

Далее, при $\iota = 0, \dots, \mathfrak{J}, j = 1, \dots, d$ для $x \in \overline{Q}_{\kappa, \nu^\iota}^d$, используя (5.1.16), (1.3.32) и (1.3.13), заключаем, что справедливо неравенство

$$\begin{aligned}
|x_j - 2^{-\kappa_j} n_j| & \leq |x_j - 2^{-\kappa_j}(\nu^\iota)_j| + |2^{-\kappa_j}(\nu^\iota)_j - 2^{-\kappa_j} n_j| \leq \\
2^{-\kappa_j} + |2^{-\kappa_j}(\nu^\iota)_j - 2^{-\kappa_j} n_j| & = 2^{-\kappa_j} + |2^{-\kappa_j}(\nu^\iota)_j - \sum_{i=0}^{\iota-1} (2^{-\kappa_j}(\nu^i)_j - 2^{-\kappa_j}(\nu^{i+1})_j) - 2^{-\kappa_j} n_j| = \\
2^{-\kappa_j} + \left| \sum_{i=0}^{\iota-1} (2^{-\kappa_j}(\nu^{i+1})_j - 2^{-\kappa_j}(\nu^i)_j) + 2^{-\kappa_j}(\nu^0)_j - 2^{-\kappa_j} n_j \right| & \leq \\
2^{-\kappa_j} + \sum_{i=0}^{\iota-1} |2^{-\kappa_j}(\nu^{i+1})_j - 2^{-\kappa_j}(\nu^i)_j| + |2^{-\kappa_j}(\nu^0)_j - 2^{-\kappa_j} n_j| & \leq \\
2^{-\kappa_j} + \sum_{i=0}^{\iota-1} 2^{-\kappa_j} \|\nu^{i+1} - \nu^i\|_{l_\infty^d} + |2^{-\kappa_j}(\nu^0)_j - 2^{-\kappa_j} n_j| & = \\
2^{-\kappa_j} + \sum_{i=0}^{\iota-1} 2^{-\kappa_j} \|\epsilon^i e_{ji}\|_{l_\infty^d} + |2^{-\kappa_j}(\nu_\kappa^D(\nu))_j - 2^{-\kappa_j} n_j| & = \\
2^{-\kappa_j} + \sum_{i=0}^{\iota-1} 2^{-\kappa_j} + |2^{-\kappa_j}(\nu_\kappa^D(\nu))_j - 2^{-\kappa_j} n_j| & = \\
2^{-\kappa_j}(\iota + 1) + |2^{-\kappa_j}(\nu_\kappa^D(\nu))_j - 2^{-\kappa_j} n_j| & \leq \\
2^{-\kappa_j}(\mathfrak{J} + 1) + \gamma_j^1 2^{-\kappa_j} \leq 2^{-\kappa_j}(c_{10} + 1) + \gamma_j^1 2^{-\kappa_j} = \gamma_j^2 2^{-\kappa_j}.
\end{aligned}$$

Отсюда, учитывая (1.3.33), видим, что существует вектор $\gamma^2(d, m, D, \alpha) \in \mathbb{R}_+^d$ такой, что для

$$\mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha} = 2^{-\kappa} n + \gamma^2 2^{-\kappa} B^d, n \in N_{\kappa}^{d, D},$$

соблюдается включение

$$Q_{\kappa, \nu^\iota}^d \cup Q_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^d \subset Q^\iota \subset D \cap \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}, \iota = 0, \dots, \mathfrak{J} - 1. \quad (5.1.17)$$

Из приведенного определения с учетом того, что $\gamma^2 > \mathfrak{e}$, следует, что при $n \in N_{\kappa}^{d, D}$ верно включение

$$Q_{\kappa, n}^d \subset \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}, \quad (5.1.18)$$

а из (5.1.17), (5.1.18) вытекает, что

$$Q_{\kappa, n}^d \subset (2^{-\kappa} \nu^\iota + (\gamma^2 + \mathfrak{e}) 2^{-\kappa} B^d), \iota = 0, \dots, \mathfrak{J}. \quad (5.1.19)$$

Учитывая (5.1.18), нетрудно видеть, что существует константа $c_{11}(d, m, D, \alpha) > 0$ такая, что для каждого $x \in \mathbb{R}^d$ число

$$\text{card}\{n \in N_{\kappa}^{d, D} : x \in \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}\} \leq c_{11}. \quad (5.1.20)$$

Принимая во внимание, что в силу (1.3.32), (1.3.33) при $\iota = 0, \dots, \mathfrak{J} - 1$ выполняется равенство

$$Q^\iota = \begin{cases} 2^{-\kappa} \nu^\iota + 2^{-(\kappa - e_{j^\iota})} I^d, & \text{при } \epsilon^\iota = 1; \\ 2^{-\kappa} \nu^{\iota+1} + 2^{-(\kappa - e_{j^\iota})} I^d, & \text{при } \epsilon^\iota = -1, \end{cases}$$

определим линейный оператор $S^\iota : L_1(Q^\iota) \mapsto \mathcal{P}^{d, l - \mathfrak{e}}$, полагая

$$S^\iota = P_{\delta, x^0}^{d, l - \mathfrak{e}}$$

при $\delta = 2^{-(\kappa - e_{j^\iota})}$,

$$x^0 = \begin{cases} 2^{-\kappa} \nu^\iota, & \text{при } \epsilon^\iota = 1; \\ 2^{-\kappa} \nu^{\iota+1}, & \text{при } \epsilon^\iota = -1, \end{cases} \quad \iota = 0, \dots, \mathfrak{J} - 1.$$

Теперь проведем оценку слагаемых в правой части (5.1.15). При $\iota = 0, \dots, \mathfrak{J} - 1$, благодаря (5.1.19) применяя (1.1.1), а затем используя (1.1.2), (1.1.3), (5.1.17), и, наконец, пользуясь (1.1.4) и учитывая (5.1.17), приходим к неравенству

$$\|S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l - \mathfrak{e}} f - S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l - \mathfrak{e}} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} =$$

$$\begin{aligned}
& \|S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l-\epsilon} f - S^\iota f + S^\iota f - S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} \leq \\
& \|S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l-\epsilon} f - S^\iota f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} + \|S^\iota f - S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} \leq \\
& c_{12} \|S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l-\epsilon} f - S^\iota f\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^\iota}^d)} + c_{12} \|S^\iota f - S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^d)} = \\
& c_{12} \|S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l-\epsilon} (f - S^\iota f)\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^\iota}^d)} + c_{12} \|S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l-\epsilon} (f - S^\iota f)\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^d)} \leq \\
& c_{13} \|f - S^\iota f\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^\iota}^d)} + c_{13} \|f - S^\iota f\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^d)} \leq c_{14} \|f - S^\iota f\|_{L_p(Q^\iota)} \leq \\
& c_{15} \sum_{j=1}^d ((2^{-(\kappa - e_{j^\iota}))_j)^{-1/p} \left(\int_{(2^{-(\kappa - e_{j^\iota}))_j} B^1} \int_{Q_{l_j \xi e_j}^\iota} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \leq \\
& c_{16} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1} B^1} \int_{Q_{l_j \xi e_j}^\iota} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \leq \\
& c_{16} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1} B^1} \int_{(D \cap \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha})_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \leq \\
& c_{16} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p}. \quad (5.1.21)
\end{aligned}$$

Для оценки последнего слагаемого в правой части (5.1.15) при $\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)$, ввиду (5.1.19) используя (1.1.1), затем пользуясь (5.1.2), (5.1.1) и применяя (1.1.4), с учетом (5.1.17) получаем

$$\begin{aligned}
& \|S_{\kappa, \nu^3}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa, \nu_\kappa^D(n)}^{d, l-\epsilon, \mu} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} = \|S_{\kappa, \nu^3}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa, \nu^3}^{d, l-\epsilon, \mu} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} \leq \\
& c_{17} \|S_{\kappa, \nu^3}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa, \nu^3}^{d, l-\epsilon, \mu} f\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^3}^d)} = c_{17} \|S_{\kappa, \nu^3}^{d, l-\epsilon, \mu} (f - S_{\kappa, \nu^3}^{d, l-\epsilon} f)\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^3}^d)} \leq \\
& c_{18} \|f - S_{\kappa, \nu^3}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^3}^d)} \leq c_{19} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j} B^1} \int_{(Q_{\kappa, \nu^3}^d)_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \leq \\
& c_{19} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j} B^1} \int_{(D \cap \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha})_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \leq \\
& c_{19} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, m, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p}. \quad (5.1.22)
\end{aligned}$$

Объединяя (5.1.15), (5.1.21), (5.1.22) и учитывая (5.1.16), при $\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)$, $n \in N_{\kappa}^{d, D}$, $\nu \in N_{\kappa}^{d, m, D} : Q_{\kappa, n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa, \nu}^{d, m} \neq \emptyset$, имеем

$$\|S_{\kappa, \nu_\kappa^D(\nu)}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa, \nu_\kappa^D(n)}^{d, l-\epsilon, \mu} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} \leq$$

$$\begin{aligned}
& \mathfrak{J} c_{16} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap \mathfrak{D}_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} + \\
& c_{19} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap \mathfrak{D}_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \leq \\
& c_{10} c_{16} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap \mathfrak{D}_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} + \\
& c_{19} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap \mathfrak{D}_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} = \\
& c_{20} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap \mathfrak{D}_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p}.
\end{aligned}$$

Подставляя эту оценку в (5.1.14), для $\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)$, $n \in N_\kappa^{d,D}$, $\nu \in N_\kappa^{d,m,D}$: $Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset$, получаем неравенство

$$\begin{aligned}
& \|(\mathcal{D}^\mu(S_{\kappa,\nu_\kappa^D}^{d,l-\epsilon} f) - \mathcal{D}^\mu(S_{\kappa,\nu_\kappa^D}^{d,l-\epsilon,\mu} f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m}\|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)} \leq \\
& c_{21} 2^{(\kappa,\lambda+p^{-1}\epsilon-q^{-1}\epsilon)} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap \mathfrak{D}_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p}.
\end{aligned} \tag{5.1.23}$$

Соединяя (5.1.13) с (5.1.23), и учитывая (1.3.17), а затем применяя неравенство Гёльдера с показателем q и неравенство Гёльдера с показателем $p/q \leq 1$, и, наконец, принимая во внимание (5.1.20) и используя неравенство Гёльдера с показателем $1/q$, при $\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)$ выводим

$$\begin{aligned}
& \left\| \sum_{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}} (\mathcal{D}^\mu(S_{\kappa,\nu_\kappa^D}^{d,l-\epsilon} f) - (\mathcal{U}_{\kappa,0}^{d,l-\epsilon-\mu,0,D,\alpha} \mathcal{D}^\mu f)) \mathcal{D}^{\lambda-\mu} g_{\kappa,\nu}^{d,m} \right\|_{L_q(D)}^q \leq \\
& \sum_{n \in N_\kappa^{d,D}} \left(\sum_{\substack{\nu \in N_\kappa^{d,m,D}: \\ Q_{\kappa,n}^d \cap \text{supp } g_{\kappa,\nu}^{d,m} \neq \emptyset}} c_{21} 2^{(\kappa,\lambda+p^{-1}\epsilon-q^{-1}\epsilon)} \times \right. \\
& \left. \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap \mathfrak{D}_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \right)^q \leq \\
& \sum_{n \in N_\kappa^{d,D}} (c_{22} c_{21} 2^{(\kappa,\lambda+p^{-1}\epsilon-q^{-1}\epsilon)} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap \mathfrak{D}_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p})^q =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (c_{23}2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \sum_{n \in N_\kappa^{d,D}} \left(\sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1}B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap \mathfrak{D}_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \right)^q \leq \\
& (c_{24}2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \sum_{n \in N_\kappa^{d,D}} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j q/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1}B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap \mathfrak{D}_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} = \\
& (c_{24}2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j q/p} \sum_{n \in N_\kappa^{d,D}} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1}B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap \mathfrak{D}_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} \leq \\
& (c_{24}2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j q/p} \left(\sum_{n \in N_\kappa^{d,D}} \int_{2^{-\kappa_j+1}B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap \mathfrak{D}_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} = \\
& (c_{24}2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j q/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1}B^1} \sum_{n \in N_\kappa^{d,D}} \int_{D_{l_j \xi e_j}} \chi_{\mathfrak{D}_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}}(x) |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} = \\
& (c_{24}2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j q/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1}B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j}} \left(\sum_{n \in N_\kappa^{d,D}} \chi_{\mathfrak{D}_{\kappa,n}^{d,m,D,\alpha}}(x) \right) |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} \leq \\
& (c_{24}2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j q/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1}B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j}} c_{11} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} \leq \\
& (c_{25}2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \left(\sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1}B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \right)^q = \\
& (c_{25}2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1}B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \leq \\
& \left(c_{25}2^{k(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)} \sum_{j=1}^d 2^{k/(\alpha_j p)} \left(\int_{42^{-k/\alpha_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \right)^q \leq \\
& (c_{26}2^{k(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)})^q \sum_{j=1}^d \Omega_j^{l_j}(f, 42^{-k/\alpha_j})_{L_p(D)}^q. \quad (5.1.24)
\end{aligned}$$

Используя (5.1.24) при оценке правой части (5.1.10), приходим к неравенству

$$\begin{aligned}
& \|\mathcal{D}^\lambda E_k^{d,l-\epsilon,m,D,\alpha} f - \mathcal{U}_{k,0}^{d,l-\epsilon-\lambda,0,D,\alpha} \mathcal{D}^\lambda f\|_{L_q(D)} \leq \\
& \sum_{\mu \in \mathbb{Z}_+^d(\lambda)} C_\lambda^\mu c_{26} 2^{k(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon)} \sum_{j=1}^d \Omega_j^{l_j}(f, 42^{-k/\alpha_j})_{L_p(D)} \leq
\end{aligned}$$

$$c_{27} 2^{-k(1-(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon))}. \quad (5.1.25)$$

Соединяя (5.1.9) с (1.3.63) и (5.1.25), получаем (5.1.8) при $p \leq q$. Неравенство (5.1.8) при $q < p$ вытекает из неравенства (5.1.8) при $q = p$ и того факта, что при $q < p$ для $h \in L_p(D)$ и ограниченной области D справедливо неравенство $\|h\|_{L_q(D)} \leq c_{28} \|h\|_{L_p(D)}$. $\square$

Непосредственным следствием леммы 5.1.3 является одно из утверждений леммы 5.1.4, для формулировки которой потребуются следующие обозначения.

Для $d \in \mathbb{N}$, $l \in \mathbb{Z}_+^d$, $\alpha \in \mathbb{R}_+^d$, ограниченной области D в $\mathbb{R}^d$ при $k \in \mathbb{Z}_+$, для которого при $\kappa = \kappa(k, \alpha)$, $\kappa' = \kappa(k-1, \alpha)$ существуют $\nu \in \mathbb{Z}^d$: $Q_{\kappa, \nu}^d \subset D$, и $\nu' \in \mathbb{Z}^d$: $Q_{\kappa', \nu'}^d \subset D$, с учетом (5.1.5) определим непрерывный линейный оператор $V_k^{d, l, D, \alpha} : L_1(D) \mapsto \mathcal{P}_k^{d, l, D, \alpha} \cap L_\infty(\mathbb{R}^d)$ равенством

$$V_k^{d, l, D, \alpha} = \mathcal{U}_{k, 0}^{d, l, 0, D, \alpha} - \left(\sum_{\nu \in N_\kappa^{d, D}} \chi_{\kappa, \nu}^d \right) \mathcal{U}_{k-1, 0}^{d, l, 0, D, \alpha}.$$

Лемма 5.1.4

В условиях леммы 5.1.3 существует константа $c_{29}(d, \alpha, D, \lambda, p, q) > 0$ такая, что для $f \in (\mathcal{H}_p^\alpha)'(D)$:

1) в $L_q(D)$ имеет место равенство

$$\mathcal{D}^\lambda f = (\mathcal{U}_{K^0, 0}^{d, l - \epsilon - \lambda, 0, D, \alpha} \mathcal{D}^\lambda f) |_D + \sum_{k=K^0+1}^{\infty} (V_k^{d, l - \epsilon - \lambda, D, \alpha} (\mathcal{D}^\lambda f)) |_D, \quad (5.1.26)$$

и 2) при $k \in \mathbb{Z}_+ : k > K^0$, справедливо неравенство

$$\|V_k^{d, l - \epsilon - \lambda, D, \alpha} (\mathcal{D}^\lambda f)\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} \leq c_{29} 2^{-k(1-(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1})_+ \epsilon))}. \quad (5.1.27)$$

Доказательство.

Начнем с доказательства (5.1.26). При соблюдении условий леммы для $f \in (\mathcal{H}_p^\alpha)'(D)$, $\mathfrak{k} \in \mathbb{Z}_+ : \mathfrak{k} > K^0$ (K^0 см. в п. 1.3.), при $\kappa = \kappa(k, \alpha)$, $k \geq K^0$, с учетом того, что $\sum_{\nu \in N_\kappa^{d, D}} \chi_{\kappa, \nu}^d = 1$ почти всюду на D ,

в силу (5.1.8) выполняется соотношение

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}^\lambda f - ((\mathcal{U}_{K^0, 0}^{d, l - \epsilon - \lambda, 0, D, \alpha} \mathcal{D}^\lambda f) |_D + \sum_{k=K^0+1}^{\mathfrak{k}} (V_k^{d, l - \epsilon - \lambda, D, \alpha} (\mathcal{D}^\lambda f)) |_D)\|_{L_q(D)} = \\ \|\mathcal{D}^\lambda f - ((\mathcal{U}_{K^0, 0}^{d, l - \epsilon - \lambda, 0, D, \alpha} \mathcal{D}^\lambda f) |_D + \sum_{k=K^0+1}^{\mathfrak{k}} ((\mathcal{U}_{k, 0}^{d, l - \epsilon - \lambda, 0, D, \alpha} \mathcal{D}^\lambda f) |_D - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \left(\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,D}} \chi_{\kappa,\nu}^d \mid_D (\mathcal{U}_{k-1,0}^{d,l-\epsilon-\lambda,0,D,\alpha} \mathcal{D}^\lambda f) \mid_D \right) \|_{L_q(D)} = \\
& \| \mathcal{D}^\lambda f - ((\mathcal{U}_{K^0,0}^{d,l-\epsilon-\lambda,0,D,\alpha} \mathcal{D}^\lambda f) \mid_D + \sum_{k=K^0+1}^{\mathfrak{k}} ((\mathcal{U}_{k,0}^{d,l-\epsilon-\lambda,0,D,\alpha} \mathcal{D}^\lambda f) \mid_D - \\
& \quad (\mathcal{U}_{k-1,0}^{d,l-\epsilon-\lambda,0,D,\alpha} \mathcal{D}^\lambda f) \mid_D)) \|_{L_q(D)} = \\
& \| \mathcal{D}^\lambda f - (\mathcal{U}_{\mathfrak{k},0}^{d,l-\epsilon-\lambda,0,D,\alpha} \mathcal{D}^\lambda f) \mid_D \|_{L_q(D)} \leq c_4 2^{-\mathfrak{k}(1-(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1}) + \epsilon))} \rightarrow 0 \text{ при } \mathfrak{k} \rightarrow \infty,
\end{aligned}$$

т.е. справедливо (5.1.26).

Перейдем к выводу неравенства (5.1.27). В условиях леммы при $k \in \mathbb{Z}_+ : k > K^0, \kappa = \kappa(k, \alpha), \kappa' = \kappa(k-1, \alpha), \mathfrak{k} = \kappa - \kappa'$ для $f \in (\mathcal{H}_p^\alpha)'(D)$, учитывая (5.1.7), (5.1.3), имеем

$$\begin{aligned}
& \| V_k^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha} (\mathcal{D}^\lambda f) \|_{L_q(\mathbb{R}^d)}^q = \\
& \left\| (\mathcal{U}_{k,0}^{d,l-\epsilon-\lambda,0,D,\alpha} \mathcal{D}^\lambda f) - \left(\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,D}} \chi_{\kappa,\nu}^d (\mathcal{U}_{k-1,0}^{d,l-\epsilon-\lambda,0,D,\alpha} \mathcal{D}^\lambda f) \right) \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)}^q = \\
& \left\| \left(\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,D}} (S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon-\lambda,0} (\mathcal{D}^\lambda f)) \chi_{\kappa,\nu}^d \right) - \left(\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,D}} \chi_{\kappa,\nu}^d \left(\sum_{\nu' \in N_{\kappa'}^{d,D}} (S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu')}^{d,l-\epsilon-\lambda,0} (\mathcal{D}^\lambda f)) \chi_{\kappa',\nu'}^d \right) \right) \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)}^q = \\
& \left\| \left(\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,D}} (S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon-\lambda,0} (\mathcal{D}^\lambda f)) \chi_{\kappa,\nu}^d \right) - \left(\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,D}} (S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu')}^{d,l-\epsilon-\lambda,0} (\mathcal{D}^\lambda f)) \chi_{\kappa,\nu}^d \right) \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)}^q = \\
& \left\| \left(\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,D}} (\mathcal{D}^\lambda S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon,\lambda} f) \chi_{\kappa,\nu}^d \right) - \left(\sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,D}} (\mathcal{D}^\lambda S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu')}^{d,l-\epsilon,\lambda} f) \chi_{\kappa,\nu}^d \right) \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)}^q = \\
& \left\| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,D}} ((\mathcal{D}^\lambda S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon,\lambda} f) - (\mathcal{D}^\lambda S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu')}^{d,l-\epsilon,\lambda} f)) \chi_{\kappa,\nu}^d \right\|_{L_q(\mathbb{R}^d)}^q = \\
& \int_{\bigcup_{n \in N_{\kappa}^{d,D}} Q_{\kappa,n}^d} \left| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,D}} ((\mathcal{D}^\lambda S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon,\lambda} f) - (\mathcal{D}^\lambda S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu')}^{d,l-\epsilon,\lambda} f)) \chi_{\kappa,\nu}^d \right|^q dx = \\
& \sum_{n \in N_{\kappa}^{d,D}} \int_{Q_{\kappa,n}^d} \left| \sum_{\nu \in N_{\kappa}^{d,D}} ((\mathcal{D}^\lambda S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(\nu)}^{d,l-\epsilon,\lambda} f) - (\mathcal{D}^\lambda S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu')}^{d,l-\epsilon,\lambda} f)) \chi_{\kappa,\nu}^d \right|^q dx = \\
& \sum_{n \in N_{\kappa}^{d,D}} \int_{Q_{\kappa,n}^d} \left| ((\mathcal{D}^\lambda S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(n)}^{d,l-\epsilon,\lambda} f) - (\mathcal{D}^\lambda S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d,l-\epsilon,\lambda} f)) \chi_{\kappa,n}^d \right|^q dx = \\
& \sum_{n \in N_{\kappa}^{d,D}} \| (\mathcal{D}^\lambda S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(n)}^{d,l-\epsilon,\lambda} f) - (\mathcal{D}^\lambda S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d,l-\epsilon,\lambda} f) \|_{L_q(Q_{\kappa,n}^d)}^q. \quad (5.1.28)
\end{aligned}$$

Применение неравенства (1.1.1) для оценки слагаемых в правой части

(5.1.28) дает

$$\begin{aligned} & \|(\mathcal{D}^\lambda S_{\kappa, \nu_\kappa^D(n)}^{d, l-\epsilon, \lambda} f) - (\mathcal{D}^\lambda S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d, l-\epsilon, \lambda} f)\|_{L_q(Q_{\kappa, n}^d)} = \\ & \quad \|\mathcal{D}^\lambda (S_{\kappa, \nu_\kappa^D(n)}^{d, l-\epsilon, \lambda} f - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d, l-\epsilon, \lambda} f)\|_{L_q(Q_{\kappa, n}^d)} \leq \\ & c_{30} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)} \|S_{\kappa, \nu_\kappa^D(n)}^{d, l-\epsilon, \lambda} f - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d, l-\epsilon, \lambda} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)}, n \in N_\kappa^{d, D}. \end{aligned} \quad (5.1.29)$$

Для оценки правой части (5.1.29), замечая, что при $n \in N_\kappa^{d, D}$ справедливы включения

$$\begin{aligned} Q_{\kappa, \nu_\kappa^D(n)}^d \subset D \supset Q_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^d &= 2^{-\kappa'} \nu_{\kappa'}^D(\nu'(n)) + 2^{-\kappa'} I^d = \\ (2^{-\kappa} 2^\sharp \nu_{\kappa'}^D(\nu'(n)) + 2^{-\kappa'} I^d) &\supset (2^{-\kappa} 2^\sharp \nu_{\kappa'}^D(\nu'(n)) + 2^{-\kappa} I^d) = Q_{\kappa, 2^\sharp \nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^d, \end{aligned} \quad (5.1.30)$$

фиксируя произвольное $n \in N_\kappa^{d, D}$, выберем последовательности $\nu^\iota \in \mathbb{Z}^d, j^\iota \in \mathcal{N}_{1, d}^1, \epsilon^\iota \in \{-1, 1\}, \iota = 0, \dots, \mathfrak{J}$, для которых $\nu^0 = \nu_\kappa^D(n), \nu^\mathfrak{J} = 2^\sharp \nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))$ и соблюдаются соотношения (1.3.31), (1.3.32), (1.3.33). Тогда

$$\begin{aligned} & \|S_{\kappa, \nu_\kappa^D(n)}^{d, l-\epsilon, \lambda} f - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d, l-\epsilon, \lambda} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} = \|S_{\kappa, \nu^0}^{d, l-\epsilon, \lambda} f - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d, l-\epsilon, \lambda} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} = \\ & \|S_{\kappa, \nu^0}^{d, l-\epsilon, \lambda} f - \sum_{\iota=0}^{\mathfrak{J}} (S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l-\epsilon} f) - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d, l-\epsilon, \lambda} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} = \\ & \|S_{\kappa, \nu^0}^{d, l-\epsilon, \lambda} f - S_{\kappa, \nu^0}^{d, l-\epsilon} f + \sum_{\iota=0}^{\mathfrak{J}-1} (S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l-\epsilon} f) + S_{\kappa, \nu^\mathfrak{J}}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d, l-\epsilon, \lambda} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} \leq \\ & \|S_{\kappa, \nu^0}^{d, l-\epsilon, \lambda} f - S_{\kappa, \nu^0}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} + \sum_{\iota=0}^{\mathfrak{J}-1} \|S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} + \\ & \|S_{\kappa, \nu^\mathfrak{J}}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d, l-\epsilon, \lambda} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)}, n \in N_\kappa^{d, D}. \end{aligned} \quad (5.1.31)$$

Для проведения оценки слагаемых в правой части (5.1.31) отметим некоторые полезные для этого факты.

Сначала заметим, что при $n \in N_\kappa^{d, D}$ вследствие (1.3.12) (при $\nu'(n)$ вместо ν, κ' вместо κ), а также благодаря (5.1.6), (1.3.42), для $j = 1, \dots, d$ соблюдается неравенство

$$\begin{aligned} & |2^{-\kappa_j} 2^{\sharp j} (\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n)))_j - 2^{-\kappa_j} n_j| = |2^{-\kappa'_j} (\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n)))_j - 2^{-\kappa_j} n_j| = \\ & |2^{-\kappa'_j} (\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n)))_j - 2^{-\kappa'_j} (\nu'(n))_j + 2^{-\kappa'_j} (\nu'(n))_j - 2^{-\kappa_j} n_j| \leq \\ & |2^{-\kappa'_j} (\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n)))_j - 2^{-\kappa'_j} (\nu'(n))_j| + |2^{-\kappa'_j} (\nu'(n))_j - 2^{-\kappa_j} n_j| \leq \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& 2^{-\kappa'_j} \|\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n)) - \nu'(n)\|_{l_\infty^d} + |2^{-\kappa'_j}(\nu'(n))_j - 2^{-\kappa_j}n_j| \leq \\
& c_{31}2^{-\kappa'_j} + 2^{-\kappa'_j} = (c_{31} + 1)2^{\mathfrak{k}_j}2^{-\kappa_j} \leq (c_{31} + 1)2^{1+1/\alpha_j}2^{-\kappa_j} = \\
& \rho_j 2^{-\kappa_j} \leq \|\rho\|_{l_\infty^d} 2^{-\kappa_j}, \quad (5.1.32)
\end{aligned}$$

откуда для $x \in \overline{\mathcal{Q}}_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^d$ –

$$\begin{aligned}
|x_j - 2^{-\kappa_j}n_j| &= |x_j - 2^{-\kappa'_j}(\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n)))_j + 2^{-\kappa'_j}(\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n)))_j - 2^{-\kappa_j}n_j| \leq \\
& |x_j - 2^{-\kappa'_j}(\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n)))_j| + |2^{-\kappa'_j}(\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n)))_j - 2^{-\kappa_j}n_j| \leq \\
& 2^{-\kappa'_j} + \rho_j 2^{-\kappa_j} = (2^{\mathfrak{k}_j} + \rho_j)2^{-\kappa_j} \leq (2^{1+1/\alpha_j} + \rho_j)2^{-\kappa_j},
\end{aligned}$$

т.е.

$$Q_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^d \subset \overline{\mathcal{Q}}_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^d \subset (2^{-\kappa}n + (2^{\mathfrak{e}+\alpha^{-1}} + \rho)2^{-\kappa}B^d). \quad (5.1.33)$$

Отметим еще, что в силу (1.3.31), (1.3.32), (1.3.12) (при $\nu = n$), а также ввиду (5.1.32) при $n \in N_{\kappa}^{d,D}$ справедлива оценка

$$\begin{aligned}
\mathfrak{J} &\leq c_{32}\|\nu^0 - \nu^{\mathfrak{J}}\|_{l_\infty^d} = c_{32}\|\nu_{\kappa}^D(n) - 2^{\mathfrak{k}}\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))\|_{l_\infty^d} \leq \\
& c_{32}(\|\nu_{\kappa}^D(n) - n\|_{l_\infty^d} + \|n - 2^{\mathfrak{k}}\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))\|_{l_\infty^d}) \leq c_{32}(c_{33} + \|\rho\|_{l_\infty^d}) = c_{34}.
\end{aligned} \quad (5.1.34)$$

Далее, при $n \in N_{\kappa}^{d,D}$, $\iota = 0, \dots, \mathfrak{J}$, $j = 1, \dots, d$ для $x \in \overline{\mathcal{Q}}_{\kappa, \nu^\iota}^d$ ввиду (1.3.32), (5.1.34), (1.3.12) (при $\nu = n$) выполняется неравенство

$$\begin{aligned}
|x_j - 2^{-\kappa_j}n_j| &\leq |x_j - 2^{-\kappa_j}(\nu^\iota)_j| + |2^{-\kappa_j}(\nu^\iota)_j - 2^{-\kappa_j}n_j| \leq 2^{-\kappa_j} + |2^{-\kappa_j}(\nu^\iota)_j - 2^{-\kappa_j}n_j| = \\
& 2^{-\kappa_j} + |2^{-\kappa_j}(\nu^\iota)_j - \sum_{i=0}^{\iota-1} (2^{-\kappa_j}(\nu^i)_j - 2^{-\kappa_j}(\nu^i)_j) - 2^{-\kappa_j}n_j| = \\
& 2^{-\kappa_j} + \left| \sum_{i=0}^{\iota-1} (2^{-\kappa_j}(\nu^{i+1})_j - 2^{-\kappa_j}(\nu^i)_j) + 2^{-\kappa_j}(\nu^0)_j - 2^{-\kappa_j}n_j \right| \leq \\
& 2^{-\kappa_j} + \sum_{i=0}^{\iota-1} |2^{-\kappa_j}(\nu^{i+1})_j - 2^{-\kappa_j}(\nu^i)_j| + |2^{-\kappa_j}(\nu^0)_j - 2^{-\kappa_j}n_j| \leq \\
& 2^{-\kappa_j} + \sum_{i=0}^{\iota-1} 2^{-\kappa_j} \|\nu^{i+1} - \nu^i\|_{l_\infty^d} + |2^{-\kappa_j}(\nu^0)_j - 2^{-\kappa_j}n_j| = \\
& 2^{-\kappa_j} + \sum_{i=0}^{\iota-1} 2^{-\kappa_j} \|\epsilon^i e_{ji}\|_{l_\infty^d} + |2^{-\kappa_j}(\nu_{\kappa}^D(n))_j - 2^{-\kappa_j}n_j| =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2^{-\kappa_j} + \sum_{i=0}^{\iota-1} 2^{-\kappa_j} + |2^{-\kappa_j}(\nu_{\kappa}^D(n))_j - 2^{-\kappa_j}n_j| = \\
2^{-\kappa_j}(\iota + 1) + |2^{-\kappa_j}(\nu_{\kappa}^D(n))_j - 2^{-\kappa_j}n_j| \leq \\
2^{-\kappa_j}(\mathfrak{J} + 1) + 2^{-\kappa_j}\|\nu_{\kappa}^D(n) - n\|_{l_{\infty}^d} \leq 2^{-\kappa_j}(c_{34} + 1) + 2^{-\kappa_j}c_{35} = c_{36}2^{-\kappa_j},
\end{aligned}$$

т.е. имеет место включение

$$\overline{Q}_{\kappa, \nu^{\iota}}^d \subset (2^{-\kappa}n + c_{36}2^{-\kappa}B^d),$$

из которого следует (см. (1.3.33)), что

$$Q_{\kappa, \nu^{\iota}}^d \cup Q_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^d \subset Q^{\iota} \subset D \cap (2^{-\kappa}n + c_{36}2^{-\kappa}B^d), \iota = 0, \dots, \mathfrak{J} - 1. \quad (5.1.35)$$

Итак, задавая координаты вектора $\sigma \in \mathbb{R}_+^d$ соотношением $\sigma_j = \max(2^{1+1/\alpha_j} + \rho_j, c_{36})$, $j = 1, \dots, d$, и обозначая

$$\mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, D, \alpha} = 2^{-\kappa}n + \sigma 2^{-\kappa}B^d, n \in N_{\kappa}^{d, D},$$

в силу (5.1.35), (5.1.30), (5.1.33) имеем

$$Q_{\kappa, \nu^{\iota}}^d \cup Q_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^d \subset Q^{\iota} \subset D \cap \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, D, \alpha}, \iota = 0, \dots, \mathfrak{J} - 1. \quad (5.1.36)$$

$$Q_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D(\nu^{\iota}(n))}^d \subset D \cap \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, D, \alpha}, n \in N_{\kappa}^{d, D}. \quad (5.1.37)$$

Из приведенных определений с учетом того, что $\sigma > \mathfrak{e}$, видно, что при $n \in N_{\kappa}^{d, D}$ справедливо включение

$$Q_{\kappa, n}^d \subset \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, D, \alpha}, \quad (5.1.38)$$

а из (5.1.35) следует, что

$$Q_{\kappa, n}^d \subset (2^{-\kappa}\nu^{\iota} + (c_{36} + 1)2^{-\kappa}B^d), \iota = 0, \dots, \mathfrak{J}. \quad (5.1.39)$$

Учитывая (5.1.38), легко видеть, что существует константа $c_{37}(d, D, \alpha) > 0$ такая, что для каждого $x \in \mathbb{R}^d$ число

$$\text{card}\{n \in N_{\kappa}^{d, D} : x \in \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, D, \alpha}\} \leq c_{37}. \quad (5.1.40)$$

Принимая во внимание, что при $\iota = 0, \dots, \mathfrak{J} - 1$ в силу (1.3.33), (1.3.32) имеет место равенство

$$Q^{\iota} = \begin{cases} 2^{-\kappa}\nu^{\iota} + 2^{-(\kappa - e_{j^{\iota}})}I^d, & \text{при } \epsilon^{\iota} = 1; \\ 2^{-\kappa}\nu^{\iota+1} + 2^{-(\kappa - e_{j^{\iota}})}I^d, & \text{при } \epsilon^{\iota} = -1, \end{cases}$$

определим линейный оператор S^ι , полагая

$$S^\iota = P_{\delta, x^0}^{d, l-\epsilon}$$

при $\delta = 2^{-(\kappa - e_{j^\iota})}$,

$$x^0 = \begin{cases} 2^{-\kappa} \nu^\iota, & \text{при } \epsilon^\iota = 1; \\ 2^{-\kappa} \nu^{\iota+1}, & \text{при } \epsilon^\iota = -1, \end{cases} \quad \iota = 0, \dots, \mathfrak{J} - 1.$$

Теперь проведем оценку слагаемых в правой части (5.1.31). Оценивая первое слагаемое, согласно (1.1.1) с учетом (5.1.39), в силу (5.1.2), (5.1.1) и на основании (1.1.4), (5.1.36) выводим

$$\begin{aligned} \|S_{\kappa, \nu^0}^{d, l-\epsilon, \lambda} f - S_{\kappa, \nu^0}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} &\leq c_{38} \|S_{\kappa, \nu^0}^{d, l-\epsilon, \lambda} f - S_{\kappa, \nu^0}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^0}^d)} = \\ c_{38} \|S_{\kappa, \nu^0}^{d, l-\epsilon, \lambda} (f - S_{\kappa, \nu^0}^{d, l-\epsilon} f)\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^0}^d)} &\leq c_{39} \|f - S_{\kappa, \nu^0}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^0}^d)} \leq \\ c_{40} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j} B^1} \int_{(Q_{\kappa, \nu^0}^d)_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} &\leq \\ c_{40} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j} B^1} \int_{(D \cap \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, D, \alpha})_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} &\leq \\ c_{40} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, D, \alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p}. \end{aligned} \quad (5.1.41)$$

Далее, при $\iota = 0, \dots, \mathfrak{J} - 1$, благодаря (5.1.39) применяя (1.1.1), а затем используя (1.1.2), (1.1.3), (5.1.36), и, наконец, пользуясь (1.1.4) и учитывая (5.1.36), приходим к неравенству

$$\begin{aligned} \|S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l-\epsilon} f - S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} &= \|S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l-\epsilon} f - S^\iota f + S^\iota f - S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} \leq \\ \|S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l-\epsilon} f - S^\iota f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} + \|S^\iota f - S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, n}^d)} &\leq \\ c_{38} \|S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l-\epsilon} f - S^\iota f\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^\iota}^d)} + c_{38} \|S^\iota f - S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^d)} &= \\ c_{38} \|S_{\kappa, \nu^\iota}^{d, l-\epsilon} (f - S^\iota f)\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^\iota}^d)} + c_{38} \|S_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^{d, l-\epsilon} (f - S^\iota f)\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^d)} &\leq \\ c_{41} \|f - S^\iota f\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^\iota}^d)} + c_{41} \|f - S^\iota f\|_{L_p(Q_{\kappa, \nu^{\iota+1}}^d)} &\leq c_{42} \|f - S^\iota f\|_{L_p(Q^\iota)} \\ \leq c_{43} \sum_{j=1}^d ((2^{-(\kappa - e_{j^\iota})})_j)^{-1/p} \left(\int_{(2^{-(\kappa - e_{j^\iota})})_j B^1} \int_{Q_{l_j \xi e_j}^\iota} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} &\leq \\ c_{43} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1} B^1} \int_{Q_{l_j \xi e_j}^\iota} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} &\leq \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& c_{43} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1} B^1} \int_{(D \cap \mathfrak{D}'_{\kappa,n}{}^{d,D,\alpha})_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \leq \\
& c_{43} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap \mathfrak{D}'_{\kappa,n}{}^{d,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p}. \quad (5.1.42)
\end{aligned}$$

Для оценки последнего слагаемого в правой части (5.1.31), ввиду (5.1.39) используя (1.1.1), затем принимая во внимание (5.1.30), пользуясь (1.1.2), (5.1.2), (1.1.3), (5.1.1), применяя (1.1.4), с учетом (5.1.37) получаем

$$\begin{aligned}
& \|S_{\kappa,\nu\mathfrak{A}}^{d,l-\epsilon} f - S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d,l-\epsilon,\lambda} f\|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)} \leq c_{38} \|S_{\kappa,\nu\mathfrak{A}}^{d,l-\epsilon} f - S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d,l-\epsilon,\lambda} f\|_{L_p(Q_{\kappa,\nu\mathfrak{A}}^d)} \leq \\
& c_{38} \|S_{\kappa,\nu\mathfrak{A}}^{d,l-\epsilon} f - S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d,l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa,\nu\mathfrak{A}}^d)} + c_{38} \|S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d,l-\epsilon} f - S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d,l-\epsilon,\lambda} f\|_{L_p(Q_{\kappa,\nu\mathfrak{A}}^d)} \leq \\
& c_{38} \|S_{\kappa,\nu\mathfrak{A}}^{d,l-\epsilon} f - S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d,l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa,\nu\mathfrak{A}}^d)} + c_{38} \|S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d,l-\epsilon} f - S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d,l-\epsilon,\lambda} f\|_{L_p(Q_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^d)} = \\
& c_{38} \|S_{\kappa,\nu\mathfrak{A}}^{d,l-\epsilon} (f - S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d,l-\epsilon} f)\|_{L_p(Q_{\kappa,\nu\mathfrak{A}}^d)} + c_{38} \|S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d,l-\epsilon,\lambda} (S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d,l-\epsilon} f - f)\|_{L_p(Q_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^d)} \leq \\
& c_{44} \|f - S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d,l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa,\nu\mathfrak{A}}^d)} + c_{45} \|S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d,l-\epsilon} f - f\|_{L_p(Q_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^d)} \leq \\
& c_{46} \|f - S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d,l-\epsilon} f\|_{L_p(Q_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^d)} \leq \\
& c_{47} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa'_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa'_j} B^1} \int_{(Q_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^d)_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \leq \\
& c_{47} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{48} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{(D \cap \mathfrak{D}'_{\kappa,n}{}^{d,D,\alpha})_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \leq \\
& c_{47} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{48} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap \mathfrak{D}'_{\kappa,n}{}^{d,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p}, \quad (5.1.43)
\end{aligned}$$

где $c_{48} = \max_{j=1,\dots,d} 2^{1+1/\alpha_j} > 2$. Объединяя (5.1.31), (5.1.41), (5.1.42), (5.1.43) и учитывая (5.1.34), при $n \in N_{\kappa}^{d,D}$ имеем

$$\begin{aligned}
& \|S_{\kappa,\nu_{\kappa}^D(n)}^{d,l-\epsilon,\lambda} f - S_{\kappa',\nu_{\kappa'}^D(\nu'(n))}^{d,l-\epsilon,\lambda} f\|_{L_p(Q_{\kappa,n}^d)} \leq \\
& c_{40} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap \mathfrak{D}'_{\kappa,n}{}^{d,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} + \\
& \mathfrak{J} c_{43} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{2^{-\kappa_j+1} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap \mathfrak{D}'_{\kappa,n}{}^{d,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} +
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& c_{47} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{48} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi_{e_j}} \cap \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, D, \alpha}} |\Delta_{\xi_{e_j}}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \leq \\
& c_{40} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{48} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi_{e_j}} \cap \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, D, \alpha}} |\Delta_{\xi_{e_j}}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} + \\
& c_{34} c_{43} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{48} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi_{e_j}} \cap \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, D, \alpha}} |\Delta_{\xi_{e_j}}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} + \\
& c_{47} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{48} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi_{e_j}} \cap \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, D, \alpha}} |\Delta_{\xi_{e_j}}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} = \\
& c_{49} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{48} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi_{e_j}} \cap \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, D, \alpha}} |\Delta_{\xi_{e_j}}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p}. \quad (5.1.44)
\end{aligned}$$

Обращаясь к (5.1.29) и (5.1.44), заключаем, что при $n \in N_{\kappa}^{d, D}$ выполняется неравенство

$$\begin{aligned}
& \|(\mathcal{D}^{\lambda} S_{\kappa, \nu_{\kappa}^D}^{d, l-\epsilon, \lambda} f) - (\mathcal{D}^{\lambda} S_{\kappa', \nu_{\kappa'}^D}^{d, l-\epsilon, \lambda} f)\|_{L_q(Q_{\kappa, n}^d)} \leq \\
& c_{50} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{48} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi_{e_j}} \cap \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, D, \alpha}} |\Delta_{\xi_{e_j}}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p}.
\end{aligned}$$

Подставляя эту оценку в (5.1.28) и применяя неравенство Гёльдера с показателем q и неравенство Гёльдера с показателем $p/q \leq 1$, и, наконец, принимая во внимание (5.1.40) и используя неравенство Гёльдера с показателем $1/q$, получаем

$$\begin{aligned}
& \|V_k^{d, l-\epsilon-\lambda, D, \alpha}(\mathcal{D}^{\lambda} f)\|_{L_q(\mathbb{R}^d)}^q \leq \\
& \sum_{n \in N_{\kappa}^{d, D}} \left(c_{50} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{48} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi_{e_j}} \cap \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, D, \alpha}} |\Delta_{\xi_{e_j}}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \right)^q = \\
& (c_{50} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \sum_{n \in N_{\kappa}^{d, D}} \left(\sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{48} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi_{e_j}} \cap \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, D, \alpha}} |\Delta_{\xi_{e_j}}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \right)^q \leq \\
& (c_{51} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \sum_{n \in N_{\kappa}^{d, D}} \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j q/p} \left(\int_{c_{48} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi_{e_j}} \cap \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, D, \alpha}} |\Delta_{\xi_{e_j}}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} = \\
& (c_{51} 2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\epsilon - q^{-1}\epsilon)})^q \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j q/p} \sum_{n \in N_{\kappa}^{d, D}} \left(\int_{c_{48} 2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi_{e_j}} \cap \mathfrak{D}_{\kappa, n}^{d, D, \alpha}} |\Delta_{\xi_{e_j}}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} \leq
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (c_{51}2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\mathfrak{e} - q^{-1}\mathfrak{e})})^q \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j q/p} \left(\sum_{n \in N_{\kappa}^{d,D}} \int_{c_{48}2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j} \cap \mathfrak{D}_{\kappa,n}^{d,D,\alpha}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} = \\
& (c_{51}2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\mathfrak{e} - q^{-1}\mathfrak{e})})^q \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j q/p} \left(\int_{c_{48}2^{-\kappa_j} B^1} \sum_{n \in N_{\kappa}^{d,D}} \int_{D_{l_j \xi e_j}} \chi_{\mathfrak{D}_{\kappa,n}^{d,D,\alpha}}(x) |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} = \\
& (c_{51}2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\mathfrak{e} - q^{-1}\mathfrak{e})})^q \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j q/p} \left(\int_{c_{48}2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j}} \left(\sum_{n \in N_{\kappa}^{d,D}} \chi_{\mathfrak{D}_{\kappa,n}^{d,D,\alpha}}(x) \right) |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} \leq \\
& (c_{51}2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\mathfrak{e} - q^{-1}\mathfrak{e})})^q \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j q/p} \left(\int_{c_{48}2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j}} c_{37} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{q/p} \leq \\
& (c_{52}2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\mathfrak{e} - q^{-1}\mathfrak{e})})^q \left(\sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{48}2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \right)^q = \\
& (c_{52}2^{(\kappa, \lambda + p^{-1}\mathfrak{e} - q^{-1}\mathfrak{e})})^q \sum_{j=1}^d 2^{\kappa_j/p} \left(\int_{c_{48}2^{-\kappa_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \Big)^q \leq \\
& \left(c_{52}2^{k(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1})\mathfrak{e})} \sum_{j=1}^d 2^{k/(\alpha_j p)} \left(\int_{c_{53}2^{-k/\alpha_j} B^1} \int_{D_{l_j \xi e_j}} |\Delta_{\xi e_j}^{l_j} f(x)|^p dx d\xi \right)^{1/p} \right)^q \leq \\
& (c_{54}2^{k(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1} - q^{-1})\mathfrak{e})})^q \sum_{j=1}^d \Omega_j^{n_j}(f, c_{53}2^{-k/\alpha_j})_{L_p(D)}^q. \quad (5.1.45)
\end{aligned}$$

Из (5.1.45) приходим к (5.1.27) при $p \leq q$. Неравенство (5.1.27) при $q < p$ вытекает из неравенства (5.1.27) при $q = p$ и того факта, что при $q < p, l \in \mathbb{Z}_+^d, \kappa \in \mathbb{Z}_+^d$, ограниченной области $D \subset \mathbb{R}^d$ для $h \in \mathcal{P}_{\kappa}^{d,l,D}$ справедливо неравенство

$$\|h\|_{L_q(\mathbb{R}^d)} = \|h\|_{L_q(D')} \leq c_{55} \|h\|_{L_p(D')} = c_{55} \|h\|_{L_p(\mathbb{R}^d)},$$

где D' – ограниченная область в $\mathbb{R}^d$ такая, что

$$\bigcup_{n \in N_{\kappa}^{d,D}} Q_{\kappa,n}^d \subset D'$$

при $\kappa \in \mathbb{Z}_+^d$. $\square$

С применением леммы 5.1.3 устанавливается также

Предложение 5.1.5

В условиях леммы 5.1.3 множество $\mathcal{D}^{\lambda}(B((H_p^{\alpha})'(D)))$ – вполне ограничено (а при $1 < p < \infty$ компактно) в $L_q(D)$.

В заключение этого пункта для $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d$, ограниченной области $D \subset \mathbb{R}^d$ и $\kappa \in \mathbb{Z}_+^d$ обозначим через $\mathcal{I}_{\kappa}^{d,l,D} : \mathcal{P}_{\kappa}^{d,l,D} \mapsto \mathbb{R}^{R_{\kappa}^{d,l,D}}$ линейный

изоморфизм, определяемый для $f \in \mathcal{P}_\kappa^{d,l,D}$ равенством

$$\mathcal{I}_\kappa^{d,l,D} f = \{f_\nu(2^{-\kappa}\nu + 2^{-\kappa}\lambda) : \nu \in N_\kappa^{d,D}, \lambda \in \mathbb{Z}_+^d(l)\},$$

где $\{f_\nu \in \mathcal{P}_\kappa^{d,l}, \nu \in N_\kappa^{d,D}\}$ – набор полиномов, удовлетворяющих (5.1.4).

Несложно проверить, что имеет место

Лемма 5.1.6

Для $d \in \mathbb{N}, l \in \mathbb{Z}_+^d$, ограниченной области $D \subset \mathbb{R}^d$ и $1 \leq p \leq \infty$ существуют константы $c_{56}(d, l, p) > 0$ и $c_{57}(d, l, p) > 0$ такие, что при $\kappa \in \mathbb{Z}_+^d$ для $f \in \mathcal{P}_\kappa^{d,l,D}$ соблюдается неравенство

$$c_{56}\|f\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} \leq 2^{-(\kappa, \mathfrak{e})p^{-1}} \|\mathcal{I}_\kappa^{d,l,D} f\|_{l_p^{d,l,D}} \leq c_{57}\|f\|_{L_p(\mathbb{R}^d)}. \quad (5.1.46)$$

Лемма 5.1.7

В условиях леммы 5.1.6 при $\kappa \in \mathbb{Z}_+^d$ отображение

$$U = U_\kappa^{d,l,D,p} : \mathcal{P}_\kappa^{d,l,D} \cap L_p(\mathbb{R}^d) \mapsto \{f|_D : f \in \mathcal{P}_\kappa^{d,l,D}\} \cap L_p(D),$$

задаваемое равенством $Uf = f|_D$, является линейным гомеоморфизмом.

Доказательство.

Линейность и сюръективность отображения U очевидны. Проверим его инъективность. Если для $f \in \mathcal{P}_\kappa^{d,l,D}$ значение $Uf = 0$, то ввиду представления (5.1.4) для $x \in D$ выполняется равенство

$$\sum_{\nu \in N_\kappa^{d,D}} f_\nu(x) \chi_{\kappa,\nu}^d(x) = 0,$$

а, следовательно, при $\nu \in N_\kappa^{d,D}$ для $x \in D \cap Q_{\kappa,\nu}^d$ соблюдается равенство $f_\nu(x) = f_\nu(x) \chi_{\kappa,\nu}^d(x) = 0$. Отсюда, учитывая включение $f_\nu \in \mathcal{P}_\kappa^{d,l}$ и открытость непустого множества $D \cap Q_{\kappa,\nu}^d$, заключаем, что $f_\nu(x) = 0$ для $x \in \mathbb{R}^d, \nu \in N_\kappa^{d,D}$, т.е. $f = 0$. Принимая во внимание сказанное, видим, что функционал $\|Uf\|_{L_p(D)}$ является нормой на конечномерном линейном пространстве $\mathcal{P}_\kappa^{d,l,D}$. А поскольку любые нормы на конечномерном линейном пространстве эквивалентны, то существует константа $c_{58}(d, l, D, p, \kappa) > 0$ такая, что для $f \in \mathcal{P}_\kappa^{d,l,D}$ справедливо неравенство

$$c_{58}\|f\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} \leq \|f|_D\|_{L_p(D)} \leq \|f\|_{L_p(\mathbb{R}^d)}, \quad (5.1.47)$$

что завершает доказательство леммы. $\square$

5.2. В этом пункте даётся описание слабой асимптотики изучаемых в настоящем параграфе поперечников, но сначала напомним их определения (см. [10]).

Пусть C – подмножество банахова пространства X и $n \in \mathbb{Z}_+$. Тогда n -поперечником по Колмогорову множества C в пространстве X называется величина

$$d_n(C, X) = \inf_{M \in \mathcal{M}_n(X)} \sup_{x \in C} \inf_{y \in M} \|x - y\|_X,$$

где $\mathcal{M}_n(X)$ – совокупность всех плоскостей M в X , у которых $\dim M \leq n$.

n -поперечником по Гельфанду множества C в пространстве X называется величина

$$d^n(C, X) = \inf_{M \in \mathcal{M}^n(X)} \sup_{x \in C \cap M} \|x\|_X,$$

где $\mathcal{M}^n(X)$ – множество всех замкнутых линейных подпространств M в X , у которых $\text{codim } M \leq n$.

Линейным n -поперечником множества C в пространстве X называется величина

$$\lambda_n(C, X) = \inf_{A \in \mathcal{L}_n(X)} \sup_{x \in C} \|x - Ax\|_X,$$

где $\mathcal{L}_n(X)$ – множество всех непрерывных аффинных отображений $A : X \mapsto X$, у которых $\text{rank } A \leq n$.

n -поперечником по Александрову множества C в пространстве X называется величина

$$a_n(C, X) = \inf_{\phi \in \mathcal{A}_n(C, X)} \sup_{x \in C} \|x - \phi(x)\|_X,$$

где $\mathcal{A}_n(C, X)$ – множество всех непрерывных отображений $\phi : C \mapsto X$, для которых существует компакт $K_\phi \subset X$ такой, что $\text{Im } \phi \subset K_\phi$ и $\dim K_\phi \leq n$.

Введём ещё следующую величину

$$a^n(C, X) = \inf_{\phi \in \mathcal{A}^n(C, X)} \sup_{y \in \text{Im } \phi} \text{diam}(\phi^{-1}(y))_X,$$

где $\mathcal{A}^n(C, X)$ – совокупность всех непрерывных относительно метрики пространства X отображений $\phi : C \mapsto K_\phi$, для которых K_ϕ – метрический компакт размерности не больше n , а $\text{diam}(E)_X$ – диаметр множества E в метрике пространства X .

Наконец, энтропийным n -поперечником множества C в пространстве X будем называть величину

$$\epsilon_n(C, X) = \inf \{ \epsilon > 0 : \exists x^1, \dots, x^{2^n} \in X : C \subset \cup_{j=1}^{2^n} (x^j + \epsilon B(X)) \}.$$

С помощью утверждений 5.2.1 и 5.2.2, взятых из [11], доказывается лемма 5.2.3.

Предложение 5.2.1

Пусть $U : X \mapsto Y$ – непрерывное линейное отображение банахова пространства X в банахово пространство Y и $L \subset X$ – замкнутое линейное подпространство, для которого сужение $U|_L$ является гомеоморфизмом L на $U(L)$, и пусть $C \subset L$ – некоторое множество. Тогда для $p_n(\cdot, \cdot) = d_n(\cdot, \cdot), d^n(\cdot, \cdot), \lambda_n(\cdot, \cdot), a^n(\cdot, \cdot), \epsilon_n(\cdot, \cdot)$ при $n \in \mathbb{Z}_+$ имеет место неравенство

$$p_n(U(C), Y) \leq \|U\|_{\mathcal{B}(X, Y)} p_n(C, X). \quad (5.2.1)$$

Предложение 5.2.2

Пусть C – подмножество банахова пространства X , для которого существует последовательность непрерывных линейных отображений $V_j : X \mapsto X_j$ пространства X в замкнутые линейные подпространства $X_j, j \in \mathbb{Z}_+$, такая, что для каждого $x \in C$ имеет место представление $x = \sum_{j=0}^{\infty} V_j x$. Тогда для любых $n, j_0 \in \mathbb{Z}_+$ и любого набора $\{n_j \in \mathbb{Z}_+, j = 0, \dots, j_0\}$ таких, что $n \geq \sum_{j=0}^{j_0} n_j$, для $p_n(\cdot, \cdot) = d_n(\cdot, \cdot), d^n(\cdot, \cdot), \lambda_n(\cdot, \cdot), a^n(\cdot, \cdot), \epsilon_n(\cdot, \cdot)$ выполняется неравенство

$$p_n(C, X) \leq \sum_{j=0}^{j_0} p_{n_j}(V_j(C), X_j) + 2 \sum_{j=j_0+1}^{\infty} d^0(V_j(C), X_j). \quad (5.2.2)$$

Лемма 5.2.3

Пусть выполнены условия леммы 5.1.3. Тогда для $C = \mathcal{D}^\lambda(B((H_p^\alpha)'(D)))$ и $X = L_q(D)$ справедливы следующие утверждения:

1) существует константа $c_1(d, \alpha, D, p, q, \lambda) > 0$ такая, что для любых $n, j_0, k \in \mathbb{Z}_+ : k \geq K^0$, и любого набора чисел $\{n_j \in \mathbb{Z}_+, j = 1, \dots, j_0\}$ таких, что $n \geq R_k^{d, l-\epsilon-\lambda, D, \alpha} + \sum_{j=1}^{j_0} n_j$, для $p_n(\cdot, \cdot) = d_n(\cdot, \cdot), d^n(\cdot, \cdot), \lambda_n(\cdot, \cdot), a^n(\cdot, \cdot)$ имеет место неравенство

$$p_n(C, X) \leq c_1 \left(2^{-k(1-(\alpha^{-1}, \lambda+(p^{-1}-q^{-1})\epsilon))} \sum_{j=1}^{j_0} 2^{-j(1-(\alpha^{-1}, \lambda+(p^{-1}-q^{-1})\epsilon))} p_{n_j} \right. \\ \left. \times (B(l_p^{R_{k+j}^{d, l-\epsilon-\lambda, D, \alpha}}), l_q^{R_{k+j}^{d, l-\epsilon-\lambda, D, \alpha}}) + 2^{-(k+j_0)(1-(\alpha^{-1}, \lambda+(p^{-1}-q^{-1})\epsilon))} \right); \quad (5.2.3)$$

2) существует константа $c_2(d, \alpha, D, p, q, \lambda) > 0$ такая, что для любых $n, j_0 \in \mathbb{Z}_+$ и любого набора $\{n_j \in \mathbb{Z}_+, j = 0, \dots, j_0\}$ таких, что $n \geq \sum_{j=0}^{j_0} n_j$, соблюдается неравенство

$$\epsilon_n(C, X) \leq c_2 \left(\sum_{j=0}^{j_0} 2^{-j(1-(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1}-q^{-1})\epsilon))} \epsilon_{n_j} \left(B(l_p^{R_{K^0+j}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha}}), l_q^{R_{K^0+j}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha}} \right) + 2^{-j_0(1-(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1}-q^{-1})\epsilon))} \right). \quad (5.2.4)$$

Доказательство.

Прежде всего, в силу (5.1.26) при $k \in \mathbb{Z}_+ : k \geq K^0, j_0 \in \mathbb{Z}_+$ для $F \in C$ в X имеет место равенство

$$F = (\mathcal{U}_{k,0}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha} F) |_D + \sum_{j=1}^{j_0} (V_{k+j}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha} F) |_D + \sum_{j=j_0+1}^{\infty} (V_{k+j}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha} F) |_D.$$

Поэтому для $n \in \mathbb{Z}_+$ и $\{n_j \in \mathbb{Z}_+, j = 1, \dots, j_0\}$ таких, что $n \geq R_k^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha} + \sum_{j=1}^{j_0} n_j$, ввиду (5.2.2) справедлива оценка

$$\begin{aligned} p_n(C, X) &\leq p_{R_k^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha}}((\mathcal{U}_{k,0}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha}(C)) |_D, (\mathcal{P}_k^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha}) |_D \cap X) \\ &\quad + \sum_{j=1}^{j_0} p_{n_j}((V_{k+j}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha}(C)) |_D, (\mathcal{P}_{k+j}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha}) |_D \cap L_q(D)) \\ &\quad + 2 \sum_{j=j_0+1}^{\infty} d^0((V_{k+j}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha}(C)) |_D, (\mathcal{P}_{k+j}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha}) |_D \cap L_q(D)). \end{aligned} \quad (5.2.5)$$

Ясно, что

$$p_{R_k^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha}}((\mathcal{U}_{k,0}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha}(C)) |_D, (\mathcal{P}_k^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha}) |_D \cap X) = 0. \quad (5.2.6)$$

Далее, при $j = 1, \dots, j_0$, применяя сначала с учетом леммы 5.1.7 неравенства (5.2.1) и (5.1.47), а затем – (5.2.1) и (5.1.46) (при $\kappa = \kappa(k+j, \alpha)$), наконец, используя (5.1.46) и (5.1.27) (при $q = p$), получаем

$$\begin{aligned} &p_{n_j}((V_{k+j}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha}(C)) |_D, (\mathcal{P}_{k+j}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha}) |_D \cap L_q(D)) \leq \\ &\quad p_{n_j}(V_{k+j}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha}(C), \mathcal{P}_{k+j}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha} \cap L_q(\mathbb{R}^d)) \\ &\leq c_3 2^{-(k+j)(1-(\alpha^{-1}, \lambda + (p^{-1}-q^{-1})\epsilon))} p_{n_j}(B(l_p^{R_{k+j}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha}}), l_q^{R_{k+j}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha}}). \end{aligned} \quad (5.2.7)$$

Наконец, учитывая (5.1.47), (5.1.27), имеем

$$\sum_{j=j_0+1}^{\infty} d^0((V_{k+j}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha}(C)) |_D, (\mathcal{P}_{k+j}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha}) |_D \cap L_q(D)) \leq$$

$$\sum_{j=J_0+1}^{\infty} d^0(V_{k+j}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha}(C), \mathcal{P}_{k+j}^{d,l-\epsilon-\lambda,D,\alpha} \cap L_q(\mathbb{R}^d)) \leq c_4 2^{-(k+j_0)(1-(\alpha^{-1}, \lambda+(p^{-1}-q^{-1})+\epsilon))}. \quad (5.2.8)$$

Соединяя (5.2.5) – (5.2.8), приходим к (5.2.3).

Вывод (5.2.4) проводится аналогично. $\square$

Как видно из доказательства лемм 4.2.4, 3.2.2, 3.2.3 в [6], имеет место Лемма 5.2.4

Пусть $d \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{R}_+^d, \lambda \in \mathbb{Z}_+^d, 1 \leq p < \infty, 1 \leq q \leq \infty$ удовлетворяют условию (1.3.62) и $\theta \in \mathbb{R} : 1 \leq \theta < \infty, \mathfrak{l} = \mathfrak{l}(\alpha)$. Тогда существует константа $c_5(d, \alpha, p, \theta, q, \lambda) > 0$ такая, что для $C = \mathcal{D}^\lambda((B((B_{p,\theta}^\alpha)^\mathfrak{l}(\mathbb{R}^d)) \cap C_0^\infty(I^d))|_{I^d}), X = L_q(I^d)$ и $p_n(\cdot, \cdot) = d_n(\cdot, \cdot), d^n(\cdot, \cdot), \lambda_n(\cdot, \cdot), a^n(\cdot, \cdot), \epsilon_n(\cdot, \cdot)$ для любых натуральных чисел $n < N$ справедливо неравенство

$$p_n(C, X) \geq c_5 N^{-(1-(\alpha^{-1}, \lambda+(p^{-1}-q^{-1})+\epsilon))/(\alpha^{-1}, \epsilon)} p_n(B(l_p^N), l_q^N). \quad (5.2.9)$$

С использованием леммы 5.2.4 доказывается

Лемма 5.2.5

Пусть $d \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{R}_+^d, D$ – ограниченная область α -типа в $\mathbb{R}^d, \lambda \in \mathbb{Z}_+^d, 1 \leq p < \infty, 1 \leq q \leq \infty$ удовлетворяют условию (1.3.62) и $\theta \in \mathbb{R} : 1 \leq \theta < \infty$. Тогда существует константа $c_6(d, \alpha, D, p, \theta, q, \lambda) > 0$ такая, что для $C = \mathcal{D}^\lambda(B((B_{p,\theta}^\alpha)'(D))), X = L_q(D)$ и $p_n(\cdot, \cdot) = d_n(\cdot, \cdot), d^n(\cdot, \cdot), \lambda_n(\cdot, \cdot), a^n(\cdot, \cdot), \epsilon_n(\cdot, \cdot)$ для любых натуральных чисел $n < N$ выполняется неравенство (5.2.9) с константой c_6 вместо c_5 .

Доказательство.

Фиксируем точку $x^0 \in \mathbb{R}^d$ и вектор $\delta \in \mathbb{R}_+^d$ такие, что $Q = (x^0 + \delta I^d) \subset D$. Сначала заметим, что в условиях леммы при $n, N \in \mathbb{N} : n < N, \mathfrak{l} = \mathfrak{l}(\alpha)$, благодаря (5.2.9) и (1.1.9), имеет место неравенство

$$\begin{aligned} c_5 N^{-(1-(\alpha^{-1}, \lambda+(p^{-1}-q^{-1})+\epsilon))/(\alpha^{-1}, \epsilon)} p_n(B(l_p^N), l_q^N) &\leq \\ p_n(\mathcal{D}^\lambda((B((B_{p,\theta}^\alpha)^\mathfrak{l}(\mathbb{R}^d)) \cap C_0^\infty(I^d))|_{I^d}), L_q(I^d)) &\leq \\ p_n(\mathcal{D}^\lambda((B((B_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d)) \cap C_0^\infty(I^d))|_{I^d}), L_q(I^d)). \end{aligned} \quad (5.2.10)$$

Далее, принимая во внимание, что в силу (2.2.6) справедливо включение

$$\begin{aligned} \mathcal{D}^\lambda((B((B_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d)) \cap C_0^\infty(I^d))|_{I^d}) &= \{\mathcal{D}^\lambda(f|_{I^d}) : f \in (B((B_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d)) \cap C_0^\infty(I^d))\} = \\ h_{\delta, x^0}(\{h_{\delta, x^0}^{-1}(\mathcal{D}^\lambda(f|_{I^d})) : f &\in (B((B_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d)) \cap C_0^\infty(I^d))\}) = \\ h_{\delta, x^0}(\{\delta^\lambda \mathcal{D}^\lambda(h_{\delta, x^0}^{-1}(f|_{I^d})) : f &\in (B((B_{p,\theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d)) \cap C_0^\infty(I^d))\}) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \delta^\lambda h_{\delta, x^0}(\{\mathcal{D}^\lambda((h_{\delta, x^0}^{-1}f) |_Q) : f \in (B((B_{p, \theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d)) \cap C_0^\infty(I^d))\}) = \\
& \delta^\lambda h_{\delta, x^0}(\{\mathcal{D}^\lambda(F |_Q) : F \in h_{\delta, x^0}^{-1}(B((B_{p, \theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d)) \cap C_0^\infty(I^d))\}) = \\
& \delta^\lambda h_{\delta, x^0}(\{\mathcal{D}^\lambda(F |_Q) : F \in h_{\delta, x^0}^{-1}(B((B_{p, \theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d))) \cap C_0^\infty(Q)\}) \subset \\
& \delta^\lambda h_{\delta, x^0}(\{\mathcal{D}^\lambda(F |_Q) : F \in (c_7 B((B_{p, \theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d))) \cap C_0^\infty(Q)\}) = \\
& c_8 h_{\delta, x^0}(\{\mathcal{D}^\lambda(F |_Q) : F \in B((B_{p, \theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d)) \cap C_0^\infty(Q)\}),
\end{aligned}$$

благодаря (5.2.1), (2.2.2), имеем

$$\begin{aligned}
& p_n(\mathcal{D}^\lambda((B((B_{p, \theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d)) \cap C_0^\infty(I^d)) |_{I^d}), L_q(I^d)) \leq \\
& p_n(c_8 h_{\delta, x^0}(\{\mathcal{D}^\lambda(F |_Q) : F \in B((B_{p, \theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d)) \cap C_0^\infty(Q)\}), L_q(I^d)) \leq \\
& c_8 \delta^{-q-1\epsilon} p_n(\{(\mathcal{D}^\lambda F) |_Q : F \in B((B_{p, \theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d)) \cap C_0^\infty(Q)\}, L_q(Q)). \quad (5.2.11)
\end{aligned}$$

Теперь, определяя в $L_q(D)$ замкнутое подпространство

$$L_q^0(Q, D) = \{f \in L_q(D) : f = \chi_Q f\},$$

заметим, что

$$\{\mathcal{D}^\lambda(F |_D) : F \in B((B_{p, \theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d)) \cap C_0^\infty(Q)\} \subset L_q^0(Q, D),$$

а для оператора $U : L_q(D) \ni f \mapsto Uf = f |_Q \in L_q(Q)$, его сужение $U |_{L_q^0(Q, D)}$ является изометрическим изоморфизмом пространства $L_q^0(Q, D) \cap L_q(D)$ на $L_q(Q)$. С учетом сказанного применяя (5.2.1), получаем

$$\begin{aligned}
& p_n(\{(\mathcal{D}^\lambda F) |_Q : F \in B((B_{p, \theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d)) \cap C_0^\infty(Q)\}, L_q(Q)) = \\
& p_n(\{(\mathcal{D}^\lambda(F |_D)) |_Q : F \in B((B_{p, \theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d)) \cap C_0^\infty(Q)\}, L_q(Q)) = \\
& p_n(U(\{\mathcal{D}^\lambda(F |_D) : F \in B((B_{p, \theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d)) \cap C_0^\infty(Q)\}), L_q(Q)) \leq \\
& p_n(\{\mathcal{D}^\lambda(F |_D) : F \in B((B_{p, \theta}^\alpha)'(\mathbb{R}^d)) \cap C_0^\infty(Q)\}, L_q(D)) \leq \\
& p_n(\{\mathcal{D}^\lambda f : f \in B((B_{p, \theta}^\alpha)'(D)), L_q(D)). \quad (5.2.12)
\end{aligned}$$

Соединяя (5.2.12), (5.2.11), (5.2.10), видим, что для C и X из формулировки леммы соблюдается (5.2.9) с константой c_6 вместо c_5 . $\square$

Опираясь на соотношения (5.1.8), (5.2.3), (5.2.4) и (5.2.9) с константой c_6 вместо c_5 , подобно тому, как это сделано в [6], устанавливается слабая асимптотика колмогоровского, гильфандовского, линейного, александровского и энтропийного поперечников классов $\mathcal{D}^\lambda(B((H_p^\alpha)'(D)))$ и $\mathcal{D}^\lambda(B((B_{p, \theta}^\alpha)'(D)))$ в пространстве $L_q(D)$, заданных в ограниченной области $D\alpha$ -типа.

Теорема 5.2.6

Пусть $d \in \mathbb{N}$, $\alpha \in \mathbb{R}_+^d$, $\lambda \in \mathbb{Z}_+^d$, $1 \leq p < \infty$, $1 \leq q \leq \infty$ удовлетворяют условию (1.3.62) и $\theta \in \mathbb{R} : 1 \leq \theta < \infty$, а $D \subset \mathbb{R}^d$ – ограниченная область α -типа. Тогда для $C = \mathcal{D}^\lambda(B((H_p^\alpha)'(D)))$, $\mathcal{D}^\lambda(B((B_{p,\theta}^\alpha)'(D)))$ и $X = L_q(D)$ справедливо соотношение

$$d_n(C, X) \asymp \begin{cases} n^{-(1-(\alpha^{-1}, \lambda))/(\alpha^{-1}, \epsilon) + (p^{-1} - q^{-1})_+}, & \text{при } q \leq p \text{ или } p < q \leq 2; \\ n^{-(1-(\alpha^{-1}, \lambda))/(\alpha^{-1}, \epsilon) + (p^{-1} - 2^{-1})_+}, & \text{при } q > \max(2, p), \\ & 1 - (\alpha^{-1}, \lambda) - (\alpha^{-1}, \epsilon)(1/p + (1/2 - 1/p)_+) > 0. \end{cases}$$

Теорема 5.2.7

Пусть $d, \alpha, \lambda, p, q, \theta, D$, а также C и X имеют тот же смысл, что и в теореме 5.2.6. Тогда имеет место соотношение

$$d^n(C, X) \asymp \begin{cases} n^{-(1-(\alpha^{-1}, \lambda))/(\alpha^{-1}, \epsilon) + (p^{-1} - q^{-1})_+}, & \text{при } (q \leq p \text{ или } 2 \leq p < q) \text{ и} \\ & \text{соблюдении условия (1.3.62);} \\ n^{-(1-(\alpha^{-1}, \lambda))/(\alpha^{-1}, \epsilon) + (2^{-1} - q^{-1})_+}, & \text{при } p < \min(2, q), 1 - \\ & (\alpha^{-1}, \lambda) - (\alpha^{-1}, \epsilon)(1/q' + (1/2 - 1/q')_+) > 0. \end{cases}$$

Теорема 5.2.8

В условиях теоремы 5.2.6 верно соотношение

$$\lambda_n(C, X) \asymp \begin{cases} n^{-(1-(\alpha^{-1}, \lambda))/(\alpha^{-1}, \epsilon) + (p^{-1} - q^{-1})_+}, & \text{при } (q \leq p \text{ или } p < q \leq 2 \text{ или} \\ & 2 \leq p < q); \\ n^{-(1-(\alpha^{-1}, \lambda))/(\alpha^{-1}, \epsilon) + 1/2 - 1/q + (1/p + 1/q - 1)_+}, & \text{при } p < 2 < q, 1 - (\alpha^{-1}, \lambda) - \\ & (\alpha^{-1}, \epsilon)(1 + (1/p' - 1/q)_+) > 0. \end{cases}$$

Теорема 5.2.9

В условиях теоремы 5.2.6 соблюдается соотношение

$$a_n(C, X) \asymp n^{-(1-(\alpha^{-1}, \lambda))/(\alpha^{-1}, \epsilon)}.$$

Теорема 5.2.10

В условиях теоремы 5.2.6 при $1 - (\alpha^{-1}, \lambda) - (\alpha^{-1}, \epsilon) > 0$ выполняется соотношение

$$\epsilon_n(C, X) \asymp n^{-(1-(\alpha^{-1}, \lambda))/(\alpha^{-1}, \epsilon)}.$$

Список литературы

- [1] Бесов О. В., Ильин В. П. Естественное расширение класса областей в теоремах вложения // Матем. сб., 75(117):4 (1968), 483–495.
- [2] Буренков В. И., Файн Б. Л. О продолжении функций из анизотропных пространств с сохранением класса // Тр. МИАН СССР, 150, 1979, 52–66.
- [3] Шварцман П. А. Теоремы продолжения с сохранением локально-аппроксимационных свойств функций в неизотропном случае // Зап. научн. сем. ЛОМИ, 113 (1981), 247–252
- [4] Файн Б. Л. О продолжении функций из анизотропных пространств Соболева // Тр. МИАН СССР, 170 (1984), 248–272.
- [5] Мамедов Г. А. Продолжение анизотропного класса Гёльдера // Изв. вузов. Матем., 1985, №6, 36–40.
- [6] Кудрявцев С. Н. Приближение производных функций конечной гладкости из неизотропных классов // Изв. РАН. Сер. матем. 68:1 (2004), 79–122.
- [7] Никольский С. М. Приближение функций многих переменных и теоремы вложения // М.: Наука. 1977.
- [8] Кудрявцев С. Н. Обобщенные ряды Хаара и их применение // Analysis Mathematica, 37:2 (2011), 103–150.
- [9] Чуи Ч. К. Введение в вейвлеты // М.: Мир, 2001.
- [10] Тихомиров В. М. Некоторые вопросы теории приближения // М.: Изд-во МГУ. 1976.
- [11] Кудрявцев С. Н. Поперечники классов гладких функций // Изв. РАН. Сер. матем. 59:4 (1995), 81–104.